





29,273/8



55150

# PRINCIPIA MEDICINÆ,

AUCTORE

FRANCISCO HOME,

Medico Regio , & Collegii Medicorum Edinburgi  
Socio.

EDITIO QUINTA.



LUGDUNI,

Sumptibus J. B. DELAMOLLIERE.

---

I 7.9 2.

PHARMACY  
MEDICINE


NEW YORK

BRANDS



NEW YORK

STREET



NEW YORK

STREET

1888



**I**N hoc volumen redigere conatus sum  
 præcipua & utilissima MEDICINÆ PRIN-  
 CIPIA. Historias morborum, ut hisce tem-  
 poribus & regionibus conspiciuntur, curate  
 depinxi; eorumque curationes multiplices,  
 jam usu confirmatas, tradidi. Rationes, quæ  
 parce & caute exhibentur, ab illis segregavi.  
 Ordinem quam simplicissimum, & usui ac-  
 commodatum, sequutus sum. Oratione, po-  
 tius dilucida & succincta, quam eleganti,  
 usus sum.

**Q**UUM, in rejiciendis quæ minus vide-  
 rentur idonea, & in iis quæ diffusius a me  
 ad Prælectiones Medicinales scripta essent in  
 compendium redigendis; præcipua mea po-  
 neretur opera, non dubito quin tyronibus,  
 vel parum in arte versatis, ob brevitatē  
 difficilius, & in multis locis obscurius opus-  
 culum hocce videatur.

BOERHAAVIUS certe, qui librum de cog-  
 noscendis & curandis morbis composuit, de  
 Medicis optime meretur. Primus enim Me-  
 dicinam in systema rationale & aphoristicum  
 redegit; & multa de febribus inflammatoriis

utilia tradidit. Sed in ordine totius, & in nonnullis morbis deficit; multos præteriit; & totum opus, minus quam par erat, usui accommodavit: quod sane humana imbecillitas, in tanta rerum varietate, tamque difficili arte, vix præcavere potest; & quod facillime ignoscetur ab illis, quibus innotescit quam arduum sit opus.

Ex propria experientia nemo huic operi par est; ideoque fideles aliorum observationes in auxilium advocavi. Ducibus me tutor præcipue CELSO & HOFFMANNO. Hic multarum rerum, quas ipse sequutus sum, auctor bonus. Ille inter omnes quotquot scio ob judicii acumen & styli elegantiam nitet. Illius verba, utpote disertissima, nefas mutare duxi; & , uti omnibus medicis notissima, haud insignivi.



# OPERIS ARGUMENTA.

## LIB. I.

### DE SANITATE & MORBIS.

#### PARS I.

##### DE SANITATE.

SECT.	Pag.
I. <i>Definitio, fundamenta, &amp; divisio Medicinæ practicæ.</i>	1
II. <i>De hygieina vel tuenda sanitate.</i>	3

#### PARS II.

##### *De diversis morborum partibus.*

I. <i>De morbis.</i>	12
II. <i>De causis morbificis.</i>	13
III. <i>De causis morborum remotis.</i>	14
IV. <i>De causis prædisponentibus.</i>	23
V. <i>De causis Morborum proximis.</i>	27
VI. <i>De causarum morbificarum sede.</i>	31
VII. <i>De symptomatibus morborum.</i>	33
VIII. <i>De symptomatum genealogia &amp; ratione.</i>	34
IX. <i>De crisi.</i>	35
X. <i>De diagnosi.</i>	38
XI. <i>De prognosi.</i>	39

P A R S III.

*De Morbis medendis.*

I. <i>De therapeia.</i>	43
II. <i>De remediorum viribus.</i>	46
III. <i>De artis in medendo legibus.</i>	48

L I B. II.

DE MORBIS FEBRILIBUS.

P A R S I.

*De diversis morborum divisionibus.*

I. <i>De morborum in diversa genera divisione.</i>	53
II. <i>De endemicis, epidemicis, &amp; sporadicis morbis.</i>	55
III. <i>De acutis &amp; chronicis morbis.</i>	58
IV. <i>De morbis febrilibus &amp; non febrilibus.</i>	61
V. <i>De febre in genere.</i>	62
VI. <i>De febrium generibus.</i>	71



P A R S. II.

*De febribus quæ in totis corporibus consistere videntur.*

I.	<i>Febris inflammatoria.</i>	73
II.	<i>Febris lenta vel nervosa.</i>	80
III.	<i>Febris maligna, putrida vel petechialis.</i>	84
IV.	<i>De harum febrium complicationibus.</i>	88
V.	<i>Febris intermittens.</i>	Ibid.
VI.	<i>Febris remittens.</i>	94
VII.	<i>Febris hæctica vel marasmus.</i>	98

P A R S. III.

*De febribus quæ oriuntur in partibus.*

I.	<i>De inflammatione in genere, ejusque terminatione per resolutionem, abscessum gangrænam vel scirrhum.</i>	101
II.	<i>Phrenitis sive inflammatio cerebri ejusque membranarum.</i>	106
III.	<i>Ophthalmia.</i>	109
IV.	<i>Angina inflammatoria.</i>	114
	<i>Angina maligna.</i>	120
V.	<i>Tussis vel catarrhus. &amp; tussis convulsiva.</i>	124
VI.	<i>Peripneumonia inflammatoria.</i>	129

# VIIJ OPERIS ARGUMENTA.

SECT.		Pag.
	<i>Peripneumonia maligna.</i>	134.
	<i>Peripneumonia notha.</i>	135
VII.	<i>Pleuritis.</i>	136
VIII.	<i>Paraphrenitis.</i>	140
IX.	<i>Phthisis pulmonalis.</i>	Ibid.
X.	<i>Tabes aliæ purulentæ.</i>	145
XI.	<i>Inflammatio ventriculi.</i>	146
XII.	<i>Dysenteria, diarrhœa &amp; lienteria.</i>	147
XIII.	<i>Colicus dolor.</i>	153
XIV.	<i>Cholera morbus.</i>	156
XV.	<i>Iliaca passio, ileus, seu vol- vulus.</i>	157
XVI.	<i>Hepatitis.</i>	159
XVII.	<i>Nephritis.</i>	163
XVIII.	<i>Stranguria.</i>	164

## P A R S IV.

*De morbis febrilibus qui primo in totis cor-  
poribus, dein in partibus consistere vi-  
dentur.*

I.	<i>De his morbis in genere.</i>	167
II.	<i>Arthritis.</i>	168
III.	<i>Rheumatismus.</i>	174
IV.	<i>Febris purpurata vel miliaris.</i>	177
V.	<i>Febris scarlatina.</i>	181
VI.	<i>Erysipelas.</i>	Ibid.
VII.	<i>Variolæ.</i>	185
VIII.	<i>Morbilli.</i>	193.



SECT.

Pag.

LIB. III.

DE MORBIS NON FEBRILIBUS.

PARS I.

*De morbis totius corporis.*

I.	<i>De morborum non febrilium distributione.</i>	197
II.	<i>Scorbutus.</i>	198
III.	<i>Hydrops.</i>	203
IV.	<i>Scrophula seu strumæ &amp; scirrhus.</i>	209
V.	<i>Carcinoma vel cancer.</i>	214

PARS II.

*De cerebri nervorumque morbis.*

I.	<i>Apoplexia.</i>	218
II.	<i>Morbi soporosi.</i>	222
III.	<i>Paralyfis.</i>	223
IV.	<i>Epilepsia.</i>	226
V.	<i>Convulsiones.</i>	229
	<i>Spasmus cynicus, vel risus Sardonicus.</i>	230
	<i>Chorea sancti Viti.</i>	Ibid.

## X OPERIS ARGUMENTA.

SECT.	Pag.
VI. <i>Tetanos, opisthotonos, emprosthotonos.</i>	230
VII. <i>Catalepsis.</i>	232
VIII. <i>Malum hystericum &amp; hypochondriacum.</i>	233
IX. <i>Insania.</i>	237
X. <i>Odontalgia.</i>	241

## P A R S III.

### *De viscerum morbis.*

I.	<i>Hæmoptysis aliæque hæmorrhagiæ.</i>	243
II.	<i>Asthma.</i>	246
III.	<i>Imbecillitas vel resolutio ventriculi &amp; intestinorum.</i>	250
IV.	<i>Hæmorrhoides.</i>	254
V.	<i>Icterus.</i>	255
VI.	<i>Calculus cysticus.</i>	258
VII.	<i>Diabetes.</i>	262
VIII.	<i>Incontinentia urinæ.</i>	264
IX.	<i>Lithiasis seu calculus renum &amp; vesicæ.</i>	Ibid.

## P A R S IV.

### *De morbis genitalium & uteri.*

I.	<i>De his morbis in genere.</i>	269
II.	<i>Morbus venereus.</i>	Ibid.

SECT.	Pag.
	<i>Gonorrhœa virulenta.</i> 271
	<i>Tumor testium.</i> 276
	<i>Stranguria venerea.</i> 278
	<i>Bubo venereus.</i> 279
	<i>Gonorrhœa non virulenta.</i> 281
	<i>Ulcuscula venerea.</i> 282
	<i>Tumores præputii glandisque.</i> 284
	<i>Tubercula callosa.</i> 285
	<i>Lues venerea confirmata.</i> 286
III.	<i>De mensibus.</i> 295
IV.	<i>Obstructio vel suppressio mensium.</i> 296
V.	<i>Nimia mensium profusio.</i> 298
VI.	<i>Fluor albus.</i> 299
VII.	<i>Furor uterinus, &amp; satyriasis vel priapismus.</i> 301
VIII.	<i>Impotentia vel sterilitas virilis.</i> 303
IX.	<i>Sterilitas muliebris.</i> 304
X.	<i>Gravidarum morbi.</i> 306
XI.	<i>Abortus.</i> 308
XII.	<i>De puerperarum tractatione in genere.</i> 309
XIII.	<i>Fluxus lochiorum nimius.</i> 310
XIV.	<i>Lochiorum diminutio vel suppressio.</i> 311
XV.	<i>Dolores post partum.</i> 312
XVI.	<i>Febris lactea.</i> 313.



## P A R S V.

*De morbis infantium & puerorum.*

I.	<i>De his morbis in genere.</i>	314
II.	<i>Morbus ab acido.</i>	315
III.	<i>Aphthæ.</i>	316
IV.	<i>Dentitio.</i>	317
V.	<i>Vermes.</i>	319
VI.	<i>Vigilatio, pavor in somno, convulsiones.</i>	320
VII.	<i>Crusta lactea, tinea, impetigo, &amp;c.</i>	321
VIII.	<i>Phthiriasis, crinones.</i>	Ibid.
IX.	<i>Ani procidentia.</i>	322
X.	<i>Atrophia.</i>	Ibid.
XI.	<i>Rhachitis.</i>	323

## I N D E X

## O P E R I S.

## A.

Abortus P. 308.  
 Acutus morbus. 58.  
 Aer. 6. & 17.  
 Alimenta. 5.  
 Amor. 15.  
 Angina inflammatoria.  
 114.  
 Angina maligna. 120.  
 Aphthæ. 316.  
 Apoplexia. 218.  
 Arthritis. 168.  
 Asthma. 246.  
 Atrophia infantum. 322.

## B.

Balneum. 7.  
 Bubo venereus. 279.

## C.

Cæliaca. 153.  
 Calculus cysticus. 258.  
 Calculus renum & vesicæ.  
 264.  
 Carcinoma vel cancer.  
 214.  
 Carus. 222.  
 Cataphora, *Ibid.*

Catalepsis. 232.  
 Catarrhus. 124.  
 Causa morbifica. 13.  
 Causæ remotæ morborum.  
 14.  
 Causæ proximæ morborum.  
 27.  
 Causarum morbificarum se-  
 des. 31.  
 Cholera morbus. 156.  
 Choreæ sancti Viti. 230.  
 Colica hysterica 155.  
 Colicus dolor. 153.  
 Coma. 222.  
 Concubitus. 8.  
 Consuetudo. 111.  
 Convulsio. 229.  
 Crisis. 35.  
 Crusta lactea. 321.

## D.

Dentitio. 317.  
 Diagnofis. 38.  
 Diabetes. 262.  
 Diarrhœa. 147.  
 Dolores post partum. 312.  
 Dysenteria. 147.  
 Dysuria. 167.

- E.**  
 Emprosthotonos. 230.  
 Empyema. 145.  
 Endemici morbi. 55.  
 Epidemici morbi. *Ibid.*  
 Epilepsia. 226.  
 Erysipelas. 181.  
 Evacuaciones. 7.  
 Exercitatio. 8.  
**F.**  
 Febrilis & non febrilis morbus. 61.  
 Febrium complicationes. 88.  
 Febris in genere. 62.  
 Februm genera. 71.  
 Febris inflammatoria. 73.  
 Febris intermittens. 88.  
 Febris lenta vel nervosa. 80.  
 Febris lactea. 313.  
 Febris hectica vel marasmus. 98.  
 Febris remittens. 94.  
 Fluor albus. 299.  
 Furor uterinus. 301.  
**G.**  
 Gangræna. 101.  
 Gaudium. 16.  
 Gonorrhœa virulenta. 271.  
 Gravidarum morbi. 306.  
**H.**  
 Hamorrhoides. 254.  
 Hamoptysis. 243.  
 Hepatitis. 159.  
 Hydrops. 203.  
 Hystericum & hypochondriacum malum. 233.  
**I.**  
 Icterus. 255.  
 Iliaca passio seu Ileus. 157.  
 Imaginatio. 4.  
 Imbecillitas ventriculi. 250.  
 Incontinentia urinæ. 264.  
 Inflammatio. 73.  
 Inflammatio ventriculi. 146.  
 ————— mediastini. 140.  
 ————— pericardii. *Ibid.*  
 Infantia. 237.  
 Invidia. 16.  
 Ira. 15.  
 Ischuria. 164.  
 Ischias. 176.  
**L.**  
 Lethargus. 222.  
 Lienteria. 153.  
 Lochiorum fluxus nimius. 310.  
 ————— diminutio vel suppressio. 311.  
 Lues venerea confirmata. 286.  
 Lumbago. 176.  
**M.**  
 Mœror. 141.



Medicinæ divisio. 1.  
 Medendi leges. 48.  
 Menses. 295.  
 Mensium obstructio vel  
 suppressio. 296.  
 — profusio. 298.  
 Miasmata. 20.  
 Miliaris febris. 177.  
 Morbus. 12.  
 Morborum divisio. 53.  
 Morbilli. 193.  
 Morbus ab acido. 315.  
 Morbi infantiles. 314.

## N.

Nephritis. 163.

## O.

Odontalgia. 241.  
 Ophthalmia. 109.  
 Opisthoronosis. 230.

## P.

Pathemata. 4.  
 Pathologia. 13.  
 Paraphrenitis. 140.  
 Paralysis. 223.  
 Peripneumonia Inflamma-  
 toria. 129.  
 Peripneumonia maligna.  
 134.  
 — notha. 135.  
 Phrenitis. 106.  
 Phthisis pulmonalis. 140.  
 Phthiriasis. 321.  
 Pleuritis. 136.

— dorsalis. 139.  
 Proprietates hominum re-  
 rumque. 10.  
 Prædisponentes causæ. 251.  
 Priapismus. 301.  
 Procidencia ani. 322.  
 Potus. 6.  
 Pudor. 15.  
 Puerperarum tractatio in  
 genere. 309.

## R.

Ratio. 4.  
 Remediorum vires. 46.  
 Resolutio. 101.  
 Risus Sardonicus. 230.  
 Rhachitis. 323.  
 Rheumatismus. 174.

## S.

Sanitas. 3.  
 Scarlatina febris. 181.  
 Scirrhus. 209.  
 Scorbutus. 198.  
 Sitis. 70.  
 Somnus. 9.  
 Sporadici morbi. 55.  
 Sphacelus. 103.  
 Spasmus cynicus. 230.  
 Stranguria. 164.  
 Struma vel scrophula. 209.  
 Stranguria venerea. 278.  
 Sterilitas virilis. 303.  
 — muliebris. 304.  
 Symptomata morborum.  
 Symptomatum ratio. 34.  
 Suppuratio. 9.

## T.

Tabes purulentæ. 145.  
 Tetanus. 230.  
 Testium tumor venereus.  
 276.  
 Therapeia. 13. & 41.  
 Timor & Terror. 15.  
 Tussis. 124.  
 ——— convulsiva. 128.  
 Tumor præputii & glandis. 284.  
 Tubercula callosa. 285.

## U.

Ulcuscula venerea. 282.

## V.

Variola. 185.  
 Vestis. 17.  
 Venena. 16.  
 Venereus morbus. 269.  
 Vermes. 319.  
 Vigiliatio. 320.  
 Volvulus. 157.  
 Z.  
 Zona vel Zoster. 184.

# PRINCIPIA MEDICINÆ.

## LIBER PRIMUS.

### DE SANITATE & MORBIS.

#### PARS PRIMÆ.

##### *De Sanitate.*

#### SECT. I.

*Definitio, fundamenta, & divisio Medicinæ  
Præctica.*

1. **M**EDICINA practica est ars corporis humani sanitatem tuendi, vel idoneis remediis amissam restituendi; ideoque Medici nomen solus meretur, cui innotescunt quæ sanitatis tutelam & morborum curationem respiciunt.

2. Uti in corpore humano medicina versatur, capitis externi, trunci & artuum conditiones, viscerum posituram, ordinem, numerum, magnitudinem, figuram, duritiem, mollitiem, structuram, solidarumque & fluidarum partium motus, discentes noscere debent. Hinc peritia anatomix necessaria est.

3. Neque sanitatis neque morbi distinc-



tam habere quisquam potest ideam, absque notitia omnium actionum in statu sano. Præmittenda ergo physiologia.

4. Ex anatomia & physiologia patet, corpus humanum esse machinam mechanico-hydraulicam, summa arte constructam, ex solidis potentia motrici donatis & fluidis motis compositam; ideoque legibus corporum solidorum vel fluidorum in motu parere. An automaton nec-ne, nihil refert. Hinc usus mechanicæ scientiæ in medicina.

5. Solidæ & fluidæ corporis partes ex variis principiis vel elementis constant, internasque patiuntur mutationes, a propria compositione, insitisque ultimarum particularum viribus ortas, & chemicis legibus solummodo explicandas. Exinde chemia etiam in auxilium medicinæ advocanda est.

6. Instrumenta ad debitum effectum producendum in omnibus artibus requiruntur. Medicinæ instrumenta sunt remedia, quorum vires & compositiones in Materia Medica demonstrantur.

7. Ex hisce fundamentis patet, non solum usu, sed etiam corporum rerumque naturalium ratione, & ejus ad praxin applicatione, ipsi medicinæ opus esse. Nititur itaque experientia & ratione.

8. Medicina practica in duas partes aptissime dividitur. Prior præcepta ad sanitatis tutelam necessaria tradit, et appellatur Hy-

Sect. 2. ET MORBIS.

gieine. Posterior in morbis depellendis versatur : hæc denuo partitur in Pathologiam , quæ causas , differentias , & effecta morborum explicat ; & in Therapeiam , quæ morbos medendi leges & methodum docet. De quibus ordine dicam.

S E C T. I I.

*De Hygieine , vel tuenda sanitate.*

1. **S**ANITAS est vigor actionum , tam corporis quam animi ; a libero , æquali , & temperato solidorum & fluidorum motu proveniens : quæ talem motum in solidis & fluidis custodiunt , certissima secundæ valetudinis præsidia deveniunt.

2. Secunda valetudo conservatur & firmatur , si diligenter attendamus ad sequentia : habitum animi ; ingesta , videl. cibum et potum ; externe applicata , nempe aerem , vestitum , & balneum frigidum ; excreta videl. feces , urinam ; perspirationem insensibilem , menses , hæmorrhoides , semen ; exercitationem ; somnum ; & ad quasdam hominum rerumque varietates.

3. Animi facultates vel agunt , vel patiuntur. Agunt imaginatio , pathemata , & ratio : ab his ergo solis corpus afficitur.

Imaginatio , pulchrorum pulcherrimi Opificis operum contemplatione quotidiana , artibus naturæ imitatricibus , varietate grata ;

mutuo inter amicos & sexus commercio, recreationibusque innocuis, excitata, neque nimis languescere, neque in una re nimis inhærescere permittitur.

Pathemata in duas classes dividuntur. Prior, quæ complectitur iracundiam, indignationem, furorem, desiderium, amorem, &c. ad actionem incitat. Posterior, ad quam pertinet metus, terror, mœror, desperatio, &c. ab actu reprimat. Pathemata illa, Incitantia appellata, sanguinis circuitum excitant, fibras constringunt, humores attenuant, & secretiones promouent. Hæc, Reprimentia vocata, ab externis injuriis avocant, & humores a prioribus calefactos sedant, vel exhaustos restituunt. Inter omnes eminent spes & gaudium, propter salutes effectus. Talia a pathematibus oriuntur commoda, si recta ratione gubernentur.

Ratio ipsa, animi corporisque rectrix, disciplina eget; & ubi inquietæ cogitationi, nimio litterarum studio, abstrusis speculationibus metaphysicis vel mathematicis, sese totis viribus committit, corpori inimica est. Cogitationes severæ hilarioribus interpellandæ sunt.

4. Alimentorum ratio in quantitate & qualitate habenda est.

Prodest bis vel ter die, potius quam semel, cibum capere; & semper quampluri-



num , dummodo hunc concoquat ventriculus. Nunquam utilis est nimia satietas ; sæpe inutilis nimia abstinencia. Posterior priore perniciosior. Quantitatis moderatrix est vis ventriculi digerens.

Nutritioni optime inferviunt alimenta blanda & insipida , quæ mucilaginem vel gelatinam in sinu suo recondunt , et texturam non nimis firmam vel teneram possident. Hinc aquosa , terrestria , salina , & pingua , separatim , huic officio inepta sunt. Huic omnia indurata , fumata , salita , et condita , duabus de causis inutilia deveniunt ; quoniam et plus propter saporem assumitur , & quod modo par est , tamen ægrius concoquitur.

Cibus a durioribus melius incipit , ut abunde suppetat salivalis latex. Cœna requirit cibos facilioris solutionis , ne somnus , & independentes secretiones , turbentur.

Digestionem promovent sal commune marinum , acida ex vegetabilibus parata , & condimenta moderate sumpta , ventriculum stimulando , conjunctionem pinguedinis cum aqua promovendo , & mucositates incidendo. Sub finem digestionis convenit potus herbarum gratæ amaritudinis , uti Theæ , Cafæi , &c. non nimis calidus , ad reliquias alimentorum diluendas & abstergendas. Post satietatem , neque frigori , neque æstui , neque labori committatur corpus. Si quibus de causis futura sit inedia , labor omnis vitandus.

5. Potus ex aqua frigida, insipida, inodora, in bilance ventriculoque levi & subtili, molli, neque salinis putrescentibus, vel terrestribus particulis referta, omnibus aliis palmam præripit. Hujus poculum, tempore vespertino & matutino, post peractam digestionem, assumptum, ad sanitatem admodum conducit.

Athleticis arridet potus magis nutriens, uti cerevisia ex aqua molli præparata, lupulata, bene fermentata, minime ventosa, neque in actu fermentationis deglutita. Quo vetustior, ni ace scat, eo levior. Imbecilliorum ventriculus vino aqua diluto optime refocillatur; neque sedentariis adversatur larga vini optimi copia, dummodo debitis intervallis, ventriculoque non onusto, assumatur. Intemperantia in potione, quam in esca, tutior est. Calor lecti, equitatio, & elixir vitrioli nauseam hesterni lacchi abigunt.

Moderatus spiritus vini usus in corporibus & regionibus humidioribus calorem ventriculi excitat. Immoderatus ventriculum, corpus, animam, viresque genitrices enervat, et ad intempestivam senectutem perducit.

6. Eligendus, si fieri potest, aer elasticus, et ad barometrum gravis; temperatus, sed potius ad frigus quam ad calorem vergens; serenus et ficcus; campestris; purusque ab omnibus inquinamentis vegetabilibus, animalibus, vel mineralibus; persflabilis; solis ra-

diis expositus & penetratus ; ventis terrestres non aquosas plagas verrentibus sæpe agitur , subitisque cœli mutationibus haud obnoxius. Hinc sanitati male consulit , qui aeri incarcerato , nimis calido , & vaporibus animalibus repleto , se suosque assuefacit : aer enim externus & inevitabilis & necessarius , ideoque non fugiendus.

7. Sensationi potius quam rationi subjicitur vestium temperies. Quo mutabilior , frigidior , vel humidior aer , quo imbecillius corpus , eo calidiores requiruntur vestes. Sed in subitaneis vestium mutationibus , plerumque fere peccatur. Æstivæ , neque nimis cito assumendæ , neque nimis tarde deponendæ sunt : mundities , secretionis cuticularis gratum tutamen , quotidiana camisiæ carbasinæ mutatione custoditur.

8. Balneum frigidum , in hisce frigidis regionibus , quam utilissimum est , cutem durando , fibras constringendo , humores attenuando , calorem excitando , et secretionem augendo. Hæc perficit subito frigore , pondere fluidi undequaque premente , foridumque eliminatione.

9. Evacuationes , uti feces , urina , perspiratio insensibilis , menses , & hæmorrhoides , in debito moderamine continendæ sunt ; ne , his nimis suppressis , vasa impleantur , & particulis vitæ sanitatique infestis stimu-



8 DE SANITATE Pars I.  
lentur ; vel , nimis auctis , corpus tabescat ,  
& vires consumantur.

10. Concubitus rarus corpus excitat ;  
frequens solvit. Cum autem frequens non  
numero fit , sed natura , ratione ætatis &  
corporis , scire licet , eum non inutilem esse  
quem corporis neque languor neque dolor  
sequitur. Hanc evacuationem prohibent stu-  
dia nimis protracta , vigiliæ , inanitio , cra-  
pula , inebriatio , labor , ætas puerilis vel  
senilis , infirmitas , & omnia quæ debilitant.  
Suadent naturæ irritamenta , concoctio jam  
peracta , & quies instans.

11. Ad actionem a Summo Opifice hæc  
machina destinata & fabricata est : sanitas  
ergo ab actione inseparabilis. Motus appe-  
titum excitat , fibras roborat , humores at-  
tenuat , circulationem promovet , omnes humo-  
rum secretiones auget , animo vires addit ,  
& toti systemati nervoso gratam sensationem  
conciliat.

Exercitatio semper antecedere cibum , &  
ad levem sudorem aut lassitudinem , non ad  
fatigationem , protrahi debet. Fatigatis aptum  
est cibo humido , vino aqua tepida diluto ,  
balneis calidis , mutatione laboris & quoti-  
diano cubili uti. Sudanti frigidus aer , vel  
frigida aquæ potio , perniciosissima sunt.

Exercitationes in vehementes & lenes di-  
viduntur. Vehementes , uti cursus , pila ,  
saltatio , cæteraque hujus generis , ob vio-

lentam humorum agitationem, calorem intensum, & subitum refrigerium, periculo associantur.

Inter leniores enumerantur vectura in rheda, ambulatio, & equitatio; vectura imbecillibus quam sanis utilior est; sæpe inutilis in clauso vehiculo. Ambulatio, ubi per ascensum & descensum cum quadam varietate movetur corpus, nisi perquam imbecille, commodior est; sed vires quam maxime exhaurit, & exhaustæ non cito reficiuntur. Aliter accidit in equitatione, quæ in caput & pulmones, sed præcipue in viscera abdominalia, succussionibus repetitis, agit.

Clara vox inter exercitationes salutares ab antiquis maxime, sed fortasse immerito, celebratur. Huic anteposenda frictio, quia vires auget, non minuit, et secretionem cuticularem quam optime promovet.

12. Humores, quos labor dissipat & attenuat, somnus retinet & incrassat: hinc sanguificatio et nutritio in hoc statu optime perficiuntur. Tempus somno opportunum nox est, ad quem aeris insalubritas suadet, & tenebræ silentiaque invitant. Diurnitas mensurari debet animi corporisque laboribus prægressis, & præsentanea refectione. Somnus capiendus est in cubiculo amplo, temperato, & supra culcitram duriolem. Infantibus & senibus meridiari convenit, sed in lecto, non in sella.

13. Ratio quoque habenda est varietatis ætatum, corporum, consuetudinis, sexuum, temporum & climatum. Hæ hominum rerumque proprietates attentionem desiderant.

14. Infantibus puerisque diætā levissimā nutriens, partitis vicibus & non semel assumpta, alvus lubrica, somnus quantum fieri potest longissimus, immersio in aquam frigidam, arident. Cane pejus & angue fugienda inedia, purgantia fortiora, & vinum vel caro præcipue condita ad libitum.

Sanum hominem adultæ ætatis nullis obligare se legibus, sed varium vitæ genus habere oportet. Minus enim, quæ assumat, & quomodo curetur, interest.

Senibus carnes albæ dictæ, vinum meracius, frictiones, & calida lavatio, apta sunt. Tunc paulum cibo demendum, adjiciendumque potioni.

15. Ante omnia autem scire convenit naturam corporis; unumquodque enim suas proprietates habet. Diversa temperamenta diversimode regenda sunt. In sanguineo & cholericoprofunt pathemata reprimentia, abstinencia, diætā tenuis & refrigerans, potus multus aquosus; in melancholico et phlegmatico stimulantia & calefacientia, uti pathemata incitantia, motus, vinum, carnes conditæ, aromata, & frigida lavatio. In quamplurimis vitiatur vel labe hereditaria, vel prægressis morbis, aliqua corporis



pars, cui etiam in sanitate advigilandum.

16. Consuetudo est dispositio motus sæpe antea peractos iterum peragere; ideoque instar naturæ operatur. Nocet, quamvis per se non nocivum, quod contra consuetudinem est. Ergo cum quis mutare aliquid velit, paulatim debet assuefacere. Otiosa vita utilis non est, quia potest incidere laboris necessitas.

17. Diversitas sexus non negligenda est. Sexus enim mollior, utpote laxiore habitu & sensibiliore natura præditus, & vitæ sedentariæ addictus, stimulantia, corroborantia, & cibos eupeptos ficosque postulat.

18. Considerare quoque oportet tempus anni. Hieme, plus edere & meracius bibere convenit: utilius est cibus ficcis quam humidis, carnibus quam oleribus, calidis quam frigidis tunc uti. Vere, minus indulgendum cibo, magis porioni dilutiori, oleribus, & veneri. Æstate, cibo levissimo & exiguo, sed sæpius sumpto, potione dilutissima sitim sine calore tollente, frigidis & refrigerantibus corpus eget. Autumno, cibo paulo pleniore uti; minus sed meracius bibere; neque nocturno aeri, nisi bene vestito sese committere licet.

19. Diversæ regiones diversum victum postulant. In calidissimis, potio ex vino bene diluto vel spiritibus fermentatis dilutissimis, acida vegetabilia, & diæta tenuis; in

frigidissimis , vinum meracum , vel spiritus fermentati aqua parce diluti , diætā ex carne , & aromata profunt.

20. In gravibus tempestatibus fanitas , fuga & peregrinatione , sed ubi id non licet , modica exercitatione , vino moderate sumpto , diætā refocillante & corroborante , balneoque frigido , tuenda est ; evitatis aquosis , refrigerantibus , nocturno aere , solis calore , frigore , fatigatione , cruditate , venere , evacuationibus , & omnibus quæ contra consuetudinem sunt. Ex aere salubri in gravem , prima hieme ; ex gravi in eum qui salubris est , prima æstate ; transire melius est.

## P A R S S E C U N D A.

*De diversis morborum partibus.*

### S E C T. I.

*De morbis.*

1. **M**ORBUS est læsio actionum tam corporis quam animi , ab impedito , inæquali , vel immoderato solidorum vel fluidorum motu proveniens.

2. Hæc medicinæ pars , quæ morbos tractat , in morborum cognitione & curatione tota versatur : hinc in pathologiam & therapeiam distinguitur. Prior ordine pathologia , posterior therapeia ; quia ante cognos-

cendus quam curandus est morbus. De his quædam in genere dicenda , quo minor ipsam morborum historiam & curationem exsequentibus mora sit.

3. Ut recte cognoscantur morbi , requiritur notitia causarum morbificarum , loci affecti , symptomatum , criseos , diagnoseos , & prognoseos. Hinc pathologia , omnia quæ ducunt ad plenam morborum cognitionem comprehendens , in has diversas partes distribuitur.

## S E C T. I I.

### *De causis morbificis.*

1. **Q**uia nulla motus mutatio fit sine causa , morbus causas morbificas necessario præsupponit , quarum cognitio medico summe utilis est. Is enim recte curaturus , quem prima origo causæ non fefellerit.

2. Causa morbifica est illa , quæ suis innatis viribus motus naturales vitiat , & ad morbi generationem confert.

3. Motus morbofi non prorsus his causis morbificis ascribendi sunt , sed solummodo eorum defectus vel excessus supra motus sanos : motus enim præternaturalis ex binis motibus , naturalibus & morbofis , oritur. Prudentis itaque medici est , naturalem æque ac morbosum statum , cognoscere.



4. Tres ab antiquis medicis enumerantur causæ morbificæ, nec immerito: causæ remotæ, causæ prædisponentes, & causæ proximæ. Causæ remotæ, externæ, *προκαταρκτικαί*, præincipientes, occasionales quæque dictæ sunt illæ, quæ corpori humano antea disposito applicatæ morbos excitant. Causæ prædisponentes, antecedentes, vel *προηγμέναί*, sunt illæ, quæ ita corpus disponunt, ut aptum morborum motibus concipiendis, si applicentur causæ remotæ, evadat. Causæ proximæ, continentes, formales, abditæ vel internæ dictæ, sunt illæ corporis læsiones, quæ immediate symptomata morbosa excitant, & a binis causis præcedentibus originem habent: sed semel productæ, suis viribus permanent.

5. Hæ diversæ morborum causæ haud confundi debent; quia quandoque una, quandoque altera, opem medici speciatim poscit. De his ergo summatim tractandum est.

### SECT. III.

*De causis morborum remotis.*

I. **P**rimum locum merito tenent pathemata animi violenta; quia nihil citius motus solidorum & fluidorum placidos perturbat. Effectus quos producant sensibus patefcunt; sed modus operandi adhuc in tenebris jacer, & fortasse semper jacebit.

Ira fibras constringit , motum sanguinis accelerat , sanguinem ad superiora determinat , dolorem in scrobiculo cordis excitat , & spasmodicas strictureas in ventriculo , ductu cholidocho , & intestinis concitat. Hinc larga salivæ copia , oris amarities , vomitus bilis , volvulus , apoplexia , phrenitis , febris.

In amore pectori altius infixio , alta trahuntur suspiria , cor pulsusque tremunt , vultus rubore et pallore alternatim tingitur , vox faucibus supprimitur , oculi tenebris velantur , gelidi erumpunt sudores , & somnus , quamvis enixe vocatus , usque ad auroram deferit. Inde secretiones perturbatæ , tabes , appetitus prostratus , melancholia , infania.

Mœrore pectus occupante , fibræ relaxantur , motus humorum retardatur , valetudo & venustas aufugiunt , ventriculus & intestina debilitantur flatibusque distenduntur , alta trahuntur suspiria , lumina subsidunt , genæ pallescunt , corpusque mortui potius quam viventis speciem fert. Hinc pulsus debilis , appetitus deletus , debilitas , perspiratio cohibita , frigus extremitatum , tabes , polypus , omnesque morbi qui a solidis debilitatis proveniunt. Commotionum omnium mœror corpori infestissimus est.

In timore & terrore , solida debilitantur , fluidorum motus reprimitur , contremiscunt artus , gelidi effunduntur sudores , sanguis circa cor et pulmones accumulatur , feces

& urina involuntarie elabuntur, totaque machina quam maxime relaxatur. Hinc cordis palpitaciones, debilitas, anxietas, spirandi angustia, lethargus, animi deliquium, mania, mors.

Pudor mœrori affinis est, & ejus effectus aliquatenus participat. In hoc pathemate sanguis ad caput determinatur: forsitan adest quoque insolita minimorum vasorum faciei cervicisque vibratio. Hinc roseus genarum color, sensuum externorum internorumque confusio, & apoplexia.

Invidia componitur ex desiderio, ira, & mœrore; & uti debilitatem ultimi, ita febrilem commotionem priorum participat. Hinc oritur hectica febris, quæ vires consumit.

Imo gaudium, dulcis curarum proscriptor, si subitum & immoderatum fit, adeo vires deterit, ut mania vel insperata mors nonnunquam sequatur.

2. Diuturni & profundi animi labores cerebrum & nervos debilitant, robur corporis consumunt, ventriculam viresque concoctrices destruunt, secretiones impediunt, & veneri inimicissimi deveniunt. Hinc cupidi litterarum flatulentis, malo hypochondriaco, paralyti, corporisque gracilitati obnoxii sunt.

3. Alit in suo sinu natura res, quamvis exiguae molis, corpori infestissimas, venena dicta,



dicta, quæ ob celerem operationem proximum locum merentur. Dividuntur in tria genera: vegetabilia, animalia, & mineralia. Inter vegetabilia enumerantur opium, hyoscyamus, solanum lethale, datura, cicuta aquatica, & aconitum cæruleum. Hæc immediate in ventriculi & intestinorum nervos suis partibus phlogisticis agunt. Inter animalia enumerantur morsus canis rabidi, viperæ, serpentum & tarantulæ; horum venenorum natura adhuc ignota est. Inter mineralia, acida sincera, cobaltum, diversæ arsenici species, mercurius sublimatus corrosivus, & vitrum antimonii; hæc operantur primas vias caustico sale corrodendo.

4. Ad hanc classẽ referenda sunt quædam medicamenta venenatam vim possidentia, uti tartar. emetic. scammonium, resina jalappæ, gummi guttæ, helleborus albus & niger, colocynth. semen cataputii, mercurialia, &c. quæ aliquando iisdem symptomatibus ac venena constipantur, uti anxietatibus, pulsu debili & celeri, singultu, spasmis & convulsionibus, inflammationibus, & ventriculi intestinorumque gangrænâ. Ob hanc causam vitanda sunt. Saturnina, ob vires venenatas, certas quamvis lentas, caute admodum interne exhibenda. Caustico sale ditantur cantharides; ideoque summa cum cautela interne usurpandæ sunt.

5. Aeris diversæ qualitates & mutatio-

nes morborum multorum causæ deveniunt.

Aer gravitate peccans sanguinem accelerat, pulmones nimis dilatat, & vasa cutanea comprimendo majorem sanguinis ad cerebrum fluxum efficit. Hinc pleuritides, peripneumonix, anginx, capitis dolores, vertigo, & apoplexia. Aer levitate peccans sanguinis circulationem retardando, & resistenciam externam humoribus intra vasa pulmonalia contentis minuendo, hæmoptysin, hystericam passionem, rheumatismum, podagram, & febres intermittentes nervosasque gignit.

Aer nimis calidus, particularum ignificarum introductione, fibras laxat, molem humorum amplificat, sanguinis circulationem incitat, perspirationem insensibilem adauget. Hinc dissipatio liquidissimæ sanguinis partis; adunatio remanentis; debilitas; salium multiplicatio & acrimonia; oleorum attenuatio & corruptio. Si diu persistet hic aeris status, vel subito adveniat frigus ad impediendum particularum noxiarum exitum, tunc oriuntur febres ardentes, biliosæ, &c.

Aer nimis frigidus topicas inflammationes, præcipue anginas, pleuritides, peripneumonias producit, pulmones sua gravitate nimis distendendo, fibras constringendo, humores condensando, & perspirationem minuendo, particularum frigorificarum introductione. Harum existentia probatur ab aucta aquæ in

glaciem conversæ mole ; a qualitatibus aquæ regelatæ propriis ; ab aqua in vacuo vix congelante ; ab artificiosis glaciem producendi methodis ; ab instabilitate gradus frigoris , quo congelatio vel regelatio fit in diversis temporibus & diversis regionibus. An hæ particulæ frigorificæ salinæ naturæ sint ? Rationi experimentisque consentaneum videtur.

Nimia siccitas solida desiccat , humores inspissat , & ad febres disponit. Nisi in aridissimis regionibus hæc mala vix sentiuntur.

Omnium perniciosissima est nimia humiditas , quæ cuti & pulmoni externe applicata , per venas bibulas intus assumpta , totique corpori interne applicata , fibras laxat & debilitat , perspirationem minuit , & humores nimis aquosos reddit. Hinc gravedo , tussis , asthma , phthisis , hydrops , & febres intermittentes , remittentes , nervosæque. Ex antedictis harum atmospheræ qualitatum complicationes diversæ & effectus patebunt. Frigus humidum valetudini plus infestum est quam siccum , quia perspiratio magis impeditur. Sed calidus , humidus , & levis aer omnium complicationum corpori infestissimus est , ob naturam summe relaxantem et putrefacientem.

6. Hinc patet quare certis anni temporibus certi grassantur morbi. Hieme enim tempestas sicca & frigida : vere , frigida &



humida : æstate , calida & sicca : autumnō , calida & humida. Hinc quoque patet , quare venti ad morbos producendos multum contribuunt : alii enim levem , alii gravem ; alii calidum , alii frigidum ; alii siccum , alii humidum aerem advehunt. Eorum notitia patet à loci diversa latitudine , expositione , et situ respectu aquarum.

7. Præter has evidentes aeris qualitates , adfunt aliæ non minus ad destruendam sanitatem efficaces , quamvis non sensibus patent , neque instrumentis patefaciendæ. Tales sunt particulæ morbificæ , miasmata dicta , aeri innatantes.

Inter has eminent putrida effluvia ex putrefactis animalibus , vegetabilibus , vel aquis stagnantibus paludosis , sicciscentibus. Hæ particulæ , ex sale pungente et oleo fœtidissimo compositæ , eandem putredinosam fermentationem , quantum fieri potest ob motum humorum , chyli novi introitum , & secretiones , excitare moliuntur. Inceptam , durante vita , demonstrant symptomata putridæ febris & pestis.

Fossilia subterranea , qualia sunt diversi sales , olea & metalla ; aliaque adhuc ignota corpora , vel simplicia vel inter se composita , morbifica effluvia diversi generis emittunt. Hæc experientia fossorum metallicorum , vaporibus noxiis a quibusdam locis provenientes , & multorum morborum origine

confirmatur. Hic referri debent vapor sulphuris accensi, & parietum nuper calce ex-  
structorum.

Quædam miasmata morbifica, uti vario-  
larum & morbillorum, aliarum regionum in-  
digenæ, per aerem propagantur, sese in cor-  
pore humano multiplicant, iterumque viri-  
bus auctis exeunt ad eosdem morbos propa-  
gandos. Aliquando magis, aliquando minus,  
secundum aeris & corporum dispositionem,  
agunt, sed nunquam omnino debellantur.

Cogitatione depingi, sed non demonstrari  
possunt, diversæ aeris mutationes, ab ipsis  
salinis, oleosis & aquosis particulis inter se  
conjunctis, & fortasse in corruptionem quan-  
dam aliquando tendentibus. Haud sanæ philo-  
sophiæ incongruum videtur, multos referre  
morbos solis & lunæ attractioni, & materiei  
subtili noxiæ cum radiis luminis ab his ad-  
vectæ.

Hæc morbifica effluvia agunt in super-  
ficiem corporis secundum copiam, subtili-  
tatem, celeritatem, motum & figuram  
particularum; & ad sanguinem deferuntur,  
1<sup>o</sup>. Per primas vias, a viscida & fermenta-  
tionem promovente saliva; 2<sup>o</sup>. Per poros  
cutis; sed præcipue; 3<sup>o</sup>. Per vasa bibula  
pulmonum, ob majorem superficiem, mu-  
cum illinentem, & nisum contra aerem in  
expiratione.

8. Confert quam maximè ad morbos pro-

ducendos evacuationum naturalium defectus, vel suppressio. Retentio fecum producit flatum, cruditates, inflationem præcordiorum, dolores ventriculi & capitis: urinæ, hydropem, anasarcam, & febres: perspirabilis materiæ, torporem, gravitatem, tussim, rheumatismum, febres, omnesque fere morbos: mensium, phthisin, vomitum, vel sputum sanguinis, chlorosim, hysterica affectionem, cachexiam, hecticam febrem, &c.: hæmorrhoidum, asthmata, hypochondriacum malum, pleuritidem & peripneumoniam: lochiorum, pathemata hysterica, dolores ventris, inflammationes, febres, purpuram. Hi morbi originem habent vel a plethora, vel a particulis acribus retentis, vel ab utrisque.

9. Uti in sanitate, ita in morbis, videlicet tinea capitis, podagra, rheumatismo, scabie, erysipelate, variolis, morbillis, bubonibus pestilentialibus, fiunt salutare ad exteriora evacuationes: quibus repulsis, sæviora quam antea excitantur symptomata, ob majorem noxiarum particularum propinquitatem, & corruptionem stagnatione auctam.

10. In alimentis duplici modo peccatur, copia & qualitate.

Nimia satietas ventriculum distendit, motum vermicularem impedit, & vicinas partes comprimit; hinc cruditas, flatum, acida



vel putrida secundum naturam alimentorum fermentatio, vomitus, diarrhœa, gravedo, dolorque capitis, & plethora.

Sed nimia abstinencia pejora mala accersit, debilitatam ventriculi, ciborum rejectionem, evacuationum obstructionem, humorum acridinem, putrefactionem, & febres periculossimas.

Acida immoderate sumpta ventriculum debilitant, alvum constipant, chylum & humores coagulant, omnesque secretiones impediunt. Dulcia facillime acescunt, humores glutinosos reddunt, vermes producunt, & dentes corrumpunt. Tenacia, qualia omnia farinacea, panis non fermentatus, ligamenta & tendines animalium, caro vel piscis indurata, fumata vel salita, caseus novus, & opus pistorium, chylum nimis viscidum præbent: hinc morbi primarum viarum, obstructiones, cachexia, leucophlegmatia, & scorbutus. Spiritus fermentati humores coagulant, fibras excitant, et molem humorum augent: hinc scirrhusitates omnium viscerum, sed præcipue ventriculi, hydrops, atrophia, paralysis, apoplexia & febris hæctica.

11. Vigiliæ nimis protractæ lædunt nervos, perspirationem impediunt, fibras laxant, et humores acres reddunt. Hinc plerique morbi chronici.

12. Hæ causæ morbificæ, aliæque quot-

quot sunt, agunt in vasa & humores vel mechanicis viribus, quatenus solida corpora; vel chymicis viribus, quatenus qualitates quædam corpus nostrum respicientes possident.

Vires mechanicæ agunt numero, tenuitate, figura & pondere particularum. Ad hanc classẽ reducuntur sales caustici & venenati animalium vel vegetabilium; effluvia mineralia e terræ visceribus; spiritus acidi minerales; fumi e carbonibus vel sulphure; effluvia e muris calcariis nuper extructis; et venena mineralia, vel medicamenta veneni vim habentia.

Vires chymicæ multifariam agunt; sed præcipue, 1. Adunando & coagulando humores, uti particulæ frigorificæ, spiritus fermentati, acida omnia, perspirabilis materia retenta, et quædam febrifica miasmata. 2. Separando et dissolvendo humores, uti particulæ calidæ aquosæ, scorbuticæ, quædam salium et venenorum species, quædam miasmata febrilia, omniaque fere pestifera. 3. Acidam fermentationem in primis viis excitando, uti vegetabilia acescentia, omnia dulcia, vinum austerum, et acida. 4. Putridam fermentationem intra vasa producendo, uri putrida effluvia. 5. Alios motus fermentativos in sanguine concitando, quibus multiplicantur causæ morbificæ, uti accidit in rabie canina, lue venerea, scabie, morbillis, variolis, omnibusque morbis contagiosis.

## S E C T. I V.

*De causis prædisponentibus.*

1. **E**ffectus causarum remotarum vel diminuantur vel augentur secundum naturam corporis quod occupant. Hinc causarum prædisponentium notitia scitu necessaria est.

2. Omnibus morbis obnoxia maxime est infirmitas: minime firmitas.

3. Figura corporis externa ad quosdam prædisponit morbos, uti cervix longa, & thorax angusta planaue ad phthisim; brevis cervix ad apoplexiam; obesitas ad asthma, & gracilitas ad laterum dolores.

4. Ubi fibræ nimis strictæ & elasticæ circulationem accelerant, calorem augment, sanguinem compingunt & adunant; rubrorum globulorum quantitatem & inflammabilitatem adaugent, plethoram producunt, & serum glutinosum reddunt; ibi disponitur corpus ad inflammationes, pleurism, rheumatismum, & febres acutas inflammatorias. Ubi, contra, aquosa sanguinis pars prævalet, & lentescit, deficiuntque secretiones ob nimis laxam fibrarum compagem; in hoc solidorum & fluidorum statu pertimescendæ sunt cachexiæ, hydropes, tumores œdematosi, intermittentes, remittentes, & febres lentæ, nervosæ dictæ. Hinc temperamentorum diversorum morbi deducendi sunt.



5. Fabrica delicata, nervis voluptates & dolores exquisite sentientibus donata, hæmoptysi & phthisi pulmonali sæpe tentatur.

6. Sanguis dissolutus, minime cohærens, lividus, cito putrescens, & in crassamentum serumque minime secedens, scorbuto, largis hæmorrhagiis, dysenteria maligna, & febribus putridis tentatur.

7. Uti divitiis, ita morbis parentum liberi succedunt. A quadam enim hæreditaria solidorum & vasorum minimorum structura prædisponitur corpus ad hystericum & hypochondriacum malum, calculum, phthisim, epilepsiam, strumam, rheumatismum, & podagram.

8. Nonnulli morbi aliis morbis viam sternunt; ut asthma, hydropi; remittens vel intermittens febris, malo hysterico vel hypochondriaco, tumori lienis & hydropi; colica, paralyfi; variolæ & morbilli, oculorum inflammationi & phthisi. Pars aliqua, semel vitiata vel debilitata morbo, a leviori causa semper postea vitiatur.

9. Diversæ ætates diversis morbis opportunæ sunt. Ætas infantilis dentitioni, vermicibus, rachitidi, morbo ab acido, convulsionibus & strumis. Acutis morbis adolescentia; sed longis, uti tussi, scabiei, hydropi, asthmatis, obstructionibus, senectus patet.

10. Prædisponuntur feminæ ad chlorosin, hystericum malum, plethoram, motus

spasticos convulsivos, morbos nervosos, & pathemata animi violentiora.

## S E C T. V.

*De causis morborum proximis.*

1. **C**Ausarum proximarum, effectus morbosos immediate excitantium, notitia medico utilissima est, quia in affectionis & remediorum cognitionem amplissimam eum deducit.

2. Antiqui medici in causis proximis adeo hallucinati sunt, ut Empirici hanc quaestionem quasi incomprehensibilem, ideoque supervacuam, rejecerint. Huic disputantium errori & discordiae originem praeberunt inscitia circuitus sanguinis, & parum usitata, ob superstitionem, cadaverum inspectio. Neque melius merentur de medicina recentiores, qui morbos deduxerunt ab alkali acido intra venas, quia non adhuc certis experimentis constat, alkalinos vel acidos sales humoribus nostris sanis vel morbofis inesse; deleterio aliquo; furibundo archeo; discursivo spirituum motu; calidi innati defectu; qualitate humorum maligna; aliisque ineptiis.

3. Causae morborum proximae investigandae sunt, 1. A natura & viribus causarum remotarum praecognitis. 2. A diversis

morbi symptomatibus inter se collatis, & ad unam simplicem causam severo ratiocinio ductibus. 3. A remediis & perniciosis & salutaribus, durante morbo, applicatis. 4. A mortuorum sectione. In posteriore cavendum est ne effectus causarum pro ipsis causis habeantur.

4. Ingenue tamen confitendum est, causas quæ morbos immediate excitant plerumque difficiles, aliquando inscrutabiles esse, ob abditam subtilissimam suam naturam, ipsarum mutabilitatem, & concatenationem effectuum qui a causis remotis pendent: ideoque illa non semper scientia comprehendunt, sed conjectura sæpe persequuntur medici. In tam incerta & obscura quæstione, verecundia & diffidentia potius quam opinionis tenacitas mortalibus cæcis conveniunt. Quamplurimas vero generales causas experientia confirmavit.

5. Inter has ob frequentiam merito primum locum occupant stases vel stagnationes diversorum humorum. Stasis vel stagnatio sanguinis producit febres inflammatorias, secundum partes affectas, discrepantes: feri, spasmos, rheumatismos acutos & chronicos, hydropes, anasarcam, lippitudinem, tussim, dolores dentium: lymphæ, hydropes, tumores glandularum: liquidi nervosi, vertiginem, apoplexiam, & paralyfim.

6. Nimia sanguinis copia, a nutriente diæta, quiete, & evacuationum suppressione,



orta, vasa totius corporis, sed præcipue viscerum abdominalium, ubi segnior circulatio, distendit & infarcit: hinc debilitas, gravitas, capitis dolor, insomnia turbulenta, respiratio difficilis, malum hystericum & hypochondriacum, polyposæ concretiones, inflammationes, febres.

7. Nimia salium acrium in sanguine copia, a diætâ salita, liquoribus fermentatis, medicamentis calidis & evacuationibus suppressis, generata originem præbet multis morbis, videl. cutaneis eruptionibus, rheumatismo, podagræ, defluxionibus acribus, doloribus colicis, marasmo, & feбри hecticæ.

Ab acidis salibus in primis viis stabulantibus oriuntur flatus, distentiones, anxietates, tormina ventris, feces viridæ, debilitas, tinea capitis, in infantibus, diarrhœa, & in adultis venter plerumque constipatus.

8. Plurimæ causæ reinotæ, præcipue febriles, agunt in corpus adunando vel dissolvendo sanguinem. A nimia adunatione producuntur obstructions, dolores, inflammationes, polyposæ concretiones, secretionum naturalium diminutio, febres inflammatoriæ; a nimia dissolutione, secessus in vasa lateralia serosa, maculæ purpureæ, frequentes sanguinis irruptiones, scorbutica symptomata, & febres malignæ putridæ.

9. Tumores interni, duri, scirrhusi, diversorum viscerum destruendo functionem,

partis affectæ vitiando sanguinem, & comprimendo vasa vicina, varios morbos, sicuti hydropes, asthmata, flatus, variaque secundum locos affectos symptomata, excitant.

10. Suppurationes internæ multorum morborum causæ existunt, quales sunt febres hecticae cum remissione & exacerbatione, sudores nocturni, marcor, & appetitus prostratus.

11. Calculi in vesica fellea vel ductu communi cholidocho, nauseam, icterum, vomitum, dolorem in dextro hypochondrio, alvi obstructionem & respirationem difficilem; in renibus, ureteris & vesicæ dolores, inflammationes, vomitus, ulcera, urinam sanguineam, & urinæ suppressionem excitant.

12. Polypi sæpissime occupantes thalamos cordis, arteriam pulmonalem, uterina vasa & sinus cerebri, subitas palpitationes, dolorem pectori infixum, inæquales & intermittentes pulsus, anxietatem, dyspnœam & lypothymiam, concitant.

13. A vermibus imprimis viis præcipue nidulantibus originem trahunt tormina ventris, febres erraticæ, convulsiones, appetitus auctus, & erosiones intestinorum.

## S E C T. V I.

*De causarum morbificarum sede.*

1. **C**orporis humani partes, quæ in unoquoque morbo a causis morbificis præcipue afficiuntur, detegendæ sunt; quia ad symptomatum rationem, prognoseos certitudinem, & remediorum applicationem intelligendam, hæc notitia medico conducit.

2. Omnes causæ morbis inferendis accomodatae agunt, vel in partes solidas, vel in fluidas.

3. In patribus solidis præcipue sedem suam habent morbi chronici & lenti, hæreditarii & quotquot a causis mechanicis, uti venenis multis, acribus ingestis, punctione, saturatione vel erosione, originem suam trahunt.

4. Fluidis & humoribus præcipue inhærent morbi febriles, qui cito terminantur, & qui ab aeris qualitatibus vitiatas vel contagio originem habent. In sanguine rubro febres inflammatoriæ & putridæ: in sero, febres lentæ, rheumatismi, & podagra: in lymphâ & glandulis lymphaticis, lues venerea, & causæ aliquæ pestilenciales, uti patet glandularum lymphaticarum tumefactione: in liquido nervoso, febres malignæ nervosæ, pestes multæ, effectus odorum, multaque venena, qualia opium, hyoscyamus, & so-



lanum : hæc sedes est omnium pessima & periculosissima ; quia ab hoc fluido spirituofo corporis vires pendent.

5. Plurimis morbis sedem præbent partes nervosæ & membranaceæ , quæ motui & sensationi immediate dicantur : cerebrum , epilepsiis , infantiis , affectibus soporosis , apoplexiis ; nervi spasmodicis , convulsionibus , tetano , palpitationibus , asthmati convulsivo , vomitui , malo hysterico & hypochondriaco , paralyfi.

6. Nulla corporis pars tantum morbis patet , quantum canalis iste membranaceus , e ventriculo & intestinis compositus. Hic enim possidet multas plicas & flexuras ad retardandas causas morificas : hic peculiari etenim & admodum lenta circulatione donatur : in hunc descendit aer particulis morbosis sæpe repletus : in hunc descendunt alimenta & potus diversæ naturæ , quæ sæpe in acidam , sæpe in præmaturam putredinosam fermentationem ruunt : huic quoque adsunt diversi liquores , uti saliva , succus pancreaticus , bilis utraque , alique humores naturæ valde fermentescibilis : in hoc semper corrumpitur fibrosa ingestorum pars. Sedem ergo præbet cardialgiæ , anxietatibus , flatibus , spasmodicis , colicis doloribus , ilio , iliacæ passioni , diarrhœæ , dysentericæ , capitis dolori , & vertigini.

## S E C T. V I I.

*De symptomatibus morborum.*

I. **E**ffectus præternaturales qui oriuntur durante morbo, symptomata vocantur. Hæc simul concatenata morbum constituent; neque, pace Galeni, symptoma a morbo, aliter quam pars a toto, differre mihi videtur.

2. Hæc morborum symptomata vel sensatione ægrorum percipiuntur, vel adstantium sensibus patefcunt, vel cadaverum inspectione deteguntur. In hæc cavendum ne causæ cum symptomatibus confundantur.

3. Effectus, qui immediate a causis morbosæ oriuntur, vocantur symptomata causæ: hæc symptomata rursus causæ deveniunt aliorum symptomatum, quæ appellantur symptomata symptomatum.

4. Omne symptoma consistit in læsione aliqujus actionis vel vitalis, vel naturalis, vel animalis.

5. Hæc symptomata accurate, plene, sine ulla ratiocinatione, & eodem ordine quo sæpiissime extiterunt, describenda sunt. Advertendum enim est, quod omnia non semper in unoquoque, neque in eodem ordine, ob varias corporum naturas, existunt.

6. Diversæ medendi methodi diversa in eodem morbo excitant symptomata. Hæc

adventitia phænomena a symptomatibus morbo peculiaribus & perpetuis accurate distinguenda & fecernenda sunt. Hoc nisi fiat, judicium circa morbos devenit incertum.

## SECT. VIII.

### *De symptomatum genealogia & ratione.*

1. **P**ost nudam & fidelem symptomatum descriptionem, ad eorum originem & rationem transeundum est, cujus cognitio medico conducit ad firmandam prognosim, & ad mitigandam vel tollendam symptomatum vim.

2. Omnia deducenda sunt symptomata ab actione causæ proximæ, & reactione partium affectarum ad hanc causam excutiendam; infitis enim viribus sentit & expellere nititur omne nocivum machina nostra artificiosissima.

3. Hinc ad explicanda symptomata necessario requiritur notitia qualitatum causæ proximæ mechanicarum, vel chymicarum, & naturalium actionum corporis humani. Hisce solis, & non hypothesebus vanis, extruitur vera symptomatologia.

4. Sed magna adest symptomatum caterva, quæ non in loco primarie affecto, sed in consentiente sese monstrant; ideoque symptomata per consensum vel sympathiam appellantur. Connectuntur & consentiunt va-



Sect. 9. ET MORBIS. 35  
riæ partes ope tendinum, ligamentorum,  
& nervorum; quorum situs & distributio,  
præcipue quinti octavique paris, & inter-  
costalis nervi, has sympathias pateficiunt.

## S E C T. I X.

### *De crisi.*

1. **C**Risis est morbi mutatio, plerumque  
subita, vel in salutem, vel in mor-  
tem. Hinc bona, vel mala, secundum even-  
tum. In priore sensu ab hodiernis medicis  
fere intelligitur.

2. Acutos & febriles morbos, rarissime  
chronicos, comitantur crises, quamvis in  
hisce quoque aliquando conspiciuntur; hy-  
drops enim judicatur diarrhœa, vel cutis  
disruptione; apoplexia sudore; & icterus al-  
vo soluta. Neque in omnibus febribus, præ-  
cipue longis & lentis, crisis accidit sensi-  
bilis.

3. Crisim in acutis plerumque præcedit  
magna perturbatio, symptomatumque exacer-  
batio omnium, quibus, si fausta sit crisis, de-  
finientibus succedunt copiosi sudores; urina  
sedimentum ad fundum vasis deponens; al-  
vus soluta; vomitus; salivatio; secretio mu-  
ci glandularis e naribus, trachia, vel pul-  
monibus aucta; hæmorrhagia narium, ute-  
ri, vel vasorum hæmorrhoidalium; pustulæ,

tumores, aphthæ, vel bubones, quæ vel mitigant vel tollunt febrem.

4. Hinc patet quomodo evacuationes criticæ ab evacuationibus morbosis distinguendæ sunt, nempe allevatione morbi, quæ priores sed non posteriores comitatur. Hisce enim morbi plerumque in pejus ruunt.

5. Causæ morbificæ summo vigore in vasa agentes, & vasa summis viribus contra renitentia, perturbationem criticam excitant. Si viribus vasorum ita collectis resistunt particulæ febriles, crisis devenit infausa. At si motu mutantur, vel calore digerantur, vel aliarum particularum combinatione mitigentur, ut pro noxiis innoxiae fiant, tunc diminuitur febrilis motus febrisque symptomata, cessant spasmi, viæ excretoriæ magis patulæ deveniunt, auctaque aliqua evacuatione elabitur materia morbifica, ad secretionem jam aptata, vel, secundum antiquos, concocta. Hinc nullæ profunt evacuationes sive naturales, sive artificiales, nisi causas morbi abluant.

6. Hic agitur controversia inter Medicos Stahlianos & Mechanicos. Priores crisin & expulsionem causarum morbificarum animo rationali; posteriores legibus mere mechanicis, sine ejus interventu, attribuunt. In hac disputatione, ut in omnibus fere aliis, media quodammodo inter diversas sententias tenenda est opinio: nam animus, quamvis

non conscius , motum vasorum necessario accelerat ; cætera omnia motus auctus perficit.

7. Sed majoris momenti disputatio olim inter antiquos medicos , & nunc inter hodiernos agitur , Num certi dies critici , necne , sint ? Hippocrates ejusque affeclæ in diebus quaternariis , videl. quarto , septimo , undecimo , quarto decimo , decimo septimo , vigesimo primo , &c. calculo a febris rigore desumpto , crifim fieri , hancque magis salutarem futuram esse in his quam in aliis ; & præcedentem quaternionem , quodcunque in futuro obtingit , indicaturum , ideoque diem indicem appellatum fuisse : Hippocratis vero æmuli hanc doctrinam , ut vanam , repudiantes , neque in ullo die vel magis vel minus periculi adfuturum asseruerunt. In tanta opinionum diversitate , non rationem , sed experientiam sequi ; & morborum historias adire debemus. Hæ , seu ab antiquis seu modernis conscriptæ , sæpius in his quaternariis , quam in aliis diebus , crifes accidisse testantur ; ideoque prudentis medici est ad dies hosce præcipue attendere.

8. Errant hi qui a perfectione numerorum vel solis lunæque conjunctionibus , criticos dies deducebant. Tempus nihil aliud est nisi mensura motuum quibus crifes perficiuntur ; & quia definitus motuum numerus ad causarum morbificarum expulsionem requiri-



tur, ideoque definitum tempus. Quod definita motuum repetitio hunc effectum producere valet, a voluntate Dei ter opt. max. pendet, qui hanc rerum seriem æternis legibus ligat.

9. Multa ad accelerandam; vel postponendam crism valent. Accelerant ætas juvenilis, corporis caliditas vel sensibilitas, vis morbi, calor vel siccitas regionis, & medicamenta stimulantia. Postponunt temperamentum phlegmaticum, ætas senilis, frigida vel humida regio, victus crassus, nimiaque evacuationes.

## S E C T. X.

### *De diagnosi.*

1. **D**iagnosis est ea pars pathologiæ quæ tractat de specifica morborum consimilium natura & differentia. Sine hac scientia nulla stabilis institui potest prognosis vel therapeia, & medicus adstantibus sæpe ludibrio fit.

2. Extruitur diagnosi omnium symptomatum notitia, sed præcipue eorum quæ semper morbum concomitantur, & ob hanc characteristicæ vel pathognomonica dicenda sunt. Hæc symptomata characteristicæ in diagnosi semper enumeranda sunt.

## S E C T. XI.

*De prognosi.*

1. **P**rognosis est scientia signorum, quibus ea, quæ ægro eventura sint, præcognoscimus. Nihil magis confert ad morborum vel symptomatum medelam, quam eorum prævisio; nihil magis confert ad medicī famam, quam futurorum prædictio: & merito; maximam enim in morbo experientiam, rationemque sanam demonstrant.

2. In hac pathologiæ parte maximam meritis est, & acquisivit laudem Hippocrates ab omnibus medicis, & antiquis & recentioribus; quamvis nonnulla in curationibus mutarint, tamen illum optime præfagisse fatentur. Omnibus attamen ejus prognosticis haudquaquam fidendum est; plurima enim fallunt ob diversitatem regionum & corporum; plurima quoque ob paucitatem experientiorum a quibus hæ regulæ prognosticæ desumptæ fuere.

3. Ars prognostica revera conjecturalis est; ratioque conjecturæ talis est, ut, cum sæpissime responderit, interdum tamen fallat. Neque id evitare humana imbecillitas in tanta varietate corporum potest. Non itaque si quid rarissime aliquem deceperit, ideo fidem non habeat, cum sæpissime respondeat.

4. Nulla in corpore humano fit mutatio,

vel ad sanitatem vel ad mortem, sine antecedenti causa. Hæc gradatim operans effectus, suis viribus congruentes, semper producit. Hisce prospectis nititur ars prognostica; & in his vel spes vel desperatio oritur.

5. Ad hæc potissimum, in prælagiis faciendis, attendendum est: 1<sup>o</sup>. Quisnam sit futurus morbi eventus. 2<sup>o</sup>. Quo tempore morbus crasim habiturus sit. 3<sup>o</sup>. Per quas vias natura sese a causa morbifica liberabit.

6. Faustus vel infautus morbi eventus petitur: 1. Ex observationibus in simili morbo notatis. 2. Ex prægressis in eodem corpore similibus morbis. 3. Ex viribus vitæ præsentibus cognitis, & cum viribus causæ morbificæ comparatis. Ex his notis, quid eveniturum sit, colligere possumus.

7. Vis vitæ exploratur ex habitu corporis firmo, vel debili; ætate; sexu; prægressa vitæ ratione; regione; morbi tempore; præsentis statu functionum animalium, naturalium, sed præcipue vitalium.

8. Vis morbi manifestatur majore vel minore malignitate causæ morbificæ; symptomatum, sed præcipue pathognomonicorum, acerbitate; tempore morbi quando hæc appareant symptomata; causarum morbificarum sede; methodo medendi.

9. Quo enim plura sunt indicia ad eun-



Sect. II. ET MORBIS. 41  
dem eventum tendentia , eo certior ; quo  
pauciora , eo incertior prognosis.

10. Similia signa non similes effectus denotant in acutis chronicisque malis ob diversas eorum naturas. Hinc ambobus non eadem quadrant regulæ.

11. Similia signa non idem portendunt periculum in unoquoque morbi periodo. Convulsiones enim in primo variolarum stadio plerumque faustæ ; in ultimo sæpe infaustæ.

12. In acutis morbis magis fallaces sunt quam in chronicis notæ salutis & mortis.

13. Ratio semper habenda ad vires & ætatem ægri ; prosteruntur enim imbecilli & senes a malis quæ robustiores in vitæ discrimen vix adducerent.

14. Si hæc omnia seorsim perpendat medicus , dein faustas cum infaustis notis trutinat , plerumque prædicere potest , qualis sit secuturus eventus ; si nihil novi , quod ægri statum mutet , extrinsecus accidat.

15. Morborum omnium , qui certas periodos non habent , sed præcipue chronicorum , admodum incerta est prognosis temporis. In genere , quo vires vasorum causas morbificas magis superant , vel vice versa , eo citius terminatur morbus ; quo magis æquales sunt , eo longius protrahitur. Iudicio medici quoque opitulatur consideratio causarum quæ accelerant vel postponunt crisin.

16. Ad vias criseos instantis determinandas, antiqui quædam indicia notaverunt. Prædicitur hæmorrhagia narium rubedine oculorum, visus hebetudine, acuto occipitis dolore, temporum gravitate & pulsatione, lacrymis involuntariis, & præcipue narium pruritu: sudor, subita urinæ suppressione, rigore, pulsu molli & undoso, externarum partium calore, cute molli: vomitus, morsu ventriculi, vertigine, nausea, saliva multa & tenui, labrique inferioris agitatione: diarrhœa, flatu, & strepitu alvi, & tumefactione abdominis: evacuatio per urinam, gravitate hypochondrii, inflatione vesicæ, aucta urinæ quantitate, & sensu ardoris.

17. Inter hodiernos Solanus alias notas criticas evacuationes præfagiendi tradidit. Pulsus dicrotus vel digitum bis feriens, indicat hæmorrhagiam narium; quo sæpius repetitur talis pulsatio, eo magis instat crisis: pulsus intermittens, si vires non deficient, alvi solutionem: si cum intermissione complicatur durities, vomitum cum diarrhœa; si mollieties, evacuationem per urinam: pulsus inciduus, ubi quædam successivæ pulsationes gradatim supra se invicem insurgunt, criticum sudorem præfagiunt. Sed hæc indicia non satis adhuc usu & experientia confirmata sunt.

18. In genere, prudentis est medici, quamprimum gravis metus subest, indicare neces-

Sect. I. ET MORBIS. 43  
fariis periclitantis in difficili rem esse ; ne ,  
si victa ars malo fuerit , vel ignorasse vel  
fefellisse existimetur. Sed ut hæc prudenti  
viro conveniunt , sic rursus agyrītæ est ,  
parvā rem attollere , quō plus præstitisse  
videatur.

## P A R S T E R T I A.

*De morbis medendis.*

### S E C T. I.

*De Therapeia.*

1. **I**TA constructum a summo Opifice est  
corpus humanum , ut nervosæ partes  
a plerisque causis morbificis irritentur. Hac  
irritatione major liquidi nervosi quantitas in  
fibras motrices influit , motus solidorum &  
fluidorum accelerantur , & augetur actio con-  
tra causas morbificas. Hinc quantitas super-  
flua lædens ejicitur , qualitas vitiosa corri-  
gitur , stases humorum dissolvuntur , visce-  
rum obstructions referantur , & morbi pro-  
fligantur.

2. Antiqui , circuitu sanguinis adhuc inco-  
gnito , motibusque mechanicis abhinc de-  
pendentibus haud intellectis , totum opus  
Naturæ , vocabulo indistincto , tribuebant.  
Per naturam , morborum medicum , subin-



telliguntur motus morboſi , qui in corpore ſine ullo adjumento perficiuntur.

3. Hi motus morboſi vel univerſales vel particulares ſunt : univerſales , quando motus per totum ſyſtema vaſculoſum ob validam irritationem augetur ; particulares , quando ob levem irritationem in parte aliqua tota agitur res , uti in doloribus , ſpaſmis , hæmorrhagiis , &c. accidit.

4. Non ſimul & ſemel débellantur cauſæ morbiſicæ. Egent enim hi motus mechanici ordine debito , & tempore determinato ad ſuum opus perficiendum , viſque ad materiæ expulſionem accommodatis.

5. Quando hi motus morbis debellandis exacte aptati ſunt , nulla tunc artificialis medicinæ patet janua ; Natura enim totam ſibi vindicat medelam ; & jure optima morborum medicatrix cenſetur. Tunc medicum plus ſpectatorem quam actorem eſſe oportet.

6. Sed a ſuo ſcopo ſæpe aberrat Natura. In multis enim morbis chronicis , uti lue venerea , hyſterica & hypochondriaca affectione , rachitide , ſcabiæ , &c. nullus excitatur motus , ideoque nulla expectanda medela. In multis nimis languidi vel effrenes hi motus ſunt ; ideoque inſtitutum vel non abſolvunt , vel pervertunt. In quibuſdam , præſertim ubi cauſa extra vaſa irritata ſita eſt , uti in calculo , vermibus , liquoribus extra-

vasatis, &c. motus non modo non salutares, sed admodum perniciosi sunt. Hinc Natura aliquando prodest, aliquando obest; ideoque non semper & ubique sequenda.

7. Ars itaque in auxilium vocanda est ad defectus Naturæ supplendos & corrigendos. Motus, quando nullus adest, excitandus. Nimis debilis, sub Naturæ auspiciis, augendus, omniaque impedimenta ad motum naturalem removenda sunt. Nimis effrenis, diminuendo causas irritantes vel corporis sensibilitatem, moderandus. Perniciosus denique, omnino sedandus; vel, si non fieri possit, a locis magis necessariis avertendus. Hoc Naturæ, hoc artis officium; & sua cuique merita laus tribuenda est. Hisce intellectis, nunquam potest oriri hæc frequens disputatio, An secunda valetudo medicinæ, an corporis beneficio, contigerit?

8. Quodcumque, vel secundum vel contra sanitatem, in corpore observatum, quod aliquid faciendum medico indicat ad sanitatis remanentis tutelam, vel morbi depulsionem, Indicans appellatur. Notitia earum mutationum, quas indicans requirit, Indicatio appellatur. Indicatum denique est medicamentum quod ad hunc eventum assequendum indicatur, & indicanti congruit.

9. Indicatio exoritur: i. A probe perceptis & intellectis causis morbi proximis, quæ rationi, quid faciendum sit, ostendunt.

2. Ab ipsa experientia, morborumque historiis, quæ, quamvis in tenebris latent & causæ remotæ & proximæ, tamen multa comprobaverunt auxilia, specifica dicta, quorum natura & agendi ratio adhuc ignorantur, & forsitan semper latebunt. 3. Ab his ambobus simul junctis, & ad eandem metam tendentibus, hæc optima & firmissima medendi methodus est.

## S E C T. II.

### *De remediorum viribus.*

1. **O**Mnis ars instrumentis ad suum opus perficiendum eget. Instrumenta artis medicinalis appellantur auxilia vel remedia. Hæc in tria genera deducta sunt. Unum quod medicamentis, alterum quod victu, tertium quod manu medetur; primum *φάρμακευτικήν*, secundum *διαιτητικήν*, tertium *χειρουργικήν*, Græci nominaverunt. De hac a prioribus nunc separata, & ad chirurgos relegata, hic non tractabitur.

2. Uti artifex instrumentorum, quibus operatur, naturam & vires, ita medicus potestates remediorum, quæ sub certis legibus corpori humano tali modo constituto applicantur, callere debet.

3. Quia corpus peccat vel ob quantitatem deficientem aut excedentem, vel ob



qualitatem vitiosam fluidorum aut solidorum, vel ob corpora extranea irritantia, ita omne auxilium aut adjicit, aut demit, aut permutat aliquam materiam, aut denique expellit vel destruit corpora mechanice agentia. Quædam non uno modo tantum, sed etiam duobus inter se non contrariis, adjuvant. Non ultra hos limites progrediuntur vires remediorum.

4. Materia optime adjicitur alimentis, id est cibo & potu. Hæc sunt aut valentis & firmæ, aut mediæ, aut imbecillæ vel infirmioris naturæ. Nonnulla ad certa fluida proprie tendunt: hinc haimatopea, galactopea, spermatopea.

5. Demitur materia superflua abstinencia; exercitiis; frictione; sanguinis detractione per venas, vel per cucurbitulas, vel hirudines; fonticulis; epispasticis; vomitu; laxantibus, vel purgantibus; alvi ductione; lotionibus; diaphoreticis, vel sudorificis; diureticis; emmenagogis; expectorantibus; salivantibus; errhinis, & apophlegmatizantibus.

6. Materiam permutant, 1. Medicamenta alterantia, qualia absorbentia, diluentia, temperantia, attenuantia vel incidentia, antiseptica, & demulcentia vel emollientia. 2. Roborantia, qualia analeptica vel cordialia, balsamica, stomachica, visceralia, astringentia, vulneraria. 3. Sedantia, qualia ano-

dyna , antispasmodica , antiepileptica , hypnotica & narcotica. 4. Specifica.

7. Expellunt vel destruunt corpora axtra-nea mechanice agentia , carminativa , elixipharmaca , anthelminthica , lithonhriptica.

8. Hæc alimenta & medicamenta non suis & propriis qualitatibus morbos adoriuntur , sed viribus compositis ex motibus naturalibus & artificialibus. Eorum effecta observatione & experientia deteguntur.

9. Inumbrantur illorum vires ; 1. Quia omnes morbi circumstantiæ ante administrationem non exacte notantur & describuntur.

2. Quia plurimæ morborum causæ quas debellant adhuc ignorantur. 3. Quia principia , quibus hæc vires dependent , neque satis deteguntur , neque legibus mechanicis aut chymicis dilucide explicantur. 4. Quia composita , sæpius quam simplicia remedia , usurpantur : unde dubius hæret medicus , cui potissimum adscribendus sit effectus , vel an non plane diversus a simplicibus.

### S E C T. I I I.

#### *De artis in medendo legibus.*

1. **Q**uanquam vix ulla perpetua præcepta medicinalis ars recipit , tamen in medendo quædam sunt regulæ generales vel axiomata quibus fere obligatur artifex

Sect. 3. ET MORBIS. 49  
artifex, quo remedia, magis secure & expeditè, optatos producant effectus.

2. Ad felicem medelam requiritur notitia proprietatum, non solum ægrotantis, sed etiam sani corporis. Inveniuntur enim corpora, in quibus aliter atque in cæteris idem evenit. Ideoque cum par scientia sit, utilior tamen medicus est amicus, quam extraneus.

3. Raro quisquam non aliquam partem corporis imbecillam habet; cujus quotiens offensum corpus est, vitiosa pars maxime sentit. Huic præcipue succurrendum est.

4. Medicus interdum plus quiete, quam movendo atque agendo, proficit.

5. Ars observare & sequi debet ordinem, tempus, & successiones motuum, quibus natura, ad curationem absolvendam, incedit.

6. Morbis occurrendum in principio & remissionibus vel intermissionibus, sed non in summo paroxysmi vigore, nisi ad symptomata levanda; quia partes nervosæ tunc spasmodicis contractionibus tentantur.

7. In paroxysmo nitendum est ut impetum morbi trahendo, porrigatur in id tempus, quod curationi locum præstat.

8. Medicamenta naturæ corporis semper accommodanda sunt; debilibus enim debilia, & fortibus fortia conveniunt. Neque unquam, quod infirmioribus fieri potest, fortioribus medicamentis aggrediendum. Ne-



que quicquid repente in corpore mutandum, quod æque tuto paulatim fiat.

9. Attamen multa in præcipiti periculo recte fiunt, alias omittenda. Nec posse vehementi malo nisi æque vehemens auxilium succurrere.

10. Perpauca, eaque bene explorata medicamenta, tentanda. Qui multis promiscue & passim utitur, nulla probe nescit.

11. Neque crebro, neque sine causa, in longis morbis, mutandæ sunt applicationes longa experientia comprobatæ; arguit enim vel ignorantiam indicationis vel remediorum.

12. Sed cum omnibus eadem convenire non possunt, est circumspecti hominis novare interdum, & augere morbum, & febres accendere: quia curationem ubi id quod est non recipit, potest recipere id quod futurum est. Hinc, quos ratio non restituit, temeritas fere adjuvat.

13. In applicatione remediorum observandum est anni tempus; facilius enim curantur quotquot ab obstructionibus proveniunt morbi, tempore vernali & æstivo, quam autumnali & hiemali.

14. Observandum quoque est tempus diei; evacuantia & stomachica mane optime administrantur, sed opiata melius in genere circa tempus nocturnum.

15. Nihil commodius est quam causam morbi, qua via primum expelli potest, eji-

cere; quia humores minus inquinantur, & corpus minus labefactatur.

16. Officium est medici impetum morbi a parte magis necessaria ad partem minus necessariam vertere.

17. Evacuationes per alvum, cutem, & renes nunquam excitandæ, nisi materia excretioni antea aptetur, & viæ ad hanc emitendam propriam patefcant.

18. Quando ingravescent symptomata, ad illorum mitigationem, posthabita morbi causa, remedia dirigenda sunt. Hæc symptomata sæpe indicant remedia causam morbi foventia. In hac contraindicatione maximo periculo semper occurrendum.

19. Non retardandæ, sed promovendæ sunt criticæ evacuationes, præcipue si deficiat natura; neque prudentis medici est, aliquid novi moliri circa dies crisi maxime dicatas.

20. Neque cubantis luxuriæ subscribere, neque tortoris vicem exhibere medico convenit.

21. Quo brevior morbus, eo victus tenuior; quo longior, eo minus tenuis.

22. In febrium vel dolorum accessionibus, a cibo abstinendum est; quia tunc nulla fieri potest nutritio, & cibus plerumque corrumpitur.

23. Quo vires sunt magis consumptæ, eo rebus infirmis magis opus est, & pariori

fed frequentiori alimenti usu reficiendæ sunt. Quo vires magis constant, eo valentiori materiæ, & majori copiæ indulgendum. Itaque utendum materiæ genere pro viribus; modusque ab omnibus pro genere sumendus.





LIBER SECUNDUS.  
DE MORBIS FEBRILIBUS.  
PARS PRIMA.

*De diversis morborum divisionibus.*

SECT. I.

*De morborum in diversa genera divisione.*

I. **O**MNIBUS quæ pertinent ad universa morborum genera absolutis, ad singulorum curationes veniam. Sed operis nostri ordo requirit, ut prius in distinctas & separatas classes redigam morbos, quo facilius generales eorum proprietates & distributio animo concipiantur.

2. Morbi distinguuntur in simplices & compositos. Simples per se existunt; sed compositi cum aliis morbis conjunguntur, uti febres cum lue venerea, scorbuto, vel vermibus complicatæ.

3. In idiopathicos & symptomaticos. Ubi morbus primarius, neque ab alio dependet, idiopathicus; quando ab aliis originem ducit, tunc symptomaticus dicitur; uti convulsiones a vermibus vel dentitione, cephalalgia ab affecto ventriculo, &c. Summæ utilitatis est in praxi hæc distinctio.

4. In contagiosos & non contagiosos. Contagiosi, quales febres, variolæ, morbilli, pestis, dysenteria, scabies, lepra, lues venerea, ita vocantur, quia materia morbifica ab uno in alterum propagatur: hoc dupliciter fit, vel per contactum, vel per aerem.

5. In continuos & intermittentes. Priores, quales febres continentes, phthisis, scabies, &c. perpetuo affligunt: posteriores, quales febres intermittentes, epilepsia, arthritis, &c. post breviorum vel longiorum temporis intermissionem postea redeunt. Hic itus reditusque vel regularis vel irregularis: hinc intermittentes rursus in periodicos & irregulares dividuntur.

In benignos & malignos. Priores facillime; posteriores, uti febres malignæ, cancer, sphacelus, &c. difficillime medelæ auscultant.

7. In hereditarios, qui liberis a parentibus transmittuntur; & adventitios, qui sine ulla labe hereditaria adveniunt. Medelæ facilius cedunt posteriores quam priores.

8. In salutare & exitiale. In priore classe recensentur diarrhœa vel vomitus ab acrimonia in primis viis, intermittentes vernaes, hæmorrhoides, profluvium acris mucine naribus, &c. In posteriore, febres ab animi pathematibus, vermes, venena, nervi læsi, &c. Ægrotanti convenit ut medicus hos recte distinguere valeat.

9. In sanabiles & insanabiles. In posteriore classe enumerantur paralyfis antiqua, mania inveterata, asthma in senibus, poly- pus, hydrops, scirrhus viscerum, calculus, &c. Horum notitia in prognosi facienda ad- modum necessaria est

10. In recidivos & non recidivos. Prio- res sunt ophthalmiæ, intermittentes febres, hydropes, &c. posteriores sunt variolæ, morbilli, pestis, lues venerea, &c.

11. In endemicos, epidemicos, & spora- dicos; & in acutos & chronicos.

## SECT. II.

*De endemicis, epidemicis, & sporadicis morbis.*

1. **E**NDemicus appellatur morbus, qui certam regionem, vel certas in eadem regione plagas infestat, statis tempestatibus plus minus grassatur, & a causis ibi com- munibus originem ducit.

2. Hæ causæ deduci possunt, 1. A re- gionibus soli ventrisque diversimodo exposi- tis. 2. Ab earum vicinitate ad mare; lacus, vel paludes. 3. A nimis alto vel profundo loci situ. 4. A diversa natura soli vel lutei, vel palustris, vel sabulosi. 5. A diversitate aquarum, quæ diversis particulis minerali- bus, salinis, oleosis, vel terrestribus repleta sunt. 6. A diætâ hisce locis propria.



3. In nostra insula endemicus est phthisis & tedium vitæ; accolis maris Baltici scorbutus; in Flandria febres intermittentes; hydrocele & sarcocoele in Gallia Narbonensi; plica in Polonia; melancholia hypochondriaca in Hispania; epilepsia in Hetruria; strumofus colli tumor in Alpium jugis; perionies in regionibus septentrionalibus; pestis in Ægypto; paralysis species, Berberi dicta, in plagis Asiæ calidis; tetani species in India; vermes intra cutem progeniti in Guinea; & lues venerea in Peruvia.

4. Morbus qui apparet, grassatur per populum, & postea cessat, epidemicus appellatur.

5. Morbus epidemicus ejusdem constitutionis, iisdem fere sympomatibus, utcumque variant corpora, stipatur, & iisdem tollitur remediis; sed plane diversus, & in sympomatibus & medela, ab epidemicis diversæ constitutionis.

6. Epidemici, omnibus anni temporibus, sed plerumque vere & autumno, sese monstrant. Hinc in vernaes & autumnales dividuntur. Vernaes, uti variolæ, morbilli, pleuritis, &c. adveniunt mense Januario, sæviunt vere, & desinunt circa solstitium æstivum. Autumnales contra, quales quartanæ, pestis, cholera morbus, dysenteria, &c. tunc incipiunt; autumno maximas edunt strages, & adventante hieme evanescunt.

7. Constitutione epidemica ad suum vigorem procedente, evanescunt plerumque, quotquot tunc conspiciebantur; alii morbi: recedente, rursus in lucem prodeunt. Si alius comitetur morbus, genium epidemici æmulatur.

8. Originem ducunt epidemici a causa generali omnibusque communi, id est, aere. Quod aeris qualitates sensibus manifestæ epidemicos excitant, ex hoc manifestatur, quod certas anni tempestates certi in genere comitantur morbi epidemici. Sed similes aeris qualitates manifestæ non semper similibus stipantur morbis: hinc inter causas morborum epidemicorum frequentissimas enumerandæ sunt abditæ aeris qualitates, quales particulæ putridæ vel exhalationes, e terræ visceribus.

9. Quia medela variat in variis epidemicis, ut quod uni accommodetur, alteri plane funestum deveniat, tarde & summa cum cautela in remediis applicandis procedendum est. Qui aliter facit, carnificis, non medici, partibus fungitur.

10. Methodus medendi in novo & incognito morbo detegitur, 1. Similitudine ad cognitos morbos; 2. Inquisitione exacta in causas producentes & prædisponentes; 3. Sedula attentione ad naturam, symptomata, & crism morbi; 4. Observatione juvantium & lædentium.

II. Morbi sporadici vel intercurrentes sunt, qui nullo non tempore contingunt, paucos adoriuntur, & ab epidemicis vel endemicis discrepant. Originem trahunt a causis soli ægro propriis, nempe erroribus diætæ, motus vel quietis, somni vel vigiliarum, pathematum animi, excretorum vel retentorum.

### S E C T. III.

#### *De acutis & chronicis morbis.*

1. **M**Ajoris momenti est divisio morborum in acutos & chronicos. Morbi acuti vel breves appellantur, quando cito vel tollunt hominem, vel ipsi cito finiuntur: chronici vel longi, sub quibus neque sanitas in propinquo, neque exitium est.

2. Acuti morbi proveniunt a materia quadam acri corporique inimica, humoribus permixta aut procreata; vel a vasorum obstructione, irritationem excitante: unde motus spastici vel febriles, cito vel sanitate vel morte terminandi, plerumque excitantur.

3. Sed chronicorum longe alia ratio est. Materia enim lentescens, & non admodum acris vel copiosa, a solidis, præcipue viribus digerentibus, debilitatis plerumque progenita, neque per canales secretorios transmissa, minutissima vasa, ubi languescit cir-



culatio humorum & sensatio, gradatim infarcit: hinc nulla irritatio, ideoque nulla febris excitatur. Sub finem morbi; quando humores stagnantes & vasa corrumpuntur, sæpe oritur febrilis motus; sed frustra. Ejec-tis enim hoc motu particulis corruptis novæ denuo succedunt, donec natura, irrita conamine labefacta, tandem fatiscat. A laxis autem solidis plerosque morbos chronicos provenire, dehinc apparet, quod in senibus & tempore hiemali progignuntur, & motu corporis curantur.

4. Morbi acuti, præcipue intermittentes, in chronicos degenerant; & nonnulli chronici uti paralyfes, epilepsiæ, & obstructions, superveniente febre, sæpe curantur. Hinc similitudinem nonnulli inter causas acutorum & chronicorum morborum statuerunt; sed falluntur. Chronici enim non causas sed effectus acutorum pro suis causis proximis agnoscunt; & acutus non oritur a causa chronici liberata, sed hunc liberat suis viribus mechanicis, vel chymicis. Magis ad rem videntur nonnullorum chronicorum paroxysmi, quia a causa stimulante nati, re vera sunt naturæ conatus ad acutum morbum excitandum.

5. Quia natura raro quidquam perficit in curatione morborum chronicorum ob debilitatem solidorum, insensibilitatem nervorum, & obstructions extra circulationem

fere positas, tota res arti committitur, cuius officium est humores fluidos reddere, evacuare, & tunc fibras roborare.

6. Longus morbus cum penitus infidet, difficilius in genere curatur, saltem in hisce septentrionalibus plagis, quam acutus; quamvis in hoc breve spatium est intra quod, si auxilium non profuerit, æger extinguitur, in illo & deliberationi & mutationi remedium tempus patet. In acuto quoque sola plerumque fere vitiantur fluida; in longo vitia fluidorum vitia solidorum semper comitantur: hic sola arte; ille & natura & arte oppugnatur.

7. Hæc divisio, uti manca & difficilis, quando morbi in ordinem digerendi, merito culpatur. 1<sup>o</sup>. Plurimi enim morbi modo acuti, modo longi sunt, quales febres continentes & intermittentes, febris hectica, epilepsia, apoplexia, paralyfis, &c. 2<sup>do</sup>, Hæret medicus, morbo incipiente, utrum ad acutos vel chronicos referendus sit. 3<sup>tio</sup>, Morbo finito, non adhuc semper de ordine constat; tempore, genera determinante, nondum circumscripto. 4<sup>to</sup>, Mala plane repugnantia, quales morbi cum citato & morbi cum tardo pulsu, in eundem ordinem rediguntur. 5<sup>to</sup>, Nonnulli morbi, quales dolores rheumatici, tussis, odontalgia, distillatio, dolor colicus, &c. neque acuti dici possunt, quia non perimunt; neque utique longi, quia

Sect. 4. FEBRILIBUS. 61  
vel cito finiuntur, vel facile sanantur.

8. Ob has causas merito mihi displicet & rejicitur hæc antiqua morborum divisio, quamvis Hippocratis ante ævum ortum habuit, a Cælio Aureliano & Aræteo præcipue exculpta, & a plerisque practicis ad hoc usque tempus in auxilium vocata fuit.

#### S E C T. IV.

*De morbis febrilibus & non febrilibus.*

1. **S**ED naturæ & usui magis accommodatum est, morbos in febriles & non febriles deducere. Febriles appellantur, ubi febris comes morborum continuus est; non febriles, ubi febris dividua est, & plerumque abest.

2. Hæc morborum divisio priorem longe præstat; quia, 1<sup>o</sup>. Perpauci morbi per totum cursum modo febriles, modo non febriles; quamvis nonnulli sunt, qualis rheumatismus, tussis, phthisis pulmonalis, &c. Sed hæc est perpetua summi Opificis in suis operibus ratio, qui dissita genera speciebus intermediis conjungit, ut nihil appareat avulsum, sed omnia omnibus cohæreant. 2<sup>do</sup>, Nunquam incertus, morbo incipiente, fieri potest medicus, utrum morbus ad genus febrile, vel non febrile relegandus sit. 3<sup>tio</sup>, Limites inter febriles & non febriles pulsu



exacte notantur. 4to, Nulla inest repugnancia inter morbos febriles; nulla inter morbos non febriles: sed, e contrario, in multis conveniunt. 5to, Nullus fieri potest morbus, qui non vel inter febriles vel inter non febriles enumerandus est.

3. Ob has rationes itaque servanda est hæc generalis divisio in morbos febriles & non febriles; quia commoda antecedentis divisionis omnia possidet, & præterea sua propria adjungit: secum enim adfert summam in prognosi & medela utilitatem.

4. Incipiam a morbis febrilibus: 1. Quia idea morbi febrilis, id est, motus fluidorum aucti, simplicior est idea morbi non febrilis, id est vitiatorum solidorum & fluidorum.

2. Quia natura sæpissime, sine auxilio medici, uti apparet in rusticis, illi medetur.

3. Quia plerumque facilius est moderari, quam de novo excitare motum.

## S E C T. V.

### *De febre in genere.*

1. **Q**uia febris comitatur omnes acutos & plerosque chronicos morbos circa finem, ita ut nemo fere sine febre fato fungatur, quumque tam abdita sit ejus natura, & tam diversæ de illa opiniones, licet paucis de febribus in genere differere.

2. Ad veritatem in tam difficili, confusa, & diversis opinionibus adumbrata quæstione, placet more mathematico procedere, qui a qualitatibus corporum semper & ubique concomitantibus, cognitis, & concessis, ad horum naturam incognitam detegendam procedit.

3. Consideranti varia & innumera febrium symptomata patebit, in unaquaque febre semper & ubique adesse frequentem pulsus & calorem auctum, cum læsione unius vel plurimum functionum naturalium, animalium vel vitalium. Nulla præter hæc symptomata omnium febrium genera comitantur; ideoque his apte definitur febris.

4. Frequentia pulsus primo a Sylvio inter symptomata febrium pathognomonica numerabatur. Sed caloris majus minusve augmentum æque inter hæc locum meretur, quia in omni febre & in unoquoque febris stadio, immo in rigoribus, detegitur. Læsiō functionum merito inter notas febrium pathognomonicas collocatur, quia semper adest nonnulla, & febrem ab accelerato per motum vinumque sanguinis cursu distinguit: sed hæc læsiō nullis certis insignitur symptomatibus: ergo a prioribus solis deducenda est febrium natura.

5. Celeritas & frequentia pulsus a citatiore sanguinis motu oritur. Citatior sanguinis motus a frequentioribus cordis con-

tractionibus. Cordis contractio frequentior a celeriore liquidi nervosi in febres contractiles influxu. Celerior liquidi nervosi motus a mente ita ex necessitate determinante, a sensatione cujusdam stimuli in toto sanguine, cor, & vasa, vel in parte aliqua nervos, & hinc cor per consensum afficientis.

6. Causæ irritantes febrificæ vel nascuntur in corpore, vel intus ingeruntur, vel externe applicantur. Intus nascuntur ex animi pathematibus violentis, terrore imprimis & ira, nimio motu, calore externo, balneis nimis calidis, perspiratione intercepta, pure, exanthematibus retropulsis, biliosis & corruptis fordibus in primis viis. Intus ingeruntur venena, cibi vel potus acres, miasmata, contagium. Externe applicantur compressiones, corrodentia & caustica medicamenta, instrumenta vulnerantia, lacerantia vel pungentia, quæ nervos & nervosas partes lædunt.

7. Quod causæ hæ febrificæ operantur irritando & spasmodicas contractiones excitando, quam clarissime patet a primis febrium symptomatibus, nempe constricta & ficca cute, vasis disparentibus, horripilatione, alvi adstrictione, urina limpida, flatuum retentione, lumborum dolore, vomitu, pulsu duro & parvo.

8. Hæ causæ febrium proximæ neque indolis habendæ sunt acidæ secundum Etmul-  
lerum,



lerum , neque alkalinae secundum Baglivium ; quia non adhuc certis experimentis patet quod acida vel alkalina humoribus nostris vel sanis vel morbofis insunt. Attamen de nonnullarum causarum natura constat : de quamplurimis adhuc ambigitur , & semper fortasse de illis lites agentur ; quia ad intimam earum naturam & essentiam non penetrare queat imbecillus hominis intellectus.

9. Hisce causis , naturae humanae inimicis , ex physica quadam necessitate insurgit febris , quae , aucto motu progressivo & intestino adjuta , particulas cohaerentes dirimit , viscidas attenuat , superfluas evacuat , obstructions aperit , emunctoria deobstruit , intemperatos humores temperat & corrigit , & postremo e corpore expellit ; uti patet crasibus omnium febrium , sed earum praecipue , ubi materia caustica ab interioribus partibus ad exteriores relegatur.

10. Sed non motu solo operatur febris. Calorem semper sibi associat : ergo de hujus origine & effectu paucis inquirendum , praesertim , quando de illis non adhuc constat.

11. Calor duplicem in febribus originem agnoscit. Oritur enim , 1<sup>o</sup>. Ab attritu fluidorum contra vasa , praesertim minima , & contra ipsa fluida. 2<sup>do</sup> , Continua humorum in putredinem proclivitate.

12. Calor ab attritu provenit , 1. Quia  
E

attritus corporum elasticorum calorem gignit. 2. Quo major velocitas, eo, cæteris paribus, major calor. 3. Quo minor velocitas, eo minor calor, donec motu omni cessante, corpus ad aeris circumambientis statum reducitur. 4. Omnia stimulantia, quamquam in se non calida, calorem augent.

13. Calor aliam præter attritum agnoscit causam, quia neque in homine morbofo, neque sano, calor exacte quadrat augmento vel diminutioni motus, uti patet experimentis thermometro factis. Assumenda est itaque alia, nempe proclivitas humorum in putredinem, præsertim in febribus putridis; quia, 1. Putredinem semper sequitur calor. 2. Quo magis putridus morbus, eo major calor. 3. Calor per dies aliquot post mortem durat. 4. Putrescentibus in hydropse humoribus calor supervenit. 5. Neque putredo sola sufficit ad calorem explicandum, quia calor semper excitatur vino & spiritibus fermentatione productis, inter remedia summe antiseptica enumerandis.

14. Hinc attritus & nifus in putredinem caloris animalis causæ deveniunt. Major attritus oritur a majore velocitate vel densitate fluidorum: major putrefactio a peculiari fluidorum statu, vel ab ipsa febris causa, non a motu sanguinis accelerato; motus enim impedit putrefactionem. Quo gradu unus vel alter, vel uterque increfcit

vel decrefcit , eodem gradu augetur vel diminuitur calor.

15. Calor auctus caufas febriles feliciffime expugnat , glutinofos & vifcofos humores diffolvendo , cohærentes particulas colliquando , fuperfluas imminuendo , fibras rigidas relaxando & flexiles reddendo , emunctoria obftructa expediendo , fales & olea circulationi inepta per poros ejiciendo , & fanguinem impactosque humores difcutiendo , vel in pus convertendo.

16. Ergo febris , id eft , pulfus citatior & calor auctior , refpectu ad caufam morbificam habito , femper falutaris eft ; effectus enim caufæ morbificæ ad ipfam tollendam apprime concinnatur. Hinc febris apte a clariffimo Sydenhamo definitur , “ Naturæ ” conamen materiæ morbificæ , corpori valde ” inimicæ , exterminationem in ægri salutem ” omni ope molientis. ”

17. Febris ergo , quæ femper ad caufas morbificas quadrat , non , fi fieri poteft , extinguenda , fed potius ad harum expulfionem alenda.

18. Sed febris , cum nimis forti vel debili pulfu juncta , a fuo fcopo aberrat , & corpus , quod a periculo vindicare conatur , peffum dat. Si motui accelerato associatur pulfus validus & fortis , attritus fit magnus , calor augetur , expanduntur fluida , vafa comprimuntur , fecretiones impediuntur , humores



in minimis vasis stagnant, & in concreciones viscosas inflammatorias abeunt: hinc inflammationes, abscessus, gangræna, mors. Si motui accelerato jungitur debilitas pulsus, momentum fluidorum non valet causas mor-  
bificas subigere, & æger cito extinguitur.

19. Effectus caloris nimis aucti est expulsio aquosæ partis humorum; solidorum ficcatio; salium attenuatio & acrimonia; oleorum liquefactio, in venas absorptio, attenuatio, & ad acrimoniam rancidam proclivitas: hinc fibræ rigidæ, minimorum vasorum adunatio, sudor, urina colorata & foetida, irritatio & exesio tenerrimorum vasorum, dolores, convulsiones, mors. Calorem ad gradum centesimum septimum thermometri Fare-nheitiani assurgere, sine ullo periculo, sæpe mihi contigit videre.

20. Effectus caloris nimis remissi, quod rarissime in febribus accidit, sunt obstruc-tiones in partibus a corde remotissimis, hor-rores & rigores, obstruções perspirabilis materiæ, determinatio humorum ab exte-rioribus ad interiora, impotentia ad causam morbificam dissolvendam vel suppurationem promovendam.

21. Ad hos excessus vel defectus febrium corrigendos in auxilium vocatur, & in his plerumque versatur ars. Raro causarum febrificarum naturas perspectas habet: sed rarius penes illam est has tollere, vel immediate

eliminare. Nonnunquam tamen causas mor-  
bificas, uti læsiones externas, venena, fordes  
biliosas, pus, vermes, &c. tollere; non-  
nunquam in superficiem corporis externam  
ejicere, uti eruptiones retropulsas, valet.  
Hæc certissima & expeditissima febris me-  
dela.

22. Sed quando solis viribus aucti motus  
& calor, quod plerumque accidit, eradi-  
canda est causa febrifica; officium medicī  
est has temperare; ne nimis superent, vel  
nimis torpeant. Mediam viam ab utroque  
extremo æque distantem sola experientia, non  
ratio, docebit.

23. Si in debito moderamine jamjam sint  
motus & calor, nihil medico restat, nisi  
vires sustinere, & difflatas tenues particulas  
restituere cibo & potu idoneo, & in debita  
quantitate administrato.

24. Febricitantibus optime convenit cibus  
humidus & forbilis, ex acescentibus vege-  
tabilibus præparatus, & qui sua natura le-  
vissimus est. Satius est parva quantitate &  
debitis intervallis cibum ægrotanti præbere,  
ne supervacua materia oneretur.

25. Magnæ inter antiquos movebantur  
lites, quando primum dari debeat. Plerique  
tarde dabant, nempe quarto, quinto, vel  
sexto die. In rebus multum inter se differen-  
tibus, ob diversitatem morbi, ætatis, cœli,  
temporis anni, consuetudinis, nullum per-

petuum temporis esse præceptum potest. Maturius est dandus pueris & senibus, quam adolescentibus; æstate quam hieme; morbo qui plus virium aufert; laute viventi, quam temperato; itemque cœlo digestionem magis faventi. Monitum Celsi semper & ubique servandum est, ut ægri vires subinde assidens medicus inspiciat, & quamdiu supererunt, abstinentia pugnet; si imbecillitatem vereri cœperit; cibo subveniat.

26. Febrem semper fere comitatur fitis, index deficientiæ aquosi laticis, vel acrimoniæ in sanguine. Merito ergo culpandi sunt omnes fere antiqui medici, qui, a falsa opinione, quod omnibus febricitantibus nimis humor alienus erat, potiones primis diebus non dabant, & ita officio tortorum, non medicorum, fungebantur. Sitim optime pellit potus aquosus, tepidus, succo vegetabilis aciescentis impregnatus, & debitis intervallis haustus, ne gravetur stomachus.

27. Si nimis excedunt aut deficiunt pulsus vel calor, moderandi sunt. Pulsus nimis validus & plenus, depletur abstinentia, sanguinis ex venis detractione, & alvi lotionibus ductione, quoad vires sustinere possunt.

28. Si pulsus nimis debilis, excitandus est diætâ magis nutriente & refocillante ex jusculis tenuissimis, vino & medicamentis cardiacis, evitatis omnibus evacuationibus.

29. Calor nimis auctus mitigatur, 1. Quiete



animi corporisque. 2. Aeris externi temperie ad frigiditatem vergente. 3. Paucis vestimentis. 4. Aquæ diluentis frigidiusculæ potu. 5. Medicamentis antisepticis qui motum humorum suo stimulo non augent, qualia acida vegetabilia & mineralia, vel sal nitri.

30. Calor nimis debilis refuscitatur, 1. Motu vel frictionibus. 2. Aere igne calefacto. 3. Lecti tepore. 4. Calidis corporibus externe applicatis. 5. Omnibus quæ pulsum debilem excitant.

31. Animi quoque habitui invigilandum est, ne a viribus pathematum quid detrimenti capiat corpus. Itaque si qua sunt, quæ exasperatura febricitantium animos sunt, optimum est, ea, dum ægrotant, eorum notitiæ subtrahere.

## S E C T. V I.

*De febrium generibus.*

1. **H**ÆC de natura & medela febrium in genere sufficiunt ad intelligendam naturam & medelam febrium particularium. Hæ optime distinguuntur, 1. In febres quæ in toto sanguine consistunt. 2. In febres inflammatorias symptomaticas quæ oriuntur in partibus. 3. In febres secretionem critica stipatas, ubi causa prius in toto

sanguine inhærens postea ad exteriora eliminatur, & nunc illis nunc his similes.

2. Febres acutæ in toto sanguine consistentes distinguuntur in continentes, quæ continuo & æqualiter corpus affligunt; in remittentes vel intermittentes, quæ remissiones vel intermissiones febris habent; & in hæcticas.

3. Febres acutæ continentes distinguuntur aliquando ab antiquis, a tempore durationis, in ephemeram vel febrem unius diei, & synochum simplicem, qui non ultra quartum vel quintum diem durat: sed sæpius ab aliquo particulari symptomate, uti typhodes, vel sudorifica; affodes, sive anxiosa; lyncodes, sive singultuosa; phricodes, sive horrida; biliosa.

4. Sed febres continentes, perspecta tota symptomatum complicatione & medela, melius distinguuntur in tres species, inflammatorias, scilicet, nervosas vel lentas, & putridas. Hæ febrium species, admodum dissimiles, omnes comprehendunt. De his ergo ordine.

## P A R S S E C U N D A.

*De febribus quæ in totis corporibus consistere videntur.*

## S E C T. I.

*Febris inflammatoria.*

I. **F**EBRIS continua inflammatoria a statu humorum inflammato nomen fortitur, & inter species diversas febrium ardentium ab Hippocrate describitur. Synochus a Galeno appellatur.

2. Corripit hæc febris frequentius adolescentes in vigore ætatis, rusticos, sanguineos, laute viventes, athleticos, omnesque fibris strictis & elasticis, humoribusque densis & elasticis, donatos. Omnibus grassatur anni temporibus, sed præcipue veris & æstatis initio, quia humores præcedente frigore magis compacti sunt.

3. Causæ remotæ sunt æstus solis; perspiratio frigore subito cohibita; fatigatio; ira; vini vel liquoris fermentati magna ingurgitatio; vigiliæ nimis protractæ; frigida aqua, corpore calefacto hausta; balnea nimis calida.

4. An causa proxima sit acris & densus sanguis, vasa minima serosa & sanguinea,



in diversis locis, obstruens? Hanc opinionem confirmant causæ remotæ, sanguis detractus, symptomata, medela, & sectio cadaverum.

5. Sese monstrat primo lassitudine; sensatione corporis quasi contusi; debilitate; frigore & calore alternatim succedentibus; tremoribus; doloribus per totum corpus, sed præcipue in humeris, dorso, genibus, & capite. Tunc supervenit calor intensus & urens; sitis potionibus non extinguenda; oculorum inflammatio; faciei rubedo & tumefactio; nausea; vomitus; inquietudo; anxietas; pulsus magnus & validus; cutis arida; urina rubra, sed nonnunquam aquosa; lingua aspera, arida, fusca vel nigra, & crusta obducta; sanguis detractus fortiter concreescens, & crusta glutinosa tenaci tectus; respiratio difficilis; alvus constipata; tussis vigilæ; delirium; stupor; coma; tremores & tendinum subsultus; singultus; fecum & urinæ involuntaria emissio; mors.

6. Aperto cadavere, viscera inflammata & gangrænosa inveniuntur.

7. Lassitudo & debilitas a plethora & viscido sanguine liquidi nervosi secretionem impediende.

Frigus est certa perceptio in animo; ergo caloris absentiam non denotat. Experimentis thermometro factis ab aliis & me certissimum est, majorem in frigore febrili jam

inchoato adesse calorem, quam in eodem corpore sano. Sensatio frigoris oritur ab humoribus in vasis subcutaneis stagnantibus; quia, 1. Omnia quæ vasa subcutanea contrahunt, uti frigus externum, cibus quem abhorret nostra natura, vel ejus idea, omniaque quæ vim cordis debilitant, hanc excitant sensationem. 2. Ungues livescunt, certum sanguinis ibi stagnantis signum. Stagnant humores ob nimiam visciditatem, & stimulum vasa contrahentem.

Tremores & rigores, ab humorum in vasis subcutaneis stagnantium irritatione, inæqualem & involuntarium motum liquidi nervosi in musculos efficienti, originem trahunt. Hinc salutare, neque auxilio egent, quia viscidam materiam debellant, & circulationem iterum renovant.

In partibus membranaceis & ligamentosis viscidum humores facillime stagnant; hinc humerorum, genuum, & dorsi dolores.

Anxietas a corde nimio sanguine repleto ob remoram in minimis vasis; vel a ventriculo, irritante materia oppresso, oritur.

Sitis a deficiente aquoso latice in sanguine ad acrimoniam temperandam, visciditatem diluendam, & rigiditatem fibrarum relaxandam, producitur. Hinc ad febris medelam a natura instituitur.

Vehemens attritus, a magna vasorum elas-

ticitate, & humorum copia densitateque proveniens, calori urenti originem præbet.

Nausea & vomitus excitatur a materia acriviscida, acida, vel biliosa ventriculum irritante, vel vasis nimio sanguine repletis & obstructis.

Pulsus fortis & magnus a robore vasorum & secretionem liquidi nervosi aucta ob viscidos humores horroribus, pulsu celeri & calore magis resolutos.

Urina rubescit a majore olei cum salibus uniti copia. Si instar aquæ mingitur, spasmodum vasorum renalium, vel sanguinis oleositatem aquam ingestam respicientem, ostendit.

Superior linguæ pars arefcit, & crusta nigra obducitur, ab ariditate mucosarum glandularum & muci inspissatione; sed inferior pars salivæ perpetua secretionem emollitur.

Crustam albam in superiore sanguinis parte a volatili aliqua & septica materia, particulas serosas elevante & conjungente, provenire, experimentis satis probatum est. An a materia perspirabili retenta? Ita videtur.

Respiratio difficilis, a difficili sanguinis transitu per pulmones.

Alvus contrahitur ab intestinorum ariditate & paucis alimentis.

Vigiliæ & delirium ab inflammatis & tensis cerebri meningumque vasis proveniunt. Si major in nervorum origines adsit compressio, tunc degenerant in stuporem & comam.



Cerebrum inflammatione irritatum, vel nervi humoribus nunc acrioribus redditis stimulati, liquidum nervosum in musculos, majore copia & sine ægri voluntate, emittunt; hinc tremores & subsultus tendinum. Singultus est convulsio diaphragmatis œsophagum & ventriculum sursum trahentis.

8. Solvitur hic morbus hæmorrhagia, sudoribus, alvi solutione, urina album & equale sedimentum deponente, plerumque circa criticos dies.

9. A febre nervosa distinguitur, pulsu valido & forti, lingua arida & nigra, siti & calore magno, doloribus magis intensis, & prægressa ægri vita. A febre putrida & maligna pulsu forti & valido, rigoribus, sanguine denso crustaque tenaci cooperto, & præcedente victu.

10. Prognosis non tam infausta & infida in hac febre quam in nervosa vel putrida, ob pulsus validitatem. Quo severiores rigores, eo intensior febris. Quo minus rubent oculi vel facies, quo acies oculorum minus obtusa est, quo mitiora sunt symptomata circa ventriculum & intestina, eo minus periculi est. Sitis soluta manente linguae ariditate; urina rubra in pallidum colorem mutata; vox clangosa; vigiliæ protractæ; delirium diu durans; floccorum collectio; pudoris neglectus; coma; frigus exteriorum quando interiora uruntur; sudor

circa pectus vel frontem, mala signa sunt. Maximum periculum ostendunt magna spirandi difficultas, subsultus tendinum, singultus, urinæ & fecum involuntaria & inscia excretio. Ad extrema ventum esse testantur oculi pulverulenti & squalidi, purpura alba, & alvus corruptas feces, junctis torminibus, profundens.

II. Indicatio curatoria, experientiæ & rationi consentanea, est, sanguinis turgentis vim refrænare, & ejus spissitudinem diluere. Perficitur, 1. Venæ sectione toties repetita donec pulsus ad debitam vim redigatur. Caveat medicus ne pulsu nimia repletionem oppresso decipiatur; talis enim venæ sectione fortior fit. 2. Potionibus tepidis, aquosis, in magna copia haustis, vel per anum & cutem introductis, ad viscidum sanguinem diluendum, & nimis tensas fibras relaxandas. 3. Acidis vegetabilibus & nitro potionibus admixtis, ad calorem refræmandum. 4. Emplastris epispasticis, post debitam evacuationem; applicatis, quæ viscidum sanguinem dissolvunt, obstructions internas aperiunt, & pulsus duritiem tollunt. 5. Abstinencia, quamdiu vires supererunt; & cibo levissimo, forbili, si deficient. 6. Aere quam maximi conclavis renovato, & frigidiusculo, præcipue in calidis tempestatibus & regionibus, & admodum levibus vestimentis,

evitatis omnibus calefacientibus & pulsum concitantibus.

12. Nimis mihi videtur incerta, & prudenti medico evitanda, medela ab antiquis usitata, qui, quarto die vel subsequenter criticis diebus, magna siti antecedente, aqua frigida ad satietatem data, per quam ingens effundebatur sudor, pro medicamento usi sunt. Ægrum certius pessundabit, si ulla adsit viscerum inflammatio.

13. Quædam symptomata mitigationem postulant. Anxietas, si a corde sanguine oppresso oritur, venæ sectione & diluentibus; si a ventriculo oppresso, vomitu tollatur. Nausea & vomitus curantur levissimis vomitoriis & medicamentis stomachicis dictis. Si adsit ventriculi vel viscerum inflammatio, emetica cane pejus & angue vitanda sunt.

Premente capitis dolore, delirio, vigiliis vel comate, insigniter juvant hirudines, vel epispastica temporibus applicata, epispastica magna, vel pulmonis portiones aliquæ ex agno recens intersecto calentes capiti raso impositæ, & enemata laxantia, evitatis opiatas. Hæc symptomata plerumque solo tempore, & febre intra debitos limites constituta, vincuntur.

Ad singultum & subsultus tendinum confert moschus & ante dicta medicamenta, quæ cerebri inflammationem mitigant.



## S E C T. I I.

*Febris lenta vel nervosa.*

1. **L**ENTA vel nervosa febris ita nuncupatur a lento ejus progressu, vel a nervoso systemate præcipue affecto. Morbum pituitosum vel cardiacum appellant antiqui scriptores.

2. Causæ remotæ sunt laxæ fibræ, debileque systema nervosum; nimix evacuationes; repetitæ mercuriales salivationes; venus immodica; animus tristitia depressus; vigiliæ studiaque nocturna; aer carcerum subterraneorum humidus & stagnans; diætâ cruda & nimis tenuis, præcipue ex fructibus vel vegetabilibus aquosis & frigidis; potiones aquosæ & viscidæ; tempestates pluviosæ, & humida mollisque hiems.

3. Hujus causa proxima videtur esse lentor vel visciditas feri, lymphæ & succi nervosi, cum acrimonia a contagio vel obstructione orta. Patet a causis proximis, sanguine detracto, pituita e ventriculo rejecta, & congruentia cum morbis a serosa colluvie ortis.

4. Hinc sævit præcipue in ultima corporis vascula, nempe serosa, lymphatica & nervosa; quin potius in ipsum cerebrum cerebellumque, uti docet color subluridus, pallor & exsiccatio ulcerum, omnium sensuum depravatio,

depravatio, summa debilitas, totius morbi contemplatio, et suppurationes in cerebro cerebelloque inspectione cadaverum detectæ.

5. Obrepat morbus dejectione animi; appetitu prostrato; oppressione; insomnio; suspiriis reiteratis; gemitu involuntario; terrore animi; inusitata lassitudine post motum; & frigoris calorisque alterna successione. Elapsis diebus aliquot, accedunt vertigo vel dolor capitis; nausea et vomitus pituitæ insipidæ; summa virium prostratio; calor haud insignis; sitis nulla; pulsus frequens; debilis et quandoque intermittens; lingua humectata, alba, et muco viscido obducta; præcordiorum oppressio et respiratio difficilis; urina pallida, aquosa, et aliquando instar feri lactis; insomnium somno simillimum; faciei rubedo et calor dum pedes algent; mens leviter perturbata vanis imaginibus, illisque addicta, sed sine furore; sudor immodicus vel diarrhœa colliquativa; sensuum externorum et internorum hebetudo et tarditas; anxietates et animi deliquia. Jam fatiscit natura diuturnitate morbi; tremit lingua; extremitates frigent; ungues livent; perditur omnino visus et auditus; delirium in coma vertitur; inscie elabuntur fæces et urina; adest tendinum subsultus; moritur æger.

6. In sanitatem gradatim terminatur, opitulante salivatione, leni sudore, diarrhœa

et urina turbida, sed plerumque sine ulla evidenti crisi.

7. Vasa minima et nervosum systema lentefcente sero obstruitur; hinc debilitas, terrores, dolor capitis, delirium, pulsus debilis et citatus, hebetudo, et deliquia, &c. A sanguine seroso latice scatente calor moderatus, nulla sitis, urina pallida, pituitæ secretiones, sudor, diarrhœa, &c. obstruentes humores corrumpuntur, cæterosque inquinant; hinc dira morbi jam ad mortem tendentis facies.

8. Febris inflammatoria validissimos præcipue adoritur, motum arteriarum validum, calorem urentem, urinam rubram & densum sanguinem habet, citoque sua stadia decurrit: at in febre nervosa omnia hisce contraria accidunt. Antecedens calor aeris vel diætæ calefaciens, dissolutio sanguinis, urina ruberrima, sitis magna, petechiæque & diversitas medelæ febrem putridam malignam a febre descripta distinguit, quamvis in multis consentiunt.

9. Prognosis fausta si leve delirium, si vires non admodum fractæ; si pulsus administratis cardiacis plenior fiat; si circa finem morbi lenis sudor vel diarrhœa, sed præcipue salivatio sine aphthis; si tumores circa aurem appareant; si eruptio miliaris, non præcedente profuso sudore, adsit. Ab aliis inter bona signa, a me, experientia ita tes-



tante, inter mala habetur surditas. Infaustam efficiunt prognosim perdurans ultra quartum diem forte delirium; magnæ evacuationes; sudor supra consuetudinem & modo & tempore ex thorace, cervice & capite, pedibus tantummodo cruribusque siccioribus & frigidis; subsultus tendinum; tremores manuum vel linguæ; vigiliæ; diarrhœa colliquans cum pulsu debili; cæcitas, & deglutitio impedita, præcipue cum singultu. Si frigescent manus, fauces livescant, sanguis e vasis effluat, vel petechiæ appareant, vix ulla medicina periculo subtrahit.

10. In hujus morbi medela, 1. Phlebotomia semper nocet, nisi ubi adsit status sanguinis inflammatorius, quod in quibusdam epidemicis constitutionibus accidit. 2. Primæ viæ purgandæ leni vomitorio, rhœo, & clysmatibus in astrictione alvi tertio quoque die repetitis. 3. Epispastica, per totum morbi decursum se invicem excipientia, lentorem dissolvunt & evacuant. 4. Diaphoresis lenis cardiacis attenuantibus promovenda, dummodo sudor non eliciatur. 5. Vires, vino, aqua pulli, & diata refocillante, sustentandæ.

11. Si remissio appareat, vel sudores ægrum exhauriant, cort. Peruv. felicissimos habet effectus: per quem, si consequi potuimus, ut & sudoris impetus minuatur & vita prorogetur, incipit jam tempus ipsum esse

præsidio. 2. Diarrhœa colliquativa rheo & opiatīs moderanda. 3. Respiratio difficilis & anxietas epispasticis cedunt.

12. Quare hisce temporibus, magis quam præteritis, sævit febris nervosa?

### S E C T. III.

*Febris maligna, putrida, vel petechialis.*

1. **F**ebbris maligna, putrida, vel petechialis ita dicitur a maligna ejus natura, putrescentibus humoribus, maculisque lividis. Petechiæ ab antiquis medicis adumbratæ, sed ab hodiernis melius describuntur.

2. Qui laxo habitu, sanguine phlegmatico-sanguineo, animoque mœsto præditi sunt; qui pravorum alimentorum ingluvie, venere, fame, laboribus, vigiliis debilitati, facillime hoc morbo corripiuntur, & difficillime emergunt.

3. Causæ remotæ sunt nimia carniū vel piscium ingurgitatio sine pane; diætā nautica ex salitis & semiputrefactis carnibus, aquisque putrescentibus; nimius salis alkalini, fixi, vel volatilis & aloes usus; fruges pluviis vel horreis humidis corruptæ; tempestates humidæ austrinæ, comitante vel potius antecedente magno calore; effluvia ab aquarum inundationibus putrescentibus, vel paludibus prope exsiccatis, vel animalibus aut vegeta-

bilibus putrefactis ; aer nosocomiorum , navium , carcerum , vel ergastulorum stagnans , & fordibus inquinatus ; contagium.

4. Causa proxima est putrida humorum dissolutio ; uti docet effectus putridorum fermentorum , anima foetida , sanguis dissolutus & cito putrescens , urina ruberrima nigrumque sedimentum deponens , sudores olidi & sanguine tincti , petechiæ , cita cadaveris putrefactio , & similitudo cum febris ab ichore gangrænofo absorpto productis.

5. Ad sunt calor intensus , mordax & remittens ; pulsus tensus , parvus , frequens & inæqualis ; pulsatio arteriarum carotidarum & temporum ; summa virium prostratio & imbecillitas ; animus anxius , dejectus , & pessima quævis ominans ; nausea , vomitusque bilis nigraë ; dolor capitis & temporum ; oculi inflammati & dolentes circa fundum ; color infumatus ; tinnitus aurium ; respiratio laboriosa , interrupta cum suspiriis , & anima foetida ; dolores in ventriculo , artubus & dorso ; decubitus difficilis ; tremor ; delirium ; lingua primo alba , dein nigra aridaque ; labia & dentes tenaci forde oblinita ; sanguis lividus , dissolutus , vix cohærens , citoque putrescens ; sitis inexplibilis , cum oris amaritudine ; urina primo pallida , sed in morbi incremento ruberrima , immo aliquando nigrescens cum sedimento instar fu-



liginis; sudores fœtidi & sanguine sæpe tincti; dejectiones graveolentes, lividæ, nigræ, vel sanguineæ; maculæ lividæ parvæ, instar morfûs pulicum; petechiæ, vel si latiores, vibices dictæ; hæmorrhagiæ, aphthæ, ulceratio faucium, & singultus.

6. Inspectiones cadaverum, cerebrum & viscera, præcipue ventriculum & intestina, inflammata & sæpe sphacelata detexerunt.

7. Miasma deleterium per nares admissum cerebrum nervosque primo afficit: hinc symptomatum nervosorum origo; in ventericulum cum saliva delatum, vomitum, anxietatem præcordiorum, &c.; in venas assumptum, sanguinis putrescentiam & dissolutionem producit; hinc delirium, calor intensus, fitis inexhausta, dejectiones alvi, urinæ, ut & sudores sanguinei & fœtidi, petechiæ, sphacelusque.

8. Distinguitur a febre inflammatorîa, pulsu parvo, dejectione animi, dissolutione sanguinis, petechiis & putredine excrementorum; a febre nervosa, calore, urina ruberrima, fiti, petechiis & putredine; a peste, lenitate potius symptomatum, quam secundum genera differentiâ.

9. Prognosis semper incerta; sed minus periculi si symptomata lenia sint, diarrhœa vel sudor fœtidus in morbi declinatione oboriatur, vel petechiæ colorem nigrescentem splendidiore mutant. Signa funesta sunt nu-

merosa macularum nigrescentium progenies, earum subita evanescencia, aphthæ nigrae, sitis nulla, fauces inflammatae, laboriosa post eruptionem respiratio, abdominis tumescencia cum alvo soluta, dejectiones foetidissimæ & ichorosae, frigus extremitatum & convulsiones.

10. Si signa adsint plethoræ vel inflammationis, 1. Venæ sectio semel celebranda; iterum repetita plerumque nocebit. 2. Primæ viæ a sordibus purgandæ vomitu, leni alvi subductione, & clysmatibus in astricta alvo tertio quoque die repetitis. 3. Diaphoresis promovenda lenissimis & præcipue subacidis diaphoreticis. 4. Putrescentia humorum resistenda vel corrigenda antisepticis, quorum præcipue celebrantur acida vegetabilia, fermentata vel mineralia, camphora & cortex Peruvianus. 5. Vis vitæ sustinenda diæta acescente & vino austero rubro aut Rhenano, situque supino. 6. Aer inquinatus corrigendus.

11. Si pulsus deficiat, delirium oriatur, vel petechiæ retrocedant, tunc, & non antea, usurpanda sunt epispatica.

12. Sani infectionem præcavent vitando aerem inquinatum, vel corrigendo focis, ventilatione & antisepticis; salivam ope mastichati gummi myrrhæ in locis infectis exspuendo; vitando mœstitiā, curam, cru-

ditatem, fatigationem, calorem & libidinem; ad hilaritatem bibendo.

13. Quare nuperis annis tam raro sese monstraverunt febres putridæ malignæ?

## SECT. IV.

### *De harum febrium complicationibus.*

1. **M**ire sæpe inter sese complicantur hæ tres diversæ febrium species, uti inflammatoria cum maligna, maligna cum nervosa, & nervosa cum inflammatoria. Tales febres sæpe mihi contigit vidisse.

2. Hæ sana mente & summa peritia medici indigent, cujus officium est speciei prævalenti, ideoque periculosiori, altera haud omnino neglecta, succurrere.

## SECT. V.

### *Febris intermittens.*

1. **I**ntermittens febris hæc est, quando inter paroxysmos febriles plena *απυρεξία*, vel intermissio a febre. Sydenhamus noster in symptomatibus describendis deficit; sed in distinctionibus, natura, morbis pedissequis, & curatione omnibus anteit.

2. Distinctio 1<sup>a</sup>. In vernalem & autumnalem. 2<sup>da</sup>, In quotidianam, tertianam, quar-



tanam, &c. & irregularem. 3tia, In tertianam duplicem, semitertianam, quartanam duplicem, quartanam triplicem. 4ta, Epidemiam & endemiam.

3. Causa remota est nimia humiditas in aere; 1. Quia veniunt temporibus anni humidis. 2. Aufugiunt temporibus ficcis. 3. Quo magis humidum tempus, eo magis sæviunt. 4. In locis aquosis paludosis semper grassantur. 5. Quando constitutio favet, morem gerunt humiditati aeris per hygrometrum mensurata.

4. An humiditas operatur fibras relaxando? Ita videtur: quia, 1. Aqua fibras animales longiores & minus elasticas reddit. 2. Qui tensas fibras habent, minus obnoxii huic morbo. 3. Qui vinum aut spir. vini bibunt, minime obnoxii. 4. Pulsus revera tardior humidis temporibus quam ficcis. 5. Intermittebat curatur calidis & astringentibus.

5. Sequitur imminuta perspiratio a vi fibrarum diminuta: ergo impedita perspiratio Sanctoriana & laxa fibra, causæ proximæ. Sua enim mole ruunt theoreticæ medicorum opiniones de origine hujus mali: ruit sanguinis fermentatio chylum acidum corrigenens, uti Willisio visum est; fermentatio bilis & lymphæ in duodeno & corde, uti Silvio; recursus & fermentatio succi nervosi in transitu per nervos & glandulas in vasa lymphatica obstructi, uti Borelli placuit;

crudæ acidæque sanguinis particulæ in superficie corporis hærentes, & fibras ibi vellicantes, ut Jones asseruit; aciditas sanguinis succum nervosum inficiens, ut Bezanfon contendit.

6. Paroxyſmus ſe dividit in tria ſtadia, 1. Frigoris; 2. Caloris; 3. Sudoris.

Primum ſtadium incipit oſcitatione; paniculatione; ſenſatione quadam in dorſo, aut digitorum extremitatibus, haud verbis deſcribenda. Inſequitur horror; tremor; dentium quaſſatio; ſummum frigus quod ad ſenſum, quando re vera magis calet corpus; vomitus; dolor articulorum, dorſi, capitis; reſpiratio difficillima; urina pellucida; pulſus celer, parvus, debilis, contractus, propterque tremores vix numerandus. Durat per horam unam, duas, tres, vel quatuor. Stadium periculoſiſſimum.

Frigore gradatim recedente, a tergo urget calor vix tolerandus. Arteriæ ſe dilatant, digitumque cum impetu feriunt. Reſpiratio fortis & libera. Dolet caput; deliriumque aliquando adest. Sitis maxima, cum lingua alba. Præcordiorum calor magnus. In regione ventriculi dolor & aliquando tumor. Urina rubella. Sanguis detractus plerumque ſolito denſior, præcipue vere, nonnunquam gravibus locis & temporibus ruber ſuperne, inferne niger eſt, cum parva feri portione, & minore quam in ſanitate cohærentiâ. Stadium ſecundum.

Tandem ægro fere exarescente tertium stadium incipit, cum copioso per totum corpus sudore. Omnia nunc remittunt symptomata, continuatoque per tres quatuorve horas sudore, omnino disparent; urina rubra sedimentum deponit lateritium; somnus; intermissio.

Inter paroxysmos, debilitas, ad sudorem proclivitas, & appetitus prostratus.

7. Omnia hæc symptomata a laxa fibra & retenta perspiratione originem plane ducunt. Sanguis inflammatus & viscidus in extremis vasis hæret; hinc sensus frigoris. Tremoribus repetitis solvuntur obstructions. Sanguine inflammata febris accenditur. Vasa cutanea laxata, tantam vim sustinere non possunt; ergo sudor copiosus febrem tollens. Eadem fibrarum laxitate remanente, iterum redit paroxysmus. A ratione composita ex diversa sanguinis inflammabilitate, diversa perspirabilis materiæ quantitate, diversaque fibrarum laxitate, diversæ oriuntur intermittentium species.

8. Aliquando citius, aliquando tardius solvuntur, uti epidemici constitutio permittit. Ægrum nonnunquam per plures menses fatigant.

9. Insequuntur sæpe dolores rheumatici, febris hectica, aqua intercus, hydrops, scorbutus, icterus, lien induratus & tumefactus, rachitis, diabetes, desipientia.



10. *Diagnos*is in primi paroxyfmi initio haud parum difficilis a febre continua. Tremor validus et frigus magnum, sine ullo interposito calore, tres vel quatuor horas durans, priorem; tremores parvi, frigus calorque viciffim, posteriorem potius indicant. Notitia epidemici regnantis diagnofim confirmat. Species diverfæ, duobus paroxyfmis elapfis, certe folummodo cognofcuntur.

11. *Prognofis* bona quando in labiis puf-  
tulæ apparent. Quo magis regularis febris intermittens in tribus ftadiis, eo melior. Epidemicæ pejores quam fporadicæ; quartanæ quam aliæ; autumnales quam vernaes. Hydrops incerta; fi a fcirrho vifcerum oritur, mortem denunciat. Tonfillarum inflammatio lethalis. Infirmiffimos fenefque primum ftadium nonnunquam rapit. Nimio motu, frigore, fudore impedito, medicamentis calidis mutatur in morbos acutos pleuriticos.

12. *Curatur*, 1. Venæ fectione parca, fi pulfus plenus, aliudve fymptoma poftulat, quod sæpe accidit in vernalibus. 2. Sudorificis. 3. Vomitu ita exhibito ut ante paroxyfimum totum corpus fortiter concutiat. 4. Medicamentis calefacientibus interne af-  
fumptis. 5. Extra applicatis forma olei, linimenti. 6. Salinis aperientibus. 7. Aftringentibus. 8. Cortice Peruviano. 9. Corpus inftaurando friftione; equitatione; cibo re-

ficiente, & quam maxime ab accessione futura reducto; vino; loci mutatione. Caveat jam convalescens a solita paroxysmi hora & die; diu enim meminisse convenit. Facile revertitur, nisi a sano aliquandiu timetur.

In paroxysmo indicantur multus potus diluens, acidulus, & moderatus calor.

13. Rheumatismus curatur frictione, calore & unguentis deobstruentibus. 2. Febris hectica curatu difficilis; profunt venæ sectiones parvæ sæpius in statu sanguinis inflammatorio perficiendæ; epispastica repetita, & agitatio mitis. 3. Aqua intercus & hydrops, purgantibus & corroborantibus: incisio pedum aquæ exitum patefacit. 4. Scorbutus raro medicamenta requirit; tollitur alvum ducentibus & deobstruentibus. 5. Icterus & lien induratus, medicamentis aperientibus saponaceis. 6. Rachitis, purgantibus & corroborantibus. 7. Diabetes, corroborantibus. 8. Desipientia, calefacientibus, instaurantibus, corroborantibus.

14. An certis præfidiis muniri potest corpus contra intermittentes, & quibus? Quare vernalis sanitatem promittit? An licet post morbum purgare? Quare aliquando stadium primum frigoris, aliquando tertium sudoris, nonnunquam utrumque, absunt? Quare tam sæpe relapsum patiuntur ægri, quando huic morbo favet aer? Quare quartana omnium curatu difficillima?

## S E C T. VI.

*Febris remittens.*

1. **Q**Uando in febre remissio certis vel incertis temporibus accidit, tunc febris remittens appellatur.

2. Distinguitur, 1. In quotidianam & tertianam. 2. Quando eodem tenore progreditur usque ad crism, vel mutatur in intermittentem.

3. Similem, sed longe fortiorem habet causam remotam ac febris intermittens. Probatur iisdem argumentis. Requiritur quoque, ni fallor experientia, præteriti & præsentis caloris intensior vis.

4. Calor & humiditas agunt in corpus humores magis acres reddendo, fibras relaxando, perspirationem impediendo, & majorem in sanguine permutationem concitando.

5. Separat se morbus in duo stadia, accessionis & remissionis.

6. Incipit, uti febris, oscitatione, pandiculatione, capitis levitate, frigore & calore alternatim. Sequitur febris & calor continuus. Nonnunquam delirium cum primo insultu adest. Sitis, vomitus bilis, dolor capitis, dorsi & articulorum, excruciant. Regio ventriculi dolet & tumet. Sanguis modo densus, modo dissolutus. Lingua alba & humida. Insomnia vexatur. Color ictericus in



cute & oculis. Pulsus nonnunquam duriusculus, raro plenus. Alvus alias obstructa, alias nimis soluta. Parvo plerumque sudore antecedente, febris remittit secundo, tertio, quarto, quinto, sexto, septimo vel octavo die, quem rarissime prætergreditur remissio: mitigantur omnia symptomata. Elapsis horis aliquot, vesperi plerumque, redintegratur febris vis, antecedente fere frigore, aliquando nullo.

In paroxysmo sæpe rapitur æger. Cerebrum immediate afficitur. Sensus & loquela pereunt. Respiratio acceleratur. Deglutitio impeditur. Diarrhœa supervenit. Pulsus initio mollis, vix debilis, non instans periculum indicat; sed paucis horis in tenuem & depressum mutatur. Obrumpunt sudores frigidi. Moritur. Aliquando, cessante per octo horas paroxysmo, plena sed infida intermissio, uti bis mihi contigit videre.

Perficit suum cursum exacerbationibus & remissionibus febris ad solutionem, vel mutatur in intermittentem; nonnunquam etiam in continuam febrem transit ab aucto aeris calore, vel nimis calidis remediis.

7. Hæc symptomata a laxa fibra, & inflammatoria sanguinis diathesi facillime deducuntur.

8. Crisis secundum indolem febris accedit sexto, septimo, &c. ad quartum decimum diem, quem raro transit morbus. Per-

ficitur sudore copioso, salivatione, ictero universali, vel sanguinis ex naribus effusione. Rarius conspicitur magis optanda crisis per icterum vel hæmorrhagiam.

9. Cessante morbo, sæpe remanet dolor capitis acutus, vel tanta levitas, ut pedibus incedere non possint ægri; dolores rheumatici; hydrops, & cætera mala quæ intermittentes sequuntur.

10. Diagnosıs ex antedictis facilis.

11. Nullus incertior morbus, neque unquam periculo vacat. Quo magis intermittenti appropinquat, vel a febre immunior in remissione, eo melius; quo magis febris continuæ, quo brevior remissio & violentior paroxysmus, eo periculosius. Urina antea rubra, tenuis facta, haud leviter terrere debet. Si remittens in continuam mutatur, in dubio vita est. Quando cerebrum affectum, & cætera symptomata antea descripta superveniunt, mors subest.

12. Totus in curatione scopus hoc nititur fundamento, ut remissio febris ad intermissionem deducatur. Perficitur, 1. Venæ sectione. 2. Vomitu. 3. Alvi subductione, purgantibus lenioribus, & clysmatibus. 4. Potu multo aquoso diluente; acidis vegetabilibus; refrigerantibus. 5. Epispasticis, quæ egregie huic scopo satisfaciunt. 6. Victu forbili & refrigerante. Convalescentibus diata magis siccans convenit.

Quando

Quando plena intermissio, morbus profligatur cort. Peruv. Si non transit in intermittentem, debellatur sudorificis medicamentis, haud calefacientibus, in sudoribus criticis rite exhibitis.

13. Symptomata mitiganda: 1. vigiliis, opiata; 2. Dolori capitis, hirudines, & epispastica ad tempora applicata; 3. Diarrhoeæ symptomatice, rheum, & astringentia cum sudorificis; 4. Capitis levitati, morbo cessante, opiata; 5. Cæteris symptomatibus, remedia in intermittente descripta, conveniunt.

14. Ad medicinam prophylacticam conducunt, humidi aeris correctio igne, aromaticis, &c. matutini aeris evitatio; victus lautus; vinum rubrum; exercitium; balneum frigidum; cortex cum amaris; nicotianæ fumus. Hæc ad intermittentes quoque pertinent.

15. Quare febris remittens sudorificis sæpe mutatur in continuam? Quare calore aeris superveniente magis accedit ad febrem continuam? Quare minus in recidiva periculum?



## SECT. VII.

*Febris hectica, vel marasmus.*

1. **F**ebbris quæ leniori gradu procedit, vires debilitat, tabemque infert, hectica dicitur.

2. Distinguitur in hecticam idiopathicam, & symptomaticam. Hecticæ symptomaticæ originem trahunt ab infarctionibus scirrhis & ulceribus omnium viscerum, sed præcipue pulmonis & mesenterii; quia prior aeris externi injuriis & totius sanguinis pertranseuntis momento patet; posterior compressioni alimentorum in primis viis, viscido chylo & leniori sanguinis per intestina motui pœnas dat. Harum descriptio & curatio ad morbos, a quibus pendent, releganda est.

3. An ulla datur hectica febris, quæ primario & immediate ab aliqua sanguinis acrimonia provenit? Multas mihi certe contigit vidisse, ubi nullum viscus præ aliis, per totum morbi decursum, laborabat. Neque fidem huic opinioni derogant viscerum obstructions, quæ semper in cadaveribus inveniuntur. Effectus enim, æque ac causæ sunt febrium hecticarum.

4. Huic opinioni quoque favet contemplatio causarum remotarum, quæ hecticas inducunt; quales sunt animi pathemata im-

moderata, moeror diuturnus, ira, curæ vel vigiliæ; nimix evacuationes sanguinis, lactis, feminis, salivæ, puris, sudoris vel fæcis alvinæ; medicamenta nimis acria, uti mercuriales præparaciones, purgantia acria; debilitas primarum viarum, qua chylus crudus vel fermentatione inquinatus ad sanguinem deferitur; morbi prægressi, uti intermittentes, variolæ, hydrops, scorbutus, scrophula; evacuationes cohibitæ; frequens inebriatio.

5. An hæc acrimonia est salinæ & alkalæscæntis naturæ? Ita videtur a prægressis causis remotis, & medela, ubi succi mucilaginosi & acida profunt.

6. Symptomata eadem fere sunt ac in phthsi. Adfunt calor præternaturalis, perennis & præficcus; appetitus prostratus; pulsus debilis, parvus & frequens, sed sumpto cibo fortior & plenior; sitis; nullus ægritudinis sensus; urina rubra & pelle pinguedinosa cooperta; ruborque genarum post pastum. Oculi nunc cavantur; venter contrahitur; cutis durefcit; somnus non reficit; diarrhœa advenit; corpus contabescit; & mors lento gradu advenit.

7. A fluidis acribus & febre depascente oriuntur hæc symptomata.

8. Facillime dignoscitur ad omnibus aliis febribus lento suo progressu.

9. Curationem admittit si tempestive oc-

curritur. Sed quando vires maxime prosteruntur, crines defluunt, diarrhœa colliquativa, sudores nocturni, pedum tumor, urina oleaginosa, vel facies Hippocratica superveniunt, actum est de ægro.

10. Huic sanguinis acrimoniæ obviamitur, 1. Demulcentibus & inviscantibus medicamentis, uti emulsionibus ex amygdalis dulcibus; decoctis ex vegetabilibus mucilaginosi, hordeo, althæa, tussilagine, &c. jusculis pullinis, gelatinis & ostreis, si stomachus ferat. 2. Diæta, lactea, lacte præcipue asinino vel muliebri, feroque lactis præcipue caprini. 3. Corroborantibus & leniter astringentibus, uti conserv. rosar. rubr. tinct. rosar. elix. vitriol. cortice Peruviano, aquis ferrugineis, &c. 4. Equitatione continuata & peregrinatione. 5. Primas vias a fordibus liberando vomitu leni & rheo. 6. Attentione semper habita ad causas remotas, a quibus ortum duxit, videl. inebriationem, evacuationes suppressas, materiam retropulsam, aliasque.



## PARS TERTIA.

*De febribus quæ oriuntur in partibus.*

## S E C T. I.

*De inflammatione in genere, ejusque terminatione per resolutionem, abscessum, grænâ vel scirrhum.*

1. **J**AM procedendum est ad eos morbos qui in partibus oriuntur, pauca de inflammationibus in genere, earumque terminationibus, præfatus, ut sequentia melius intelligantur.

2. Inflammatio varia sortitur nomina secundum speciem vel partes affectas, videl. Erysipelatis, phlegmonis, furunculi, phrenitidis, ophthalmiæ, &c.

3. Omnes quotquot sunt inflammationum diversæ species oriuntur a stasi vel stagnatione particularum sanguinis rubrarum, in vasis minimis sanguineis vel serosis hærentium, fluidorum transitum impredientium, & irritationem producentium.

4. Has inflammationes excitat, 1. Quodcumque vasa arteriosa ita coarctat, ut eorum diameter minor sit diametro particulæ rubræ, quamvis elongatæ, quale spasmus, irritatio, vulnera, contusio, luxatio, fractura, ligatura, ambustio, &c. 2. Quodcumque adu-

nat & inspissat sanguinem, ut arterias pertransire non possit, quale frigus, frigidus potus, spiritus fermentati, motus vehemens, & medicamenta, vel venena inspissantia.

3. Quodcunque particulas rubras in ora vaporum serosorum adigit, uti vehemens motus, radii solares, & plethora.

5. In omnibus inflammationibus pars tumet, rubet, dolet, & plerumque splendet; pulsus citatur; fitis adest; pulsatio in parte affecta sentitur; sanguisque detractus viscidus & pellicula coriacea semper fere coopertus.

6. Quia plus affluit per arterias quam refluit per venas, pars tumet. Celerior circulatio, ideoque major attritus, in vasis patentibus calorem efficit. Splendet, quia a superficie magis æquabili plures reperiuntur radii. Distentio fibrarum dolorem, febrem, & sanguinis densitatem excitat. Obstacle impulsui sanguinis resistit; hinc pulsatio.

7. Inflammatio terminatur resolutione impactæ materiæ, suppuratione, gangræna, vel scirrhus.

8. Impacti globuli rubri attenuantur, & in circulum iterum redeunt, 1. Diminuendo impetum sanguinis a tergo urgentis, venæ sectione, alvi ductione, & inedia. 2. Vasa ipsa inflammata, vel quam proxima, deplendo scarificatione, hirudinum applicatio-

ne, &c. 3. Vasa externa relaxando fomentationibus & cataplasmatibus emollientibus, mucilaginosi, oleosi que; & calore. 4. Sanguinem inspissatum & impactum attenuando potu multo tepido diluente, & medicamentis attenuantibus stimuloque carentibus. 5. Causas remotas tollendo.

9. Si materia obstruens non resolvitur ante quartum diem, tunc stagnatione & calore humores corrumpuntur, vasa jam emollita dissolvuntur, & constituunt liquidum albicans pus appellatum.

10. Si symptomata inflammationis non remittunt, sed augeantur, suppuratio post quartum diem promovenda est medicamentis pinguibus oleosis maturantibus dictis; calore partis affectæ; plenioris diætæ; & cardiacis, si adsit debilitas, interne sumptis. In statu plethorico suppuratio promovetur venæ sectione. Ope chirurgiæ exitus materiæ paratur.

11. Inflammatio sæpe mutatur in gangrænam vel sphacelum. Hæc gradu solummodo differunt. Gangræna incipientem putrefactionem, sphacelus jam factam declarat. Cancrum veteres appellarunt.

12. Gangrænam inducunt, 1. Omnia quæ vasa ita comprimunt & constringunt, ut omnino denegetur humoribus transitus, qualia sunt rodentia medicamenta, ambustiones graves, frigus summum, adstringentia, & quodcumque inflammationem primario excitavit.



2. Omnia, quæ corpus vel partem affectam debilitant, ut propulsioni sanguinis non sufficiant, qualia senectus, pathemata relaxantia, hydrops, nimia humiditas, & externæ applicationes oleosæ. 3. Omnia, quæ tantam in humoribus acrimoniam gignunt, ut stasi semel facta, in summam putredinem ruant, qualia sunt prava diætâ, scorbutus, phthisis, erysipelas, febres malignæ & pestilentialiales, nonnullaque venena.

13. Causa proxima est putrida partium solidarum fluidarumque fermentatio, a motu sanguinis omnino intercluso, ejusque quiete excitata, & particulis phlogisticis præcipue inhærens.

14. Talem gangræna progressum habet. Primo tumor in apice flavescit, dolor mitigatur, & color obfuscatur. Cutis relaxatur, vestigium prementis digiti retinet, omnem fere sensationem amittit, & livescit. Tumida partis elevatio conspicitur, quæ in proximâ quoque sese diffundit. Elevantur pustulæ ichorem subflavum continentes & in basi nigrescentes. Tunc cutis partesque subjectæ corrumpuntur, emoriuntur, nigrescunt, frigent, omnem sensum amittunt, & in saniem foetidam, graveolentem, disfluunt. Serpit gangræna vicinaque corripit; tandem horrores, febris, sudores frigidi, pulsus parvus & debilis, & syncope mortem celerissime afferunt.

15. Plus minus nigrescit pars a dissolutione olei spissioris, quo ultimæ connectuntur particulæ. Mollescit a divulsione & separatione harum particularum. Tumescit ab aëre separato & elaterium suum recuperante. Dolor perit ab interclusa omni cum sanis communicatione. Undequaque serpit, quia putridum fermentum eundem motum intestinum exitialem in sanis excitat. Tandem partes putridæ, venis absorptæ, humores contaminant, mortemque afferunt.

16 Prognosis egregie sibi differt secundum locum affectum: gangræna partium externarum sæpe, partium internarum rarissime, vel nunquam, curatur. Periculosior multo, quando ab internis causis, quam ab externis, oritur. Ægroti ratio habenda quoque est; in juvene enim vegeto, nulloque alio morbo laborante, spem sanationis promittere licet, sed in senibus, tardis, impuris, & morbofis, magis incerta devenit prognosis. Suppuratio semel incepta felicem denotat eventum. Sphacelus amputationi soli cedit.

17. Obviam itur gangræna, 1. Tollendo causas remotas quæ eam induxerunt.

2. Scarificatione usque ad partes integras, ut exitus saniei pateat. 3. Fomentationibus ex herbis amaris, stimulantibus, medicamentis calidis & spirituosis. 4. Cataplasmatibus ex medicamentis calidissimis, videl. theriaca, herbis amaris, & spirituosis. 5. Cortice Peru-

viano, quantum ferre potest ventriculus, perinde assumpto.

18. Descriptio scirrhi ad morbos chronicos relegatur.

## SECT. II.

*Phrenitis, sive inflammatio cerebri ejusque membranarum.*

1. **P**hrenitis est febris acuta inflammatoria, orta a sanguine intra cranium congesto, & stipata sævissimo capitis dolore, mentisque alienatione.

2. Distinguitur, 1. A partibus primario affectis, videl. dura matre, vel pia matre, vel cerebro ipso. 2. In idiopathicam & symptomaticam. Prior rarissime in hisce frigidis regionibus apparet; posterior sese associat omnibus fere febribus, sed præsertim malignis, variolosis, & castrensis.

3. Ad hunc morbum præcipue disponuntur mente mobiles; iracundi; in disciplinis litterarum exercitati; caput debile habentes; & ætas juvenilis. Tempore æstivo calidissimo præcipue grassatur.

4. Causæ remotæ sunt vinolentia; vigiliæ; longa expositio, præsertim capite nudato, radiis solis æstuantibus; iracundia; nimia cogitatio; mœror & cura; vehemens desiderium; sedentaria vita; externa violentia.



tia, hæmorrhoidalis fluxus, vel lochiorum suppressio.

5. Causa proxima est stasis sanguinis in ipsa cerebri substantia, vel ejus membranis, vel in utrisque. Hanc docent causæ remotæ, symptomata & sectiones cadaverum.

6. Incipit rigoribus, quos sequuntur calor, dolor & pulsatio capitis; turbatus somnus; sonitus intra caput; aurium tinnitus; oculi inflammati, dolentes, & lumen refugientes; vultus inflatus; auditus acutus, & irritatio a levissimo strepitu; pulsus læpissime debilis, nonnunquam durus, semper humilis & depressus; urina aquosa; vigiliæ continuæ, usque ad octavum diem protractæ; conspicua arteriæ carotidis pulsatio; sanguinis per nares distillatio; magna debilitas, anxietas & suspiria; lingua modo alba & mucosa, modo nigra & arida; iracundia insueta; delirium ferox; convulsiones. Morbo depulso, æger plectitur ad longum tempus vertigine, debilitate & dolore oculorum, acuto auditu, & gravitate capitis.

7. Critice terminatur morbus inter septimum & quartum decimum diem resolutione & ejectione obstruentium humorum per hæmorrhagiam, diarrhœam, vel urinam sedimentum deponentem. Humoribus non resolutis, morbus vel suppuratione,

vel gangræna terminatur : sæpe in alios degenerat morbos , scil. maniam , lethargum , melancholiam vel desipientiam perpetuam.

8. A vasis cerebri inflammatis & obstructis proveniunt sensus externi acutiores , vigiliæ , debilitas , delirium , cæteraque symptomata. Tarde admodum in suppurationem abit hic morbus , quia arteriæ cerebri tunicis destituuntur elasticis , vel secundum alios , tenuiores habent , & quia varie inter sese contorquentur : hinc diminuitur momentum sanguinis.

9. Non exacte ad antiquis scriptoribus distinguitur phrenitis a mania , quanquam in posteriore morbo nulla vel saltem tantilla adest febris. A lethargo dignoscitur vivido colore , respiratione celeriori & pulsu humili ; a delirio , symptomatibus quæ cerebrum ab initio affectum demonstrant. Inflammatio meningum indicatur duritie ; cerebri , mollietie pulsûs.

10. Morbus periculosissimus est a summa partis ad vitam necessitate. Viri gravius laborant , & ægrius evadunt quam femina. Quo audaciores sunt ægri , & quo magis a natura sua recesserunt , eo in majore versantur periculo. Hæmorrhagia narium bona. Mali ominis est phrenitidem in lethargum mutari. Aphonia , convulsiones , singul-

tus, vox tremula, pro signis maxime infaustis habenda sunt.

II. Indicatio curatoria est impetum sanguinis in vasa diminuerе, & humores im-  
 pactos dissolvere. Perficitur, 1. Venæ sectione a vena jugulari, vel arteria temporali, repetita quousque vires finunt. Si pulsus hanc non perfert, quod sæpe accidit, præcipue post tertium diem, tunc sanguis per cucurbitulas vel hirudines a temporibus extrahendus, vel nares internæ scarificandæ sunt. 2. Ductione alvi lenissimis purgantibus vel clysmatibus. 3. Involutione pedum in humidis & tepidis involucris, vel cataplasmatibus emollientibus. 4. Nitro, cum pauxillo camphoræ, intus assumpto. 5. Acidis vegetabilibus. 6. Emplastris epispasticis, post debitas evacuationes, capiti applicatis. 7. Potionibus diluentibus, & diætâ tenuissima humectante. 8. Cubiculo obscuro & tenebroso, aere temperato, summa quiete & adstantium silentio.

### SECT. III.

#### *Ophthalmia.*

1. **E**st inflammatio membranarum oculi investientium, præsertim tunicæ albugineæ.

2. Distinguitur, 1. In leviolem, gravio-



rem, & gravissimam vel chemosim. Levior intra limites tunicæ adnatæ & scleroticæ continetur; gravior præter has partes etiam confines palpebras infestat, oculumque vehementi dolore & ardore afficit; chemosis ad ima oculi, ipsamque retinam penetrat, & stipatur delirio, suppuratione, & humorum efflexu. 2. In veram, a causa magis interna; & spuriam, a causa magis externa proveniente. 3. In humidam, ubi multum feri acris; & siccam, ubi parum vel nihil ex oculo affluit. 4. In periodicam, quæ quodam tempore, præcipue circa æquinoctium, infestat; & epidemicam, quæ oritur a diuturna aeris constitutione frigida. 5. In idiopathicam, & conjunctam aliis morbis, videl. lue venerea, scrophula, febribusque nonnullis. 6. In continuam & intermittentem; posteriorem speciem videre contigit, grassantibus febre remittente & intermittente.

3. Causæ remotæ vel externe vel interne agunt. Externe agit plaga; pulvis inspersus; aura frigida borealis liberius admixta; sudor subito suppressus; crebrior conspectus nivis, ignis, solis & colorum splendorum; expositio aeri matutino frigidiusculo & tenebroso, quem excipit tempus antemeridianum calidum & splendescens; fumus acres & metallici; depositio cataractæ administrata. Interne agunt salutares excretio-

nes cohibitæ , uti menses , matutinus sudor , &c. ; scabies , gutta rosacea , vel tinea capitis repulsa ; fistulæ & ulcera consolidata ; crapula ; libidinis intemperantia ; vigiliæ nimis protractæ ; lucubrationes nocturnæ ; præcedentes ophtalmiæ , aliique morbi oculorum ; variolæ & morbili.

4. Causa proxima est obstructio , impletio & distentio vasorum tunicæ albugineæ , quæ in statu sano pellucidum vehunt liquorem , a sanguine ibi congesto. Visus ipse veritatem testatur. Patet quoque experimento ; nam , injecto in ramum carotidis liquore rubicundo , albuginea oculi tunica rufescens et inflammata apparet.

5. Ophtalmia stipatur sensatione veluti muscæ oculo inhærentis ; ardore ; rubore ; tumore ; acuto dolore , ut oculi tanquam ab infixa spina stimulari videantur ; feri falsi & ferventis ex oculis effluxu ; sorde majoribus angulis inhærescente , præcipue post somnum ; visu imminuto vel plane deperdito , & lumen refugiente ; pulsu citato & duriusculo ; arteriarum pulsatione ; tumore palpebrarum & partium circa jacentium. In graviore malo adnata inflammata supra corneam sese elevat : muscæ volitantes obversantur oculis ; pulvisque obscurus , aliarumque rerum incerta simulacra hinc & inde vagantur. Sequuntur suppurationes , maculæ in cornea , humorum spissitudo & corneæ crassities.

6. In diagnosi stabilienda, si præter signa externæ ophthalmiæ, ophthalmico videantur muscæ volitantes in aere oculis obversari, consors morbi & periculi, secundum Pitcarnium, retina est. Hanc opinionem refutavit vir jure magni nominis in ocularia philosophia Porterfieldius, & demonstravit nubeculas volitantes, coloremque corporum obverforum mutuantes, humore aqueo inesse. Grave a lumine incommodum irim & nervum affectum indicat.

7. Levis facile dispellitur: gravissima in oculi suppurationem cum cæcitæte transit: gravior est contumacior: durat per menses; haud raro maculas in cornea relinquit; visus hebetudinem inducit, corneam crassiorē & humores impuriore reddidit. Quando inflammatio interiores partes occupat, periculosior. Laboranti prodest alvi profluvium. Inflammatio oculi, strumis antea labefactati, ægre recedit. Maculæ inveteratæ difficillime sanescunt.

8. Medela nititur, 1. Sanguinis vel feri acris motu a capite derivato; & 2. Stasi inflammatoria discussa.

Humores ab oculo derivantur, 1. Sanguinis, præsertim e jugulari, missione, & secundum plethoram, ætatem, anteaactam vitam, &c. repetita. 2. Cucurbitulam cum scarificatione nuchæ admovendo. 3. Hirudinibus tempore, & sub ipso oculo, sæpius applicatis



plicatis. 4. Medicamentis leniter laxantibus & antiphlogisticis. 5. Vesicatoriis, depletis prius vasis, cervici, pone aures, sed præcipue capiti & tempori, applicatis. 6. Pediluviiis. 7. Ad cutem determinando liberali potione theæ & diaphoreticis, præsertim in fero acri falso. 8. Setaceis & fontanellis in vetusto.

Stasis discutitur, 1. Succos acres & falsos corrigendo potionibus diluentibus & demulcentibus. 2. Vaporem aquæ calidæ ad oculum, recto capite, admittendo. 3. Potu lactis calidi. 4. Superimponendo pulticulam ex candidi panis interiore parte cum lacte cocta, & sæpe renovando. 5. Quando remittit inflammatio, neque antea, linamentis & collyriis leniter repellentibus & exsiccantibus; hæc enim nimis cito usurpata, vel nimis acria, inflammationem potius augent. 6. Abstinencia in initio, dein victu summe temperato; quiete in loco obscuro; oculum tegendo velamine viridi; evitatis spirituosis, vino, fumo tabaci, sternutatoriis, vomitu, ceparum alliique vapore, sermone, vigiliis, motu exæstuante, solis lucidorumque corporum aspectu.

Quidam præcipiunt scarificationem palpebrarum interius, ut ut ipsorum oculorum quam ophthalmoxam vocant, ut hærenti sanguini exitus tempestive paretur. Hæc, non nisi in vehementissimis malis, quæ nullis aliis auxiliis cesserunt, adhibeatur; ut nihil

prætermiffum videatur , quod a nonnullis pro remedio efficaci celebratum fuit.

9. Ophthalmiæ frophulofæ specifica , cort. Peruvianus , mercurialia , & aquæ minerales ferrugineæ purgantes ; venereæ collyria , quæ habent parum merc. dulcis , conducunt.

10. Ad maculas & vifum imminutum , axungia viperarum oculo crebrius instillata ; fal volat. fal ammoniac. oleo majoran. imbutum , & odore crebrius naribus fufceptum ; vapor decoctionis ex rad. valerian. flor. sambuc. fem. fœnicul. oculo admiſſus ; balnea aquæ dulcis , deobſtruentia ; mercurialia , profunt.

11. Ad hoc malum præcavendum utiles funt fonticuli ; venæ ſectio circa æquinoctia ; purgationes ; diætâ refrigerans ; evitata nocturna lectione , præſertim librorum qui typis minoribus exarati funt , aliisque antea memoratis.

## S E C T. I V.

### *Angina inflammatoria.*

I. **A**NGINA a Latinis , vel *συνάγχη* , *συνάγχη* , a Græcis appellata , eſt affectio faucium , quam impedita & dolorifica deglutitio , vel respirandi difficultas , vel utraque ſimul comitantur.

2. Distinguitur, 1. A practicis auteribus in veram & notham. Quando tumor a sanguine congesto provenit, vera angina; quando a sero, notha appellatur. 2. Secundum loca affecta, si sit membrana mucosa tantum, aut radix linguæ cum osse hyoide, initium œsophagi, musculi laryngis vel pharyngis, trachea arteria, glandulæ, tonsillæ, velum pendulum palati, uvula, musculi maxillam moventes, vasa sanguinea, serosa, lymphatica, vel nervi. 3. In idiopathicam & symptomaticam. Sed usui melius accommodatur distinctio, 4. In inflammatoriam & malignam anginam. Incipiam a priore. 5. Illa rursus diducitur in manifestam, ubi tumor apparet; & occultam, ubi nullus conspicitur. Prior a plerisque antiquis Sunanche, posterior Cunanche appellatur; non enim de hisce nominibus consentit scriptorum cohors.

3. Adoritur præcipue mares; juvenes; sanguineos; plethoricos; rufos; cervicem nimis vestientes, raro enim feminæ laborant, morbumque semel perpeffos. Grassatur durante gelu & tempore vernali.

4. Causæ remotæ sunt cohibita perspiratio, præsertim in collo; frigidi aeris in fauces admissio, præsertim si vis applicati aeris equitatione vel rapido motu augetur; potus aquæ frigidæ; nimia harum partium exercitatio cantu, vociferatione, tubarum



flatu, &c. ; aeris epidemici constitutio ; acres cibi , potus , medicamenta vel venena ; particulæ acres , vel fumi caustici , quales infecta , fumi acidi minerales , arsenicales , antimoniales , &c. ; corpora dura & acuta in faucibus hærentia ; evacuationes naturales suppressæ , vel artificiales omissæ.

5. Pro causa proxima agnoscit inflammationem diversarum partium gutturis , quæ deglutioni vel respirationi inserviunt. Autopsia , causæ remotæ , symptomata & sectione cadaverum hanc manifestant.

6. Angina manifesta pharyngem , tonsillas , uvulam , & velum pendulum palati occupans , sese prodit sensu frigoris ; asperitate gutturis ; dolore in deglutienda saliva ; pulsu frequenti , valido & duriusculo ; sanguine denso , crustaque alba cooperto. Fauces , depressa lingua , rubræ , tumidæ , coarctatæ , & inflammatæ apparent , magnaque muci viscidæ copia oblitæ. Aucto tumore , deglutitio & respiratio magnopere impediuntur ; dolor in auribus sentitur ; oculi sunt sanguinolenti & prominentes ; & vultus rubet , tumetque. Æger nunc ore aperto erecte sedet ; nausea frequenter tentatur ; maxillam ob dolorem vix movere potest , & perpetuam instantis suffocationis sensationem habet. Collum externe sæpe tumet , & rubet. Potus per nares rejiciuntur. Tandem , morbo procedente , pectus stridet ,

vultus livescit, pulsus deficit, & æger suffocatur.

Angina occulta, laryngem, vel superiorem tracheæ partem occupans, associatur acuta febre; pungente partis dolore; respiratione celeri & impedita; deglutitione fere illæsa; voce acuta & stridula; oris hiatu; summa pectoris anxietate; sensu suffocationis; tumefactione venarum circa collum & fauces; vultûs livore; læsione omnium cerebri functionum; & subita suffocatione primo, secundo, vel tertio die.

7. Terminatur utraque species resolutione impactæ materiæ, & secretionem per urinam vel sudores; suppuratione tumoris quarto vel quinto die, & effluxione materiæ purulentæ sanguine commixtæ; induratione glandularum in scirrhum tumorem, & gangræna. Rarissime suppuratur angina occulta ob partium tenuitatem & ariditatem.

8. In priore specie deglutitio necessario læsa est, quia partes & muscoli deglutitioni inservientes, nunc tumefactæ & rigidæ nequeunt sine dolore moveri. Tumor partium circa jacentium occludit rimam glottidis, & suffocationem minuitur. Magna mucii copia eructatur a glandulis & cryptis humoribus turgidis. Inflammatio tubæ Eustachianæ, in aurem internam a faucibus tendentis, auris dolorem excitat. A compressionem venarum sanguinem revehentium, & impedito san-

guinis transitu per pulmones, oculi & vultus tument & inflammantur. Nausea ab irritatione faucium provenit. Maxilla inferior fere immobilis, ab inflammatione musculorum ejus motui subservientium. Ob clausum œsophagi iter, materies detrudenda motu convulsivo per nares rejicitur.

In occulta angina symptomata proveniunt a partibus membranaceis asperæ arteriæ & laryngis affectis, & coarctatione rimæ glottidis: hinc pulmones non satis explicantur, sanguinis transitus interrumpitur, & circa cor, venamque cavam accumulatur.

9. Dignoscitur angina a lue venerea, quia prior stipatur febre & magna inflammatione cito ad acumen tendente; sed posterior gradatim obrepit, & fauces depascitur sine febre notabili: ab angina maligna, symptomatibus jamjam describendis.

10. Si pharynx tantum inflammatur, libereque adhuc respirat æger, impedita quamvis deglutitione, in vado adhuc res est. Sed si respiratio multum lædatur cum summa angustia & anxietate pectoris, periculosus devenit morbus. In priore specie post quartum diem suppuratio desideranda; in posteriore nihil boni præsagiri potest, nisi in cita resolutione. Occulta semper periculosa, præsertim si musculus thyreo-arytænoideus, occlusioni glottidis dicatus, inflammetur. Tumor partium externarum bonum dat præ-



sagium; sed si subito evanescat, auctis a materiæ in internas partes translatione symptomatibus, in præcipiti res est. Angina ab aliis morbis originem ducens, corpore debilitato, mala. Imminentem mortem ostendunt spuma oris, lingua tumida & purpurea, rigorque extremitatum cum pulsu intermittente & convulsivo.

11. Indicationes curatoria sunt, 1. Evacuationem & revulsionem sanguinis a partibus affectis; & 2. Resolutionem impacti humoris moliri.

Evacuatio & revulsio perficitur, 1. Venæ sectione ampla & repetita, præsertim a vena jugulari, si debita quantitas hac via affluat. 2. Purgantibus lenissimis & clysmatibus. 3. Epispasticis circa collum applicatis.

Resolvuntur impacti humores, 1. Medicamentis nitrosis. 2. Gummi guajaco post debitas evacuationes exhibito, quod instar specifici in hoc morbo operatur. 3. Vapore calidæ aquæ cum pauxillo aceti faucibus per infundibulum applicatæ. 4. Gargarismus resolventibus & discutientibus. 5. Applicationibus externo collo discutientibus & relaxantibus. 6. Aere ad caliditatem vergente, & elevatione capitis in decubitu; evitatis animi pathematibus, loquela, & motu.

12. Ad præcavendam suffocationem optime

conducunt emetica, &, ni stranguletur æger, bronchotomia.

*Angina maligna.*

1. Angina maligna, vel morbus strangulatorius, vel pestilens faucium affectus, est affectio faucium stipata febre acuta & ulceribus hæc partes depascentibus. Ulcerum Ægyptiacorum, vel Syriacorum nomen sortitur ab Aræteo, qui exacte describit. Posthac, vel latente morbo, vel a medicis prætermisso, initio decimi septimi sæculi in Hispania, & Italia cum dirissimis symptomatibus sese manifestabat, medicorumque attentionem vindicabat. Maximas meretur laudes ob accuratam hujus morbi descriptionem Fothergill.

2. Sæpius & gravius hoc morbo tentantur tenelli quam adulti, puellæ quam pueri, infirmi quam vegeti, leucophlegmatici quam sanguinei. Sese monstrat præcipue autumno & initio veris, prægrediente calida tempestate.

3. Causa proxima hujus morbi est miasma quoddam sui generis corpori ab aere vel corporibus antea affectis communicatum. Frequens morbi ad astantes & totam familiam per spiritum vel saniem ore ejectam transmissio, morbum contagiosum demonstrat.

4. Virus corpori immiffum agit in totam humorum maffam, fed præcipue in fauces, & liquores a glandulis ibi fecretos, viribus nativis ad putredinem & acrimoniam difponentibus. Hoc plane elucefcit ex fymptomatibus, medela, & cadaverum diffectione.

5. Sefe monftrat frigore, dein calore urente & intenfo; vertigine; dolore capitis; immobilitate cervicis; molefta fenfatione in gutture; naufea, & vomitu; diarrhœa; oculis inflammatis & aquofis; facie tumida & rubore fuffufa; inquietudine; anxietate; lypothymia; mentis alienatione; pulfu celeri & plerumque debili, raro, valido & duro; fanguine florido, laxo & diffoluto, in initio nonnunquam inflammatorio; urina primo cruda & feroſa, poſtea quaſi bile tinâta; lingua humida, & muco sæpe obducta; deglutitione non valde læſa vel impedita; odore in faucibus ingrato; ſpiritu graveolente & putrido; uvula, tonſillis & pharynge tumefactis & florido colore nitentibus, inſequentibus poſtea maculis albis prope tonſillas ulcus fœtidum & fanie ſcatens tegentibus; narium internarum rubedine & exco-riatione; facie, cervice, pectore, & brachiis, uſque ad extremos digitos, tumefactis, colore coccineo nitentibus, & nonnunquam eryſipelatoſis; puſtulis hinc & illinc manus obſidentibus; glandularum parotidum tumore & dolore; cervicis œdemate; voce rauca &



strangulatoria ; hæmorrhagiis per uterum , anum , vel nares ; gangræna œsophagi usque ad ventriculum , & trachææ ad pulmones serpente. Morbus nocte adventante plerumque exacerbatur ; & mane , parvo oborto sudore , mitigatur.

6. Neque criticos dies , neque crifim regularem agnoscit angina maligna. Terminatur fauste vel infauste inter secundum & septimum diem. Morbo ad salutem tendente mitigatur calor , disparet cutis color , cuticula disquamatur , expectoratio augetur , pulsus tardescit , tumor cervicis subsidet , ulceraque fanescunt.

7. Vomitus & diarrhœa oriuntur a sanie caustica in ventriculum & intestina delapsa ; & , forsitan , levi harum partium sicut cutis inflammatione. Ab eadem putrida sanie odor graveolens. Tumor partium internarum & pustulæ a parte materiæ morbificæ ad has partes relegata. Hæmorrhagiæ a sanguine dissoluto & vasis sanie erosio.

8. Distinguitur angina maligna ab angina inflammatoria , vomitu & diarrhœa ; tumore erysipelatoso ; ulceribus gutturis fœtidis , & alba crusta occupatis ; voce rauca ; levi delirio cito superveniente ; nulla certa crisi , & symptomatum post evacuationes augmento. Hæc robustos , illa infantes & debiles frequentissime petit. Ab aphthis , quia illa so-

las fauces , hæ os quoque crusta albicante , occupant.

9. Fallacissima quam maxime est hujus morbi natura. Morbus semper periculosior in infantibus quam adultis , quia saniem expuere non valent , minusque auxiliis obediunt. Tumor erysipelaceus fausto plerumque omine apparet. Dum nitent oculi , spes adest ; quo tempore hoc deperit , in propinquo mors est. Quo magis urget debilitas & deliquium , eo gravior morbus ; quo minus , eo mitior. Ulcera alba optima , cinerea pejora , livida & nigra pessima sunt. Diarrhœa , rigor , pulsus debilis & parvus , corpus œdematosum vel cadaverosum , infausti ominis sunt. Exanthemata disparentia vel livida , sanguinis præcipue e naribus fluxus , mortem subesse testantur.

10 Ad hujus morbi medelam confert ,  
1. Ventriculum & glandulas faucium leni vomitorio evacuare. 2. Vires medicamentis cardiacis & leniter diaphoreticis , vino diætæque restaurante & antiseptico refocillare. 3. Sustinere tumorem externarum partium tepido lecti calore , quo optime prævenitur diarrhœa. 4. Medicamentis antisepticis , inter quæ eminet cortex Peruvianus , acidaque mineralia & vegetabilia , dummodo diarrhœam non excitant. 5. Emplastris epispasticis circa cervicem applicatis.

Venæ sectio , purgatio , & medicamenta antiphlogistica , experientia teste , plerumque nocent. Prodest nonnunquam venæ sectio

in corporibus plethoricis & adultis, præcipue si adsit laboriosa respiratio.

11. In initio morbi, convenit gargarizare partes affectas, medicamentis leniter repellentibus & resolventibus, qualis infusio rosarum rubr. cum aceto vel vino rubro astringente. Ulceribus albis magis arrident gargarismata ex detergentibus, qualia mel, tinctura mirrhæ, mel Egyptiacum, & aq. calcis. Repetita gargarizatione optime separatur crusta alba ulceri adhærescens, quæ nunquam impune avellitur; augetur enim inflammatio & dolor, insequiturque sæpe hæmorrhagia. Ad hæmorrhagiam astringentia & stiptica applicentur.

## S E C T. V.

*Tussis vel catarrhus, & tussis convulsiva.*

1. **T**USSIS est vehemens & convulsiva expulsio materiæ irritantis, in cavum pulmonum depluentis ex arterioliis vel glandulis, quæ membranam laryngis, asperæ arteriæ, bronchiorum, & vesicularum pulmonalium irrorant.

2. Distinguitur, 1. In originariam & symptomaticam. 2. In calidam & frigidam: cum priore conjunguntur febrilia symptomata, cum posteriore nulla. 3. In siccam, ubi nulla vel pauca; & humidam, ubi magna adest exscrea-



tio. 4. In tenuem & acrem catarrhum ; tenacem & inertem. Sedulo distinguendæ & seorsim describendæ sunt hæ duæ species , utpote diversæ , immo fere oppositæ. Prior strictos , posterior laxos adoritur.

3. Acer catarrhus excitatur a frigore subito corpori applicato ; ventis humidis & frigidis , Borea imprimis & Euro ; subitis tempestatum mutationibus ; regelatione ; aere aquosis particulis repleto ; vestitu humido ; pedum refrigerio ; alicujus partis , sed capitis pectorisque præcipue , denudatione ; prægressis morbis , videl. variolis , morbillis , &c. Particulis acribus contagiosis in aere natantibus. Crassum catarrhum inducit quodcunque nimiam feri copiam generat , uti laxa corporis pulmonumque compages , vita sedentaria ; aer nimis humidus & insularis ; studia nocturna ; & diæta nimis cruda , frigida , & aquosa.

4. Harum causa proxima est irritatio pulmonum a peregrina materia ; & motus totius fere corporis convulsivus , ad hujus expulsiõnem exinde excitatus : omnia enim irritantia , externæ pulmonum superficiei applicata , qualia corpora peregrina , aer particulis acribus repletus , tuberculæ pulmonum tussim excitant. Tussis vomitui merito assimilatur.

5. Catarrhus tenuis sese manifestat horripilatione , lassitudine , oculis lacrymas ef-

fundentibus & sæpe inflammatis, vultu rubicundo & inflato, dolorifica capitis gravitate, pectoris angustia & dolore, continua faucium titillatione, & sollicitudine ad tussim, præcipue vespertino tempore, nulla vel pauca aquosa exscreatione, pedum refrigerio, pleniore urinæ secretionē, pulsu citato & plerumque duro, narium pruritu, sternutatione, membranæ Sneiderianæ inflammatione & excoriatione, coryza, raucedine, respiratione difficili, hæmoptoe, phthisi pulmonali.

In catarrho tenaci respiratio laborat, pulmones muco spumoso scatent, tussis mane præcipue fatigat, & ejicit materiam viscidam, albicantem, vel subflavam, vel cæruleam, & in globulos mucosos adhærescentes sæpe convolutam. Huic superveniunt tubercula pulmonum, suppurationes, tabes, phthisis pulmonalis.

6. Omnia hæc symptomata facillime deducuntur ab acri tenuique, vel inertī & viscida materia vellicante pulmones. Patitur membrana Sneideriana, ob communicationem cum membrana pulmones intus vestienti. Omnes thoracis abdominisque partes externæ internæ in nifum convulsivum trahuntur, quia iisdem nervis, videl. pari octavo & intercostali, ac pulmones, donantur.

7. Tussis sicca plerumque mutatur in humidam; prior posteriore periculosior ob inflam-

mationes, vasorumque rupturas quæ comitantur : hinc melius est siccam in humidam, quam humidam in siccam transire ; quia posteriorem subsequuntur sæpe tubercula, febresque putridæ vel hecticæ. Tussis humida digestionem lædit, cachexiamque inducit. Debilibus pulmonibus utraque species incommoda.

8. Hæ diversæ species diversam & fere contrariam medelam poscunt. In catarrho tenui, 1. Pulmones deplendi venæ sectione, ductione alvi lenissima, mitissimisque diaphoreticis. 2. Acrimonia materiæ corrigenda, tenuitas inspissanda, & vasa pulmonea relaxanda oleis vegetabilium sine calore expressis; spermate ceti; decoctis mucilaginosi, vel syrupis ex herbis pectoralibus dictis, videl. tussilagine, althæa, sem. lini; leniter inspissantibus, videl. conf. rosar. rubrar. bals. locatell. & lacte asinino. 3. Motus convulsivi sedandi opiat, quæ vires egregie inspissantes quoque possident. 4. Diæta tenuissima, blanda, lactea, cutis bene tecta, quies in initio, & postea lenis motus requiruntur.

In catarrho crasso, 1. Materia avocanda alvi laxitate, empl. epispasticis, & fonticulis. 2. Attenuanda vomitu, epispasticis, & medicamentis incidentibus & detergentibus, videl. sapone, scillis, allio, gum. ammoniaco, acidis vegetabilibus. 3. Pulmones corroborandi suffitu exsiccante, equitatione continuata,



frictionibus validis , præcipue capitis , cum quibusdam calefacientibus , diætâ corroborante , & aquis chalybeatis. 4. Opiata , cerevisia , ova , pisces , præcipue saxatiles , nocent ob inspissantem suam naturam.

*Tussis convulsiva.*

9. Est atrocior & magis inveterata tussis species , quæ puerilis , convulsiva vel ferina appellatur. In hac specie continua fit per aliquot minuta ob tussim expiratio ; & inspiratio quando advenit perficitur sibilo , stertore , & clangore ob glottidis coarctationem. Parum e pulmonibus rejicitur. Ventriculus sæpe ad vomendum irritatur. Febris supervenit. Sequuntur exulcerationes , hæmoptoe , phthisis.

10. De sede hujus tussis magna inter practicos agitur lis. Quamplurimi e ventriculo oriri autumant , quia pectoralia relaxantia nocent , & stomachica amara prosunt : alii e pulmonibus ; nonnulli denique e pharynge & larynge. Prima sententia non firmis stabilitur argumentis ; quia oleosa obesse & amara prodesse pulmonibus æque ac ventriculo possunt ; neque per consensum affici videntur pulmones , quia tussi sæviante ventriculus sæpe non irritatur. Mihi videtur provenire a majore partium in catarrho communi affectarum irritatione , & majore totius corporis , imprimisque

imprimisque ventriculi, laxitate & irritabilitate.

11. Tusses convulsivæ raro periculosæ sunt; nonnunquam tamen suffocationem vel phthisim inducunt. Parum proficiunt medicamenta donec vires morbi exhauriantur.

12. In medela conducunt, 1. Venæ sectio copiosa. 2. Vomitus debitis intervallis repetitus. 3. Purgatio cum rheo & calomelano. 4. Pectoralia attenuantia. 5. Epispastica, ad humores acres e pulmonibus evocandos. 6. Specifica a multis decantata, videl. muscus pyxidatus, succus pulegii. 7. Relaxantia & inviscantia unguenta thoraci externe applicata. 8. Amara & roborantia postea assumpta, videl. cort. Peruv.

13. Semel mihi contigit videre tussim remittentem, quæ certa hora adveniebat, per horam unam vel alteram instar convulsivæ ægrum agitabat, & dein usque ad eandem horam noctis insequentis cessabat. Omnibus quotquot sunt pectoralibus incassum tentatis, cortice Peruviano, spatio viginti quatuor horarum, feliciter profligata fuit.

## S E C T. V I.

### *Peripneumonia.*

1. **E**ST inflammatio pulmonum cum febre acuta, respirandi difficultate,

tussi & pulsu molli. Medicis quam maxime convenit morbi hujus ideam habere distinctam, quia omnibus fere supervenit acutis ante mortem.

2. Distinguitur, 1. A magnitudine morbi, uno saltem, vel utrisque pulmonum lobis affectis. 2. A specie obstructionis, an sanguinea, vel pituitosa sit: prior peripneumonia vera, posterior notha appellatur. Est & alia quoque species sanguine dissoluto & cito putrescente conjuncta, quæ maligna dici debet. De hisce ordine agamus.

3. Peripneumonia inflammatoria corripit præcipue sanguineos; fibras strictas & densum sanguineum habentes; diætâ crassa & potu spirituofo utentes; nimis angusta thoracis conformatione præditos; pinguedinosos; asthmaticos, & senes; grassatur maxime hieme.

4. Causæ remotæ sunt cohibita perspiratio; valida exercitatio; aer frigidus, densus, gravis in pulmones admissus; ventus ab aquilone spirans; exhalationes acres vel astringentes in aere volitantes; potus spirituofo; aqua frigida corpori labefacto immissa; balnea nimis calida; pleuritis & angina; dolores spastici & colici; evacuationes suppressæ; exanthemata repulsa; ulcus antiquum consolidatum; variolæ vel morbilli.

5. Causa hujus morbi proxima est obstructio inflammatoria in finibus arteriæ pulmo-



nalis, aut bronchialis, aut utriusque simul. Hanc certissime declarant causæ remotæ, symptomata, & cadaverum inspectiones.

6. Incipit sensu frigoris, cui succedit calor; pulsus citatus, magnus, & mollis; respiratio laboriosa, celeris & calida; dolor gravativus sed non acutus; vultus & oculorum rubescentia; anxietas; inquietudo, & debilitas; sanguis emissus tenax, & crusta alba coopertus; nullus supra latus affectum decubitus; tussis sicca; vomitus; os & lingua sicca; dolor in humero; urina rubra & post secessum turbida; vigiliæ, & delirium. Tandem spiritus trahitur cum sibilo; pulsus formicat; visus obscuratur; mens alienatur; extremitates frigent; sudor in superioribus partibus obrumpitur, & æger moritur.

7. Terminatur hic morbus circa criticos dies sputo primo tenui, dein flavo & sanguine tincto; sudoribus largis; hæmorrhagia narium; alvo laxato; & urina sedimentum subrubrum deponente. Aliquando transfertur materia ad inferiores extremitates ubi phlegmona; erysipelas; tumores, & ulcera producit. Non accedentibus hisce salutaribus crisibus, infaustas per suppurationem, scirrhum, vel gangrænâ habet.

8. Pulsus in peripneumonia semper invenitur mollis; quia pulmo ex pulpofa & cellulari; non membranacea substantia, fabricatur; ideoque cum membranosis arteriarum

tunicis nullam habet sympathiam, neque in spasmodicas contractiones incitat. Respiratio frequens & laboriosa; quia, vesiculis sanguine congesto compressis, neque aerem satis copiose haurientibus, pulmones crebrioribus conatibus id compensare nituntur. Vesiculorum latera, a distentione vasorum, ad se mutuo affricantur: hinc tussis & strepitus. Denegato libero per pulmones transitu, sanguis stagnat in corde dextro & venis: hinc anxietas, rubor oculorum & faciei, delirium, vigiliæ, & phrenitis.

9. Distinguitur clarissime peripneumonia a pleuritide pulsu pleno & molli, respiratione calida, & dolore gravativo sed non acuto: ab asthma, valida febre quæ illam sequitur.

10. Peripneumonia nunquam periculo vacat a summa visceris necessitate. Si obstructio parva, vasa flexilia, & febris non nimis valida, tunc speranda est resolutio. Si magna adsit inflammatio; vasa valde rigida; sanguis, venæ sectione quamvis sæpius repetita, tenax semper profluit, & sternutamenta continua, in summo discrimine versatur æger. Strepitus pulmonum, & oculorum caligo mortem jam imminentem ostendunt. Utrumque pulmonum inflammatum cita mors pleuramque sequitur. A pleuritide peripneumonia, uti olim dixit Hippocrates, malum. Optime judicatur sputo albo, flavo, striis

sanguineis misto, & sine molimine prodeunte. Sanguis floridus, spumofus, lividus, porofus instar spongiæ, imminens prænunciat periculum.

Si materia intus absorpta per urinam, sedem, vel sudores ejicitur, faustus morbi eventus; si vero deponitur in hepar, lienem, vel cerebrum, infaustus expectandus est eventus. Haud meliore nota insignitur, quando diarrhœa sputum sistit, vel urina aquosa devenit. Si symptomata ad quartum diem sine mitigatione permaneant, tunc expectanda suppuratio, quæ in phthisim pulmonalem, vel empyema, morbos dubii eventus, degenerat. Si materies inflammatoria in scirrhum mutetur, morbus oritur incurabilis; si in gangrænam, mors præsto adest.

I. I. Indicatur in hoc morbo ut, 1. Sanguinis copia & impetus contra vasa pulmonalia obstructa minuatur. 2. Vasa laxentur. 3. Humores diluantur & attenuentur.

Sanguinis copia & impetus minuitur; 1. Larga & repetita venæ sectione. Quando vires ulteriorem venæ sectionem non admittunt, cucurbitulæ humeris applicatæ profunt. Sanguis post quartum vel quintum diem non detrahendus, nisi venæ sectionem nova deposcunt symptomata; quia suppurationem jam inceptam impedit. 2. Alvi repetita subductione emollientibus injectionibus. 3. Epis-



pasticis , post debitas evacuationes , applicatis.

Vasa laxantur , 1. Potu multo tepido relaxante. 2. Vaporibus tepidis emollientibus per inspirationem in pulmones attractis. 3. Clysmatibus emollientibus nitrosis. 4. Quiete & calore lecti. 5. Aere neque nimis calido neque frigido , sed temperato.

Humores attenuantur , 1. Potu multo diluente. 2. Nitro cum paucis camphoræ granis. 3. Diætâ forbili tenuissima & attenuante.

12. Ad sputum promovendum conducunt humidi vapores ore hausti , blanda oleosa cum syrupis pectoralibus mixta , decocta emollientia pectoralia , incidentia , & ante omnia epispastica repetita. Ad inhibendum sanguinis sinceri sputum sectio venæ Saphenæ , & medicamenta mucilaginosâ , leniterque astringentia.

De empyemate , & ulceribus vel scirrhum pulmonum , alibi tractandum est.

### *Peripneumonia maligna.*

1. Peripneumonia maligna priore longe periculosior est ; & scorbuticos nautasque post longam navigationem præcipue adoritur. Adest difficilis respiratio ; inquietudo ; summa debilitas ; animi ad minimum motum deliquium ; dolores per totum corpus ; pulsus

mollis & depressus; profusi sudores; resectio materiæ tenuis, saniosæ, sanguineæ, male olentis per sputum; urina ruberrima; sanguis dissolutus, lividus, sine crusta alba; eruptiones rubræ, vel lividæ petechiæ.

2. Profunt in hac specie acida vegetabilia vel mineralia; acetum camphoratum; vinum rubrum; diætâ nutrienda & acefcens; & opiata caute administrata ad defluxionem inspissandam. Nocent epispastica, & venæ sectio, nisi adfit pulsus firmus; præsertim si repetatur.

*Peripneumonia notha.*

1. Peripneumonia notha senes, phlegmaticos, debiles, laxos & obesos, tempestatibus præsertim pluviosis, petit. Oritur a sero & lymphâ nimis viscidis & glutinosis pulmones obstruentibus.

2. Adsunt frigus & calor alternatim; pulsus frequens, debilis, & tenuis; vomitus; anxietas; ponderis sensus in pectore; vertigo; capitis dolor; tussis; sanguis serosus; coarctatio pulmonum; urina pallida; calorque vix auctus.

3. Levatur venæ sectio, si vires admittant; cucurbitulis humeris applicatis; vomitu; epispasticis; purgantibus lenissimis, si nullum adfit sputum; & medicamentis attenuantibus, uti haustibus salinis, camphora,

aceto scillitico, gummi ammoniaco. Mucilaginosæ, oleosæ, & opiata vitanda sunt.

## SECT. VII.

### *Pleuritis.*

1. **E**st dolor lateris acutus cum acuta febre & respiratione læsa.

2. Distinguitur, 1. In diversas species secundum diversas pleuræ partes affectas 2. In veram, ubi sola pleura; & in spuriam, ubi muscoli intercostales afficiuntur. 3. In humidam, ubi adest sputatio; & siccam, ubi abest.

3. Pleuritis causas prædisponentes & remotas antea in peripneumonia descriptas, superadditis externis thoracis læsionibus, propriis agnoscit.

4. Omnes consentiunt autores, quod causa hujus morbi proxima est inflammatio pleuræ; sed magnopere dissentiunt de parte membranæ affecta. Nonnulli externam pulmonum tunicam, vel superficiem, pro sede pleuritidis habent. Veritatem inter cadaverum sectiones, ubi sola invenitur, sine præconcepta opinione scrutantibus patebit, quod pleuritis oritur sæpe a sola externa pulmonum superficie, sæpius a pleura costas cingente, sed sæpissime ab utrisque simul inflammatis. Vix enim aliter fieri potest, quin



pulmones sinceri, inflammato semel latere, in morbi societatem trahantur; quia eadem investiantur membrana, sæpe laterali adhærescant, & costis ob dolorem non satis elevatis, haud satis expanduntur, ideoque inflammantur. Pulmones a pleuritide affectos, testatur sputum a pulmonibus proveniens.

5. Pleuritis incipit rigore & horrore; quos sequitur calor; sitis; inquietudo; dolor in latere acutus, spungens, & ad spinam vel claviculas vergens; pulsus durus & instar chordæ ferratus; decubitus in latere affecto difficilis; tussis sicca dolores exacerbans; urina ruberrima; sanguis detractus valde adhærescens, crustaque tenaci obductus; dolor capitis; respiratio difficillima; rejectio materiæ tenuis, saniosæ, & sæpe sanguineæ post tertium diem; omniaque peripneumonix symptomata.

Inspecto cadavere, pleura solito crassior & inflammata, aliquando suppurata, nunquam sphacelata, invenitur. Eodem modo plectuntur pulmones.

6. Solvitur morbus circa criticos dies hæmorrhagia; sputo in initio tenui, sanioso & sanguineo, dein albo & crasso; sudore; alvo soluta; abscessibus; & urina sedimentum lateritium deponente. Si non resolvitur obstructio, terminatur suppuratione, scirrho vel sphacelo.

7. Dolor ad omoplatas & spinam vergit,

quia pleura hisce partibus appropinquat. Pulsus durus & ferratus provenit a spastica systematis arteriosi contractione, excitata per consensum inter arteriarum tunicam & pleuræ membranam a vehementi dolore. Decubitus in latere affecto vasa turgida comprimit, augetque inflammationem & dolorem. Reliqua symptomata ab adjuncta peripneumonia, facillime deducuntur.

8. Pleuritis distinguitur a peripneumonia, dolore acuto & pulsu duro; a doloribus thoracis, aere in intestinis incarcerato excitatis, febre, aliisque symptomatibus.

9. Respiratio facilis & excretio purulenta, alba, levis, & æqualis, morbi felicem eventum; sed respiratio difficilis, imminens suffocatio, urina multa, aquosa, & tussis sicca, elapso tertio die, infelicem eventum portant. Dolor & abscessus aurium morbum solvunt. Sputum subito cessans sine ullo urinæ sedimento, diarrhœa nimis frequens, strepitus pectoris a redundante sputo, & facies tristis, subitum exitium minitantur. Pleuritis recidivans plerumque lethalis. Si, dolore pectoris cessante, febris eadem permaneat cum pulsu debili & intermittente, sudoribusque, gangræna jam incepta est.

10. Indicatio curatoria est, 1. Momentum sanguinis contra vasa obstructa diminueret. 2. Vasa relaxare. 3. Humores diluere.

Momentum sanguinis diminuitur, 1. Subita,

larga, & sæpius repetita venæ sectione, quoad ægri vires ferre possint. 2. Cucurbitulis, ante summa incisa cute, supra locum dolentem applicatis. 3. Empl. epispast. peramplo supra partem affectam applicato, quod certe & cito dolorem levat.

Fibræ relaxantur, 1. Fomentationibus emollientibus, vel faccis herbis coctis repletis. 2. Medicamentis oleosis & potionibus mucilaginosi interne sumptis.

Sanguis diluetur, 1. Potu multo tepido diluente. 2. Diæta tenuissima forbili. 3. Nitro cum pauxillo camphoræ exhibitio.

11. Ad acutum lateris dolorem, urgente summa necessitate, anodyna, præmissis debitis evacuationibus, caute administranda sunt. Expecto ratio, uti in peripneumonia, pectoralibus promovenda est. Evacuationes tunc nocent.

12. Inflammatio mediastini, quod ex binis pleuris componitur, sese prodit dolore acuto inter sternum & spinam vel claviculas, respiratione frequen & celeri, cæterisque pleuritidis symptomatibus. Pleuritis dorsalis ab Hippocrate & Aræteo appellatur.

13. Si pericardium, quod ex pleuræ duplicatura componitur, inflammatione corripitur, dolor sentitur profundus; gravitas; anxietas; respiratio celerrima & frequens; sitis ingens; thoracis incendium; palpitatio cordis; pulsus durus & inæqualis, syncope.



## S E C T. VIII.

*Paraphrenitis.*

I. **A**RCTE cum prioribus connectitur paraphrenitis, quæ pro sua causa proxima agnoscit inflammationem diaphragmatis, vel pleuræ ubi diaphragmati connectitur. Dirus hicce & periculosus morbus stipatur acuta febre; dolore acuto inter costas spurias & imas vertebrae; respiratione celeri, convulsiva, & singultuosa; inquietudine & anxietate; tussi sicca; singultu; delirio; retractione hypochondrii sub costis; & immobilitate abdominis inter respirandum. Eodem modo terminatur, & iisdem cedit remediis, ac pleuritis.

## S E C T. IX.

*Phthisis pulmonalis.*

I. **P**HTHISIS pulmonalis est tabes corporis, cum febre hectica, tussi, & purulento sputo, ab ulcere pulmonum originem ducens.

2. Distinguitur, 1. In originariam & symptomaticam. 2. In phthisim cum abscessu, vel cum vomica. 3. In acutam & chronicam.

3. Huic morbo maxime obnoxia est ætas inter vigesimum & trigesimum annum; & forma quæ gaudet humeris alatis, collo longo

teneroque , thorace angusto planoque , statura procera , & molli muscutorum compage.

4. Causæ procatarcticæ sunt acris materia a pulmonibus separata tussimque excitans ; fumus arsenici vel carbonum ; aer humidus ; tubercula ; hæmoptoe ; evacuationes solitæ diminutæ , vel repressæ , uti menstrua , lochia , ulcera , pedum sudatio , hæmorrhagiæ narium , hæmorrhoides , scabies , &c. ; animi pathemata inordinata ; nimia cibi potusve ingurgitatio ; vita sedentaria ; corpora extranea in pulmones delapsa ; vulnera ; morbi diversi , uti scorbutus , scrophula , affectio hysterica , lues , asthma , febres continuæ , remittentes , pleuriticæ , peripneumonice , scarlatinæ , variolosæ , morbillosæ ; contagium ; dispositio hæreditaria.

5. Causa proxima est ulceratio pulmonum. Hoc testantur causæ remotæ & cadaverum inspectiones.

6. Oritur obstructio sæpissime in glandulis per pulmonis substantiam disseminatis , vel arteriis bronchialibus : aliquando etiam in minutissimis arteriæ pulmonalis vasculis.

7. Recte separatur hic morbus in duo diversa stadia , inflammationis & suppurationis.

8. Incipit tussi sicca ; voce clangosa ; calore aucto ; dolore ; thoracis oppressione , præcipue post motum ; sanguinis spumantis & rutili rejectione ; sapore salso in ore ; ap-

petitu prostrato ; siti ; cibi nuper assumpti vomitu ; tristitia ; gravitate in lobo affecto ; pulsu celeri , molli , parvo , nonnunquam pleno & duriusculo. Stadium primum inflammatorium.

Postea pus exspuitur viride , album , sanguineum , inodorum vel graveolens. Corpus extenuatur , & tempore æstivo alget ; febre depascitur , quæ vespere advenit , & mane sudoribus colliquativis diffatur ; diarrhœa , lienteria , dysenteria , vel diabete , vexatur ; calore , præsertim in volis manuum , uritur ; lingua parvis ulceribus scatet : post pastum genæ livescunt ; ungues curvantur , extenuatis digitis ; capilli decidunt ; pedes tumescunt , præcordia fursum convelluntur ; bronchiorum partes abrasæ tussiendo rejiciuntur ; languent omnes functiones ; corpus arefcit ; oculique subsidunt , & intra cavitates sese recondunt. Tandem deglutitionis læsio , ulceris exsiccatio , frigus corporis & virium defectio , ægrum meliora facta expectantem subito conficiunt. Stadium suppuratorium. In vomica omnia hæc accidunt , puris sputu excepto.

9. A vasis pulmonum obstructis & inflammatis oritur tussis sicca , calor , dolor , febris , cæteraque stadii primi symptomata. A vasis & fluidis suppuratis puris sputum. A pure acri putridoque in venas absorpto humores colliquantur , putrescunt , febriles paroxysmos



excitant, e corpore per cutem, intestina vel renes eliminantur, ad nutritionem inepti redduntur, & in lateralia vasa hydropicos tumores excitantes cedunt. Sanguis rutilus & dissolutus, ad caput post pastum inflatione ventriculi determinatus, in vasa haud antea permeabilia intrat, & ruborem excitat. Tandem ob humorum defectum & putredinem moritur, non sine vana convalescentiæ spe a lenitate morbi apparente & quotidiana symptomatum mitigatione.

10. Stadium primum hujus morbi a catarrho dignoscitur, quia hunc defluxio, illam tussis arida, & pondus alterius lobi pulmonum in decubitu comitatur. Febris putrida remittens, puris rejectio, tabes, sudores nocturni, & diarrhœa colliquativa, stadium secundum ab aliis morbis abunde distinguunt.

11. Prognosim faustam efficiunt morbus adhuc recens, pus album, æquale, facileque rejectum, nulla vel saltem parva febris, respiratio libera, tussis mitis, appetitus haud prostratus, thorax satis capax, alvi laxitas, juvenus, cæteraque symptomata lenissima; desperatam, morbus hæreditarius, tussis ferina, calor hecticus matutino tempore, somnus haud vires refocillans, antecedentes morbi febriles, tabescentia magna, suffocatio, diarrhœa, sudor colliquativus, pedumque tumores. Acuta periculosior chronica; originaria symptomatica. Autumnus tabidis nocet.

12. Stadium primum curatur, 1. Inflammationem minuendo venæ sectione parca propriis intervallis subinde repetita. 2. Vesicatoriis dorso & lateribus frequenter applicatis. 3. Tenuēs & acres humores inviscando oleosis & incrassantibus medicamentis. 4. Vomitu, si a catarrho frigido ortum duxit. 5. Causas morbi específicas, sive ab hæmorrhagia, scorbuto, scrophulo, asthmate, hypochondriaca aut hysterica affectione, vel evacuationibus suppressis, pendent, medicamentis victuque hisce morbis dicatis tollendo.

Tubercula cruda deobstruentibus lenissimis summa cum cautela adorienda.

Stadium secundum levatur, 1. Abstergentibus, incrassantibus, & agglutinantibus. 2. Pus educendo per vias naturæ consentaneas, scilicet per tracheam si vomica sit, per fonticulas vel ulcera, per intestina, vel per renes, natura semper viam præmonstrante. 3. Puris effectus in sanguinem impediendo antisepticis non stimulantibus, incrassantibus, & acidis ex vegetabili vel minerali regno desumptis, diarrhœa haud prohibente. 4. Corpus nutriendo & corroborando diætâ eupeptâ refocillante, lacte præcipue asinino, exercitio moderato, præsertim equitatione, aere sicco, calido, & non nimis tenui, somno protracto; evitatis venere, animique pathematibus & curis.

13. Ad dysenteriam conveniunt rheum & astringentia;

astringentia; ad tussim & insomnium, pectoralia & opiata; ad sudores nocturnos, corroborantia, stragulaeque paucae; ad nauseam & vomitum, acida. Alia evacuatio promovenda, dummodo alii vires exhaurienti obstemus.

14. Cura praeservatoria nititur venae sectione quater in anno celebrata, diata regulari, immunitate a catarrho, aeris nocturni evitacione, & exercitio.

15. Quare Anglia caeteris nationibus magis obnoxia sit huic morbo?

## S E C T. X.

### *Tabes aliae purulentae.*

1. **E** Mpyema est collectio puris inter pulmones & pleuram; cognoscitur febre hectica, respiratione difficili, tussi, spuru, materiae fluctuatione, gravitate & molestiae sensu a situ corporis mutato, caeterisque inflammationis praegressae & suppurationis signis.

Tabes a vomica hepatis patet dolore usque ad humerum porrecto, tumore & dolore ad tactum in loco affecto, nausea, vomitu, diarrhoea.

2. Tabes ab abscessu ventriculi sese monstrat foetidis eructationibus, tussi sine expectoratione, vomitu purulentae materiae, deli-



quio, sudoribus, dolore vel tempore deglutitionis, vel postquam perficitur: intestinorum, a situ & separatione puris per fedem; omenti vel mesenterii, tensione, gravitate, dolore, in hoc profundiore quam in illo: renum, sensu ponderis in parte affecta, decubitu in ventrem, urina purulenta & dysuria: uteri, a dolore lumborum & excretionem puris e vagina.

3. Hæ tabes curantur ulcerum abstertione & agglutinatione, naturæ in suis conatibus opitulatione, sanguinis contra puris effectus munitione, & , quando fieri potest, eductione per aperturam arte factam.

## SECT. XI.

### *Inflammatio ventriculi.*

1. **H**Anc excitant potio frigida, liquores fermentati, venena corrosiva, acria emetica, vel purgantia; retropulsio variolarum, purpureæ, podagræ; humores biliosi; corpora dura deglutita.

2. Cognoscitur dolore acuto in præcordiis; calore interno ventriculi; pulsu subduro, contracto, & frequenti; summa anxietate; vomitu continuo dolorifico; siti magna; vigiliis; inquietudine; corporis jactatione; extremorum refrigeratione; spiratione difficili; summo dolore a ructu, & post

assumpta præcipue acria medicamenta; lypothymia. Inspectio cadaverum ventriculorum sphacelatum ostendit.

3. Funestum denunciat eventum irrequiescentia corporis jactatio, potus ingestus rursus ejectus, singultus, animus deficiens, pulsus intermittens, mens emota, artuumque convulsiones.

4. Curatur venæ sectione, quoad vires ferre possunt; cucurbitulis supra locum dolentem applicatis; fotibus & cataplasmatibus externe applicatis; clysmatibus emollientibus sæpius repetitis; & nitro cum pauxillo camphoræ interne sumpto.

## S E C T. XII.

### *Dysenteria, diarrhœa & lenteria.*

1. **D**ysenteria est alvi fluxus cum perpetua adfellandi cupiditate, vehementibus torminibus, & plerumque sanguinis dejectione.

2. Distinguitur: 1. In sporadicam & epidemicam. 2. In mitem & malignam: posteriorem notant summa virium jactura, exanthemata, &c. 3. In rubram & albam; in illa feces sanguine, in hac pure & sanie tinctæ sunt.

3. Dysenteria præcipue corripiuntur, qui antea hoc morbo laboraverunt, vel ventricu-

li et intestinorum debilitate plectuntur; qui biliosis primarum viarum sordibus infestantur; qui prava diæta, fructibus immaturis, & liquoribus fermentescentibus usi fuerunt; & qui frigido humidoque nocturno aeri, solis fervorem antea perpeffi, expositi sunt. Hinc morbus vere castrensis. Dysenteria epidemica omnes indiscriminatum adoritur. Sævit præcipue æstate & autumnò quando calidam tempestatem & meridianum solem subsequuntur humidæ frigidæque noctes.

4. An causa proxima est acris & caustica materia putridæ naturæ? Huic fidem faciunt hæc argumenta: Apparet tempestatibus putredini maxime accomodatis, & varia insecta progignentibus; scorbuticos præcipue adoritur; a vaporibus sanguinis putrescentis concitatur; partes præcipue affectas emollit & corrumpit; aerem in magna copia gignit; & fæces summe putridas reddit.

5. Contagio propagatur dysenteria, quia excitatur ab odore fœcum dysentericorum, ab alvi in eadem sella exoneratione, & a lacte nutricum hoc morbo laborantium. Hinc sævit inter nutrices, quæ agris in nosocomiis, præcipue castrensibus, ancillantur.

6. Sedes dysentericæ variat in variis morbi stadiis. In morbi initio afficiuntur præcipue ventriculus & intestina tenuia, uti conspicuum a nausea, vomitu, cardialgia, &c. Postea omnis morbi vis exercetur in intesti-



na creffa, & fpeciatim in rectum, uti teftantur dolor, tenefmus, & falutares clyfmatum effectus.

7. Conqueruntur per aliquot dies de appetitu protrato, ventris tumore, corporis laffitudine & horripilatione. Infequitur pulfus citatus; fitis; calor vehemens & acris; inquietudo; naufea & vomitus; cardialgia; anxietates præcordiorum; atrociffima imi ventris tormina; quæ fequitur frequens fed non copiofa alvi dejectio, fæces fanguineæ, faniofæ, mucosæ, fpumefcentes, pelliculis & filamentis sæpe mixtæ; borborygmi & flatus; continua defidendi cupiditas, quæ tenefmus appellatur; ftranguria; ani proci-dentia; virium prostratio fuma; ardor interiorum, frigefcentibus extremitatibus; fingultus; fudor frigidus. Quando ad extrema ventum eft, dolor femel ceffat, fæces involuntarie elabuntur & egregie foetent; fitis perit, pulfus fit debilis, & mors æ-grum; meliora expectantem fata, fubito tollit.

Seçtio cadaverum in confpectum adducit inteftina, præcipue colon & rectum, præternaturaliter craffa, aere diftenta, inflammata, exulcerata, & gangrænofa; tunicam villofam abrafam; bilem poraceam, vifcidam, & nigri coloris; fanguinemque nigerrimum.

8. Nullam certam crifim, neque certas

periodos habet. Finitur plerumque inter septimum & decimum quartum diem.

9. Particulæ acres dysentericæ, in cavum intestinorum delapsæ, motum peristalticum accelerant; hinc crebriores, sed minus copiosæ, dejectiones. Sua acrimonia spasmos & inflammationes excitant; unde tormina, tenesmus, sanguis; flatus & borborygmi a fermentatione putredinosa aerem generante; imbecillitas & extremitatum frigus a sævis intestinorum doloribus & tanto humorum dispendio; subita doloris evanescencia, a gangræna incepta.

10. Dysenteria distinguitur a diarrhœa torminibus severioribus, & sanguine sæpissime sed non semper excreto; a cholera morbo, rariori vomitu, & fecibus ejectis.

11. Semper incerti ominis est hic morbus. Si invadit scorbuticos, tabidos, pueros, senes, intestina debilia habentes, sed præcipue gravidas, periculosus est. Mali etiam morbi testimonia sunt vomitus frequentes & singultus. Sudores æqualiter per totum corpus diffusi, & urina sedimentum largum deponens profunt. Convulsiones, fecum graveolentia, carunculæ vel pelliculæ ab intestinis abrasæ, ani strictura ut nullus pateat clymatibus aditus, summum minitantur periculum. Actum est, quando, pulsu celeri ac debili existente, extremitates frigent, dolor subito disparet, fauces inflam-

matoria vel paralytica fiunt, & mens alienatur. Inducit sæpe lienteriam, hydropem, & tabem.

12. Ut curetur dysenteria, 1. Expellenda est materia peccans, vel ad alia loca derivanda. 2. Demulcenda est ejus acrimonia: &, 3. Motus intestinorum effreni, a materia morbifica excitati, consopienti.

Ad expulsionem vel derivationem materiae ad loca magis secura, conveniunt, 1. Venæ sectio, plethora & inflammatione mensuranda. In dysenteria maligna semel vel ad summum bis venam secare sat est. 2. Rad. ipecacuan. ad ventriculum exonerandum; vel pariori dosi, videl. ad grana quinque, sexta quaque hora exhibita, optimos præstat effectus hoc modo assumpta; sed pauci nauseam continuam perferre volunt. 3. Rheum unoquoque die dosi solita majore. 4. Vitrum antimonii ceratum, additis opio & theriaca, ad mitigandos ejus effectus effrenos, & materiam morbificam ab intestinis ad cutem determinandam.

Acrimonia materiae demulcetur, 1. Potu mucoso & incrassante, uti decocto oryzæ, vel pulli. 2. Clysmatibus emollientibus ex herbis mucilaginosi, amylo, oleo, &c. 3. Acidis, in dysenteria maligna, summa cum cautela, ne intestina nimis irritent, exhibitis. 4. Thea florum chamæmeli, quæ putredini optime resistit.



Motus effreni confopiantur, 1. Opio, post debitas primarum viarum evacuationes, certis intervallis, & forma liquida potius quam solida propinato. 2. Sub finem morbi adstringentibus, uti vino rubro, extracto ligni Campechensis, &c. 3. In convalescentia, ad restituendam fibrarum intestinalium firmitatem, prodest aq. calcis, cortex Peruvianus cum amaris, & equitatio, qua nulla res magis intestina confirmat.

Paulatim firmari intestina debent, ne adstringentibus fortioribus admotis, vitium contrarium per immodicas inflationes oriatur. In hoc morbo quoque necessarium est, non quotieslibet, decidere, sed quoties necesse est; ut hæc ipsa mora in consuetudinem ferendi oneris intestina deducat.

13. Ad dolorem ventris, juscula emollientia, sperma ceti, fomentationes & epispastica loco affecto applicata. Ad tenesmum, clysmata oleosa, & folia tussilaginis ad anum detergendum. Ad ulcera interna, balsamum locatelli sursum & deorsum exhibitum.

14. In constitutionibus aeris epidemicis effugiat sanus consortium cum ægris, & præcipue cloacam vel fellam ubi alvum exonerant; pluviam, aerem humidum, vel nocturnum, & cutem bene tectam custodiat.

15. Quando alvi profluvium adest cum parva vel nulla febre, nulla sanguinis rejectione, nullisque gravioribus torminibus tunc

diarrhœa appellatur. Iisdem remediis, sed multo facilius quam dysenteria, cedit. Si parciore dejectiones, appetitus adhuc illæsus sint, diarrhœa sæpe pro valetudine est, neque cohiberi debet.

26. Lienteria est alvi fluxus, in quo alimenta incocta & parum immutata redduntur. Quando excernitur chylosa materia, cæliaca appellatur. Medicamentis stomachicis amaris, roborantibus, & equitatione, curatur.

### S E C T. XIII.

#### *Colicus dolor.*

1. **E**ST acutus intestinorum dolor cum alvo constipata.

2. Distinguitur, 1. In colicam flatulentam, & spasmodicam. 2. In originariam & symptomaticam. 3. In acutam & chronicam. 4. In febrilem & non febrilem.

3. Causæ remotæ sunt pituita vitrea; cibi exsuccii, fæces aridæ, vel concretiones lapideæ viam intestinalem obstruentes; bilis acris magna copia secreta; collectio sanguinis in vasis intestinorum; lac acefcens: vermes; retentio lochiorum; frigus, vel venter fasciis non ligatus in puerperiis; indoles scorbutica, vel arthritica; fumi saturnini, vel aqua mineram plumbi lavans; venena;

diarrhœa, vel dysenteria astringentibus nimis cito suppressa; calculi per ureterem, vel ductum cholidochum transeuntes; intestinorum tumores, vel glandularum mesenterii abscessus.

4. A spastica intestinorum contractione oritur hic morbus. Elucescit a symptomatibus, cadaverum inspectione, & experimentis in vivis animalibus institutis.

5. Stipatur parva febre; dolore acuto abdomen quasi terebrante; difficili respiratione; cardialgia; nausea, vel vomitu materiæ biliosæ, vel pituitosæ, alvo fortiter constipata; rugitu; appetitu & concoctione læsis; siti; urina biliosa & sæpe obstructa; hernia umbilicali; tensione & inflatione abdominis; singultu; syncope; delirio; convulsionibus; intestinorum disruptione, vel sphacelo.

6. Terminatur paralyfi, ileo, profusis sudoribus, hæmorrhagia narium, hæmorrhoidali fluxu, diarrhœa, macularum scorbuticarum irruptionibus, arthriti.

7. Diagnofis inter colicum & nephriticum dolorem oritur a diversitate loci affecti, exacerbatione prioris & non posterioris post passum, majore alvi constipatione, & urina saturatioris coloris in priore quam in posteriore.

8. Prognofis est prosperior si dolor remittit, neque uno loco infigitur; e contrario



periculosa, si in una parte sine remissione sævit, præcipue accedente pervigilio, singultu, delirio, syncope, sudoribus frigidis. Colica inflammatoria vel epidemica pessima est.

9. Medela requirit, 1. Relaxationem spasmorum. 2. Evacuationem materiæ irritantis.

Relaxatio fit, 1. Venæ sectione, si adsit inflammatio. 2. Clysmatibus emollientibus. 3. Fomentationibus & cataplasmatibus calidis toti ventri impositis; semicupio; cucurbitulis sine ferro ventri admotis; compressione abdominis. 4. Opiatis post materiæ irritantis ejectionem.

Materia irritans evacuatur diversis modis secundum ejus naturam: bilis acris, purgantibus; flatus, medicamentis spiritum digerentibus; particulæ scorbuticæ vel arthriticæ, diaphoresi; feces induratae, laxantibus; & venena, medicamentis oleosis. Diæta parca, tenuis, & lubricans convenit.

10. Recidivam impediunt equitatio, animus serenus, cibus haud flatulentus, & ventresque a frigore & humiditate muniti.

11. Est species hujus morbis quæ colica hysterica vocatur. Stipatur acuto dolore in regione ventriculi, vomitu materiæ biliosæ, pulsu celeri debili, difficili respiratione, dejectione summa, & aliquando delirio. Toleratur opiatum.

## S E C T. XIV.

*Cholera morbus.*

1. **E**st ejection materiae biliosae superne & inferne.

2. Causae remotae sunt alimenta facillime in rancidam vel acidam naturam abeuntia, uti caro fuilla, pinguedo, alimenta oleo vel butyro frixa, dulcia, cucumeres, melones, uva, cerasi, &c. medicamenta purgantia acriora; venena; ira vehemens; bilis acris.

3. Causa proxima est convulsiva contractio intestinorum tenuium, praecipue duodeni, ab irritatione proveniens.

4. Praecedit nidorosa eructatio; cardialgia; morsus, dolorque ventriculi & intestinorum. Tunc aeger corripitur ejectione ex alvo & ventriculo materiae biliosae viridis, flavae, nigrae; distentione abdominis; pulsu celeri, debili & inaequali; brachiorum artuumque contractione; dolore acuto supra umbilicum; retentione urinæ; frigidis sudoribus; singultu; palpitatione; convulsionibus.

5. Prognosis fausta, si, cessante vomitu, sequitur somnus, vel morbus transgreditur septimum diem; infaustra, si aeger debilis, vel annosus materia acerrima vel foetens, aut vomitus cesset, durantibus caeteris symp-

Sect. 15. FEBRILIBUS 157  
tomatibus. Neque tamen ulli morbo minori momento succurritur.

6. Curatur, 1. Diluendo & expellendo humores acres potu multo aquæ tepidæ, vel jusculi tenuioris, & clysmatibus oleosis. 2. Motus convulsivos postea compescendo antispasmodicis, opiatis, & unguentis nervinis externe applicatis. 3. Vino, cum discussa cruditas est, vires restituendo. 4. Tonum ventriculi & intestinorum restaurando medicamentis roborantibus, diæta exsiccante, exercitio.

## SECT. XV.

*Iliaca passio, ileus, seu volvulus.*

1. **E**ST dolor acutus, inflammatio, & obstructio intestinorum tenuium, ita ut, alvo fortiter obstipata, cibus vel stercus, vel utraque, per os redduntur.

2. Distinguitur, 1. In originariam et symptomaticam. 2. In veram et notham.

3. Causæ remotæ sunt hernia inguinalis; irritatio vel erosio a vermibus, medicamentis stimulantibus, venenis vel acri bili; nimis longa fæcum retentio; ingesta exsucca vel acerba, uti panis ficcus, nuces, castanæ, ossa, fructus immaturi, acerbi; intus susceptio unius partis intestini intra aliam; tumores & scirrhi intestinorum partiumque vicinarum; recti coalescentia.



4. *Causa proxima est inversus intestinorum motus peristalticus ab obturatione viscerum originem ducens; hoc patet a symptomatibus & corporum inspectione.*

5. *Post alvi suppressionem æger corripitur acuto dolore & distentione prope umbilicum; retentione obstinata fecum & status; eructationibus; nausea; vomitu primo materiæ biliosæ vel pituitosæ, dein stercorosæ, postremo clysmatum injectorum; respirationis difficultate; urinæ obstructione; imbecillitate; pulsu citato & contracto; siti. Tandem, cessante dolore, lypothymia, singultus, delirium, convulsiones, mors.*

6. *Prognosis incerta in tam acuto morbo. Minus periculi a dolore vago, vomitu per intervalla recurrente, & laxantibus clysmatibus per anum ejectis; majus ab inflammatione acuta & fecibus male olentibus vel nigris ad os ascendentibus. Debilitas summa, foetidus spiritus, pulsus debilis, delirium, convulsio, mortem instantem denunciat. Juventus symptomata tam sæva quam senectus non habet.*

7. *Inflammatio minuenda est, 1. Repetita venæ sectione, præcipue in talo; cucurbitulis abdomini, & hirudinibus venis hæmorrhoidalibus applicatis. 2. Emollientibus & oleosis ptisanis; clysmatibus, & fomentationibus externis. 3. Medicamentis antiphlogisticis, videl. sal nitri cum camphora. 4. Vo-*

mitûs & doloris diminutione, per antiemetica & opiata, parca manu assumpta.

Obstructio canalis intestinalis aperienda ;  
 1. Purgantibus lenissimis, & si hæc nihil proficiunt, acrioribus. 2. Suppositoriis vel clysmatibus ex irritantibus medicamentis, vel fumo tabaci. 3. Crudo mercurio ad plurimas uncias assumpto. 4. Attentione sedula ad causas remotas particulares, sive herniam, sive tumorem, sive corpora dura.

Post alia incassum tentata, aqua frigida subito in pedes, crura, femora, & abdomen nuda ingesta, alvum sæpe feliciter solvit, ægrumque ex orci faucibus servavit; multa enim in præcipiti periculo recte fiunt, alias omittenda.

Diæta tenuissima haud inflans, quies, pathematum & frigoris evitatio, & ægrotanti & convalescenti conveniunt. Postea quoque vitare oportet cruditates, frigus, jactationem, ambulationem, cæterosque corporis motus; nam facile, nisi bene jam confirmatis intestinis, id malum redire consuevit.

## S E C T. X V I.

### *Hepatitis.*

1. **M**Orbus, qui ab hepate inflammato provenit, hepatitis appellatur.
2. Præter causas remotas, quæ omnibus

febris communes sunt, has peculiare habet videl. omenti ingentem obefitatem; succussiones ab emeticis nimis violentas; hepatis scirrhum; subitum frigus ab aere vel frigidis potionibus, jecori antea calefacto applicatum; sanguinem tenacissimum, atrabilarium ab antiquis appellatum.

3. Distinguitur, 1. In genuinam & spuriam; in priore afficitur hepatis substantia; in posteriore, peritonæum vestiens hepar vel costas spurias. 2. Secundum partem hepatis affectam, scil. concavam & infirmam, vel convexam & superiorem: hæ duæ species diversæ diversa habent symptomata.

4. Obstructionem in finibus arteriæ hepaticæ vel venæ portarum pro sua causa proxima agnoscit.

5. Inflammatio concavæ partis hepatis hisce stipatur symptomatibus; dolore obtuso, gravativo, & fixo in dextro hypochondrio; ardore; anxietate circa præcordia; pulsu primis diebus fere naturaliter ordinato, neque sequentibus magnopere concitato; inflatione & tensione dextri hypochondrii; cibi fastidio; nausea & vomitu; siti magna; lingua scabra & nigra; cardialgia, facie pallidi, citrini vel icterici coloris; singultu molestissimo.

Inflammationem convexæ partis comitatur dolor magis acutus in respirando, & ad jugulum vel humerum extendens; pulsus citata-



tatior; tussis sicca; molestus in sinistro latere decubitus; singultus; vomitus, & magna debilitas.

6. Morbus terminatur quarto, septimo, vel undecimo die per alvi solutionem; urinam vel sudores; vel postea suppuratur, vel in scirrhum mutatur.

7. Dolor tantum obtusus gravativus, & pulsus parum a naturali alienus, in inflammatione concavæ partis hepatis, hujus visceris insensibilitati debentur. Anxietas, vomitus, cardialgia a nervorum consensu, & irritatione vasorum ventriculi, sanguine repletorum, ob obstaculum ad venæ portarum extremitates natum. Color ictericus ab impedita bilis secretionē & excretionē. Singultus ab affectis per consensum nervis diaphragmatis, quod cum hepate connectitur.

Sed convexæ partis inflammatio severiora producit symptomata; quia hepatis superior pars diaphragmati adhæret, quod acutiore sensatione præditum est. Humerus ramos ex eodem nervorum pari sortitur, ergo per consensum afficitur. Æger difficillime in sinistro latere cubat, quia in tali situ ligamenta inflammata & tensa magis tenduntur.

8. Dignoscitur a pleuritide lenitate doloris, situ intra costas spurias, pulsu non duro, & difficili in sinistro latere decubitu; ab hysteriis & hypochondriacis symptomatibus, febre comitante.

9. Si recte tractetur, raro periculosus est morbus. Eventum funestum prædicunt singultus perpetuus, febris valida, sitis inextinguibilis, subitus extremorum pallor & frigiditas, urente corpore. Suppuratio hepatis, ni tumor extrorsum vertitur, sæpissime ægrum e medio tollit. Per longam vitam sine magno incommodo perfertur scirrhus, si debitum adhibeatur vitæ regimen, & tumor medicamentis aperientibus non irritetur; hisce enim in cancrum sæpe degenerat.

10. Ad morbi medelam confert, 1. Venæ sectio copiosa, non obstantibus arteriis fere naturaliter ordinatis: si postponatur hæc operatio, donec pulsus indicat, nimis tarde advenit. 2. Alvum laxantia. 3. Clysmata attenuantia & antiphlogistica, quæ absorpta venis meseraicis recte ad hepar deferuntur. 4. Fomentationes & cataplasmata discutientia hypochondrio externe applicata. 5. Medicamenta attenuantia & antiphlogistica interne sumpta. 6. Emplastra epipastica supra locum dolentem applicata.

11. Frigus, omnia frigida, labor, vehemens motus, ira, trepidatio, pondus, jactus, in hoc morbo inimica sunt.

## S E C T. X V I I.

*Nephritis.*

1. **N**Ephritis est inflammatio renum cum ardore & dolore lumborum, difficile mictu.

2. Causæ remotæ sunt vulnera & contusiones renum; calculi; cibi flatum in cologenantes; quodcunque sanguinem ad renes determinat; uti diuretica calida; concussio in rheda, vel equitatio; plethora; evacuationes suppressæ; spasmodicæ renum contractiones.

3. Causa proxima est arteriolarum renalium obstructio, uti patet cadaverum inspectione.

4. Adfunt calor, dolor, & nonnunquam rubor in regione renum; stupor cruris ejusdem lateris; febris; urina primo pallida, dein rubra; difficilis mictio; dolorosus incessus, vel erectio corporis; facilior in latus infirmum, quam in sanum, decubitus; frigus extremitatum; nausea & vomitus; anxietas & spirandi difficultas; suppuratio vel gangræna partis.

5. A tumefacti renis compressione oritur rubedo cutis & stupor cruris; a compressis tubulis uriniferis, palliditas & diminutio urinæ; a partibus tensis & inflammatis, dolo-



rosa corporis erectio ; a communicatione nervorum , vomitus & anxietas.

6. Colicus dolor distinguitur a nephritide , quia ille magis ad anteriora situs est , & difficultas urinæ tarde per consensum , si unquam , advenit.

7. Morbus periculosus , præcipue si , deficiente urina , supervenit delirium. Urina limpida pejor saturata. Hæmorrhoides supervenientes morbum solvunt. Pus , per vias urinæ secretum , optatissimum efficit suppurationis statum ; per sedem , pejorem ; si in abdomen depluit , pessimum.

8. Obstructa vasa aperienda venæ sectione ; sanguisugis ano applicatis ; clysmatibus emollientibus sæpe injectis ; fomentationibus loco affecto applicatis ; potu multo diluente ; diaphoreticis lenissimis , & diætâ tenui.

9. Si renes ulcerantur , profunt balsamica , vulneraria , & aquæ chalybeatæ ; evitatis acribus , acidis falsis , & molli decubitu supra dorsum.

## SECT. XVIII.

### *Stranguria.*

1. **S**Tranguria est excretio urinæ guttatim facta , cum continuo ad mingendum stimulo. Quando urina omnino supprimitur , ischuria appellatur.

2. Distinguitur in acutam, quæ ab inflammatione provenit; & chronicam, quæ nulla inflammatione stipatur.

3. Causæ remotæ sunt cantharides interne sumptæ, vel externe applicatæ; scorbutica fluidorum diathesis; acre pus ad vesicam delatum a rene, aliisve visceribus ulceratis; expositio podicis ad aerem frigidum, præcipue operantibus catharticis; inflammatio urethræ ab ulceribus venereis, vel injectionibus acribus; inflammatio intestini recti; hæmorrhoidalis fluxus suppressio.

4. Causa proxima acuta est inflammatio sphincteris vesicæ, vel muci eum defendentis abrasio, uti docent causæ remotæ cadaverumque inspectiones.

5. In stranguria guttatim prodit urina cum dolore, & continuo ad vesicam exonerandam nisu: post parvam excretionem stimulus recedit, iterumque paulo post revertitur. Febris accenditur; cutis calet; abdomen tumet; perinæum & penis rigescunt; alvus obstipatur; oritur sæpe tenesmus; dolor in dorso & anteriore abdominis parte sentitur; anxietas præcordiorum & vomitus aliquando adsunt. Recidivus sæpissime est hic morbus.

6. Diagnos. calculi vesicæ a stranguria innititur immunitati prioris plerumque a febre, dolori in glande penis, mucosæ urinæ & catheteri.

7. Morbus haud periculosus est. Judicatur resolutione, suppuratione, & gangræna, quarum posterior rarissime accedit.

8. Inflammatio minuenda & acrimonia urinæ inviscanda. Perficiuntur venæ sectione; alvi subductione miti; clysmatibus emollientibus; fomentationibus & vapore partibus affectis applicatis; potu mucilaginoso, & calore. Equitatio, frigus, aciditas, & vinum rubrum evitari debent.

9. Excretionem urinæ impedire quoque possunt paralyfis vesicæ; hæmorrhoidum tumor; feces induratæ; calculus vesicæ; caruncula urethræ; tumores prostaticarum, hysterica passio; ulcera; scirrhi & cancri vesicæ; graviditas. Hæ causæ suis remediis tolli debent.

10. Quando stranguriam comitatur calor urinæ, dysuria appellatur. Excitatur vel ab urina acri, vel inflammatione urethræ, & curatur iisdem, ac stranguria, remediis.



## P A R S Q U A R T A.

*De morbis qui primo in toto corpore, dein in parte sunt.*

## S E C T. I.

*De hisce morbis in genere.*

I. **P**ECULIAREM merentur considerationem morbi febriles, qui primo totis humoribus inhærent, dein postea magna ex parte relegantur ad partes præcipue exteriores. Inter quos eminent febres eruptivæ dictæ, quales miliæ, scarlatinæ, erysipelas, variolæ & morbilli. Multæ præterea sunt quæ neque certis insigniuntur nominibus, neque fideli adhuc innotescunt descriptione. Hæ maxime vernis temporibus oriuntur.

2. Hæc secretio ad partes exteriores, utpote naturalis & salutaris, arte leniter promovenda, & secundum salutiferum naturæ ductum dirigenda est. Hinc medici est, horum morborum symptomata & medelam, a præcedentibus plane diversam, bene perspecta habere.

## S E C T. I I.

*Arthritis.*

1. **A**Rthritis est dolor circa juncturas ossium, præcipue pedis, vere & autumno maxime revertens.

2. Distinctio, 1. In hæreditariam & acquisitam. 2. In podagram, chiragram, gonagram, &c. secundum partes affectas. 3. In regularem & irregularem.

3. Sexum virilem, ab *ακμῇ* declinantem; raro fœminas, nisi viragines, vel tempus menstruale prætergressas, aut pueros, aut castratos; ingenia peracuta, cupidosque literarum vitam sedentariam agentes, & in feram noctem vigilantes, tentat.

4. Victus lautus, plenus, opiparus: pocula nimia nocturna, præcipue acida vel austera: exercitia solita omissa: habitus corporis luxurians, humidus, laxus: venus immodica in juventute: a liquoribus destillatis ad tenues nimis cita transitio: evacuationes suppressæ; labes hæreditaria. Hæ sunt causæ remotæ.

5. Paroxysmum accelerant pedum præcipue sudantium subita frigori expositio, vel a calceis compressio; purgatio alvi nimia; defatigatio; animi pathemata; aer humidus, & a ponderoso ad levem subitæ mutationes; lucubratio; perspiratio suppressa; ci-

bus dyspeptus; pergræcatio; causæque remota antedictæ.

6. An causa proxima humorum viscositas & acrimonia peculiaris a perspirabili materia, ob cutis vitium, gradatim retenta? Ita videtur; quia senes, sedentarios, & ganeæ deditos, maxime infestat; quia hieme, non æstate, sese monstrat; quia paroxysmus a suscepto frigore acceleratur; quia rheumatismi affinis est; quia densum & inflammatum sanguinis flatum, aliaque febrilia symptomata sibi associat; & quia crisis & medela per perspirationem auctam perficitur. Hæc causa sociam sibi adungere videtur imbecillitatem primarum viarum, imprimis ventriculi.

7. Sedes est in minimis vasis tendinum, ligamentorum, membranarum, periostei, articulorum, quæ longius a corde distant, & maxime comprimuntur; ergo in pede.

8. Paroxysmum prægrediuntur lassitudo; torpor; spirituum dejectio; apepsia; nausea; ructus; corpus flatu distentum; alvus constipata; pedum sudor cessans; varices.

Ingruit paroxysmus cum dolore sæviante, plerumque in pollice pedis; sensatione quasi aquæ frigidæ affusæ; horrore; febre ejusque symptomatibus. Dolor augmentatur ossa tarfi metatarfique occupans; vel lancinans est, vel mordens, vel pungens, vel urens, vel coarctans, vel gravativus. Elapsa nycthe-



vera, pars rubescit, tumescit; cutis parvo dolore humectatur; tunc dolor diminuitur & febris cessat. Mane semper se melius habet, vespere pejus, paroxysmulo tunc adveniente. Mens irritabilis. Urina primis diebus colorata, sedimentum lateritium vel arenosum deponit. Appetitus prostratus, alvus astricta & sensatio partis dolorifica totum comitatur paroxysmum. Eo citius vel tardius solvitur paroxysmus, quo fortior vel debilior natura. Tunc temporis inter digitos pedis pruritus intolerabilis sentitur & cutis desquamatur: Articulorum quasi fricatio & ariditas: Intermissio.

Morbo, progressu temporis, altius radices agente, manus, carpus, cubitus, genua, aliaque loca corripuntur. Tophi gignuntur, articuli que distorti motu privantur. Disruptis ligamentis, tota ibi perit sensatio. Nunc per totum fere annum protrahuntur paroxysmi. Urina multa, pellucida, sine sedimento. Infestatur hæmorrhoidibus; putridis eructationibus; appetitu deleto; spasmis; calculo.

Viribus prostratis, materia podagrica nunc in caput detonat, unde apoplexia, lethargus, paralyfis, delirium, sopor, tremores, & convulsiones universales; nunc in pulmones, unde asthma, tussis, suffocatio; nunc in pleuram, unde pleuritis; nunc in ventriculum & intestina, unde anxietas, nausea, vomitus, diarrhœa. Hisce sævientibus, nullus in

parte dolor; & vice versa. Deficiente natura, prægravantur viscera vitalia, & moritur.

9. A systemate vasculoso materia viscida onerato, lassitudo, &c. A ventriculo debilitato, aepsia, &c. A motu humorum in pedibus languido, sudor ibi interruptus, varices. Ab eadem causa & vasis nimis contractis, ibi sistitur materia podagrica dolorem excitans. A materia viscida acri, febris. A diversa ejus in parte affecta situatione, diversæ sensationes. Translatio materiæ, morbiicæ in pedem est crisis febris. A madore, vasorumque externorum inflammatione, interna liberantium, doloris remissio. Ab impedita perspiratione & sanguine magis acri, vesperi paroxysmus. Mens irritabilis, ab irritatione generis nervosi. Solvitur paroxysmus, ob materiam subactam. Materia per poros sibi viam faciente, cutis prurit & desquamatur. Tenuioribus diffilatis, pars remanet terrestrior, tophosque producit. A metastasi materiæ podagricæ in viscera vitalia, symptomata sæva, & mors.

10. Diagnofis patet. Si prægressis nonnullis podagræ symptomatibus, vel solito paroxysmi tempore, æger morbo febrili laborat, ab hoc fonte oriri probabile est.

11. Qualis ingruit febris, talis erit paroxysmus. Quo magis dolet pars, eo brevior paroxysmus, longiorque intermissio; & vice versa: securitatem quoque pollicitur acutus

dolor ; proprium enim est naturæ instrumentum ad materiam podagræ ejiciendam. Partibus nobilioribus multa levat mala , ideoque plerisque magno est usui. Juvenes facilius curantur quam senes. In hæreditariis & tophaceis medela non expectanda.

12. Totius medelæ cardo versatur in curatione morbi, paroxysmi, & symptomatum.

Morbus curatur in intermissione, 1. Vires concoctrices roborando. 2. Nullum fomitem administrando.

Vires concoctrices roborantur, 1. Medicamentis corroborantibus, uti stomachicis amaris, aromaticis, antiscorbuticis, cortice Peruviano; chalybe vel aquis chalybeatis, præcipue thermis Bathoniensibus. 2. Exercitio leni quotidiano in aere salubri, præcipue equitatione. 3. Frictionibus. 4. Mature lectum petendo; animi tranquillitate; nulla venere, & cutem mundam ex panno læneo bene tectam custodiendo.

Fomitis subministratio impeditur, 1. Diæta rite ordinata modo, genere, et tempore. 2. Potu neque calefaciente, neque debilitante: vino non nisi vinosis vel debilibus concessio. 3. Tinct. rh. amar. bis in septimana repetita, qua crassior victûs pars subducetur; flore sulphuris.

Hisce regulis diu obtemperare debet æger, causis remotis, quæ morbum produ-



xerunt, evitatis. Si hæ nihil proficiunt, certissime profligatur diæta lactea.

Paroxysmus curatur naturæ opitulando,  
1. In separatione; dein, 2. In expulsi-  
one materiæ morbificæ.

Separatio adjuvatur, 1. Si initio nimium fervet sanguis, ob juventutem vel immodicam potationem, venæ sectione cauta. 2. Si nimium torpet, cardiacis. 3. Calore. 4. Potu diluente.

Expulsio perficitur, 1. Diaphoreticis mane adhibitis. 2. Exercitio. 3. Frictione. 4. Inusionibus cum lino; verberatione cum urtica; cantharidibus applicatis.

13. Quoad symptomata, 1. Si vehementer excruciat dolor & vires ægri exhaurit, cataplasmata emollientia, & urgente summa necessitate, opiata interne vel externe parce administranda; motum enim articuli labefaciunt. 2. Si caput vel pulmones occupat materia podagrica, expellitur phlebotomia; empl. epispast. talis, & fomentationum partibus dolore assuetis applicatione; purgantibus stomachicis. 3. Si ventriculus vel intestina, cardiacis fortioribus, exercitio, decoctionibus aromaticis sudorem in lecto morientibus. 4. Diarrhœa non critica, eodem modo curatur. 5. Dolores nephritici, decoctionibus, clysmatibusque emollientibus & thermis calidis.

14. Quare curatu tam difficilis? An ullum

specificum adhuc notum, quod podagram radicatus extirpare valet; vel an ulla spes restat tale inveniendi? An in perspiratione cuticulari promovenda tota res agitur? Quare ætas tenera immunis?

### S E C T. III.

#### *Rheumatismus.*

1. **R**heumatismus, huic morbo vicinus, est dolor transiens, erraticus in musculis vel articulis.

2. Distinguitur, 1. In febrilem & non febrilem. 2. In universalem & localem.

3. Vere & autumno maxime grassatur.

4. Causæ remotæ sunt, corpus calens frigori subito expositum: ventorum mutationes: sanguinis nimia effusio vel hypocatharsis: plethora ab evacuationibus suppressis: crapulæ, pocula, & venus immodica: morbus sanguinem vitians, uti intermittens, scorbutus, lues venerea.

5. An causa proxima est, serum viscidum acre, vasa serosa & lymphatica musculorum, sed præcipue membranarum & ligamentorum, obstruens? Causæ remotæ, conspectus feri, & distillatio urinæ rheumaticæ, huic fidem faciunt.

6. Febrilis symptomata sunt, lassitudo, rigor, extremitatum gravitas & frigus, pul-

sus celer & strictus, sitis, inquietudo, venter constipatus. Die uno vel altero elapso, dolor acutus, ad motum auctus, sedem sæpe mutans, articulos præcipue occupat, cum tumore & inflammatione. Sanguis pleuriticus. Caput aliquando vel præcordia occupat. Febre cessante, remanent dolores. Tubercula & anchyloses in articulis sæpe formantur.

Non febrilis symptomata sunt, dolores vagi & rigiditas in partibus musculosis, vel ligamentis, plerumque sine tumore: doloribus retrocedentibus oritur anxietas; & vice versa.

7. A vitio fero oritur febris: A vasis distractis, dolor, tumor, inflammatio. Materiæ separatione, cessat febris.

8. Crisis perficitur, vel per sudores, vel urinam, vel hæmorrhagiam, vel cutis efflorescentias.

9. Diagnos inter rheumatismum non febrilem & arthritidem, quamquam difficilis, attamen consideranti progressum symptomatum patebit.

10. Spes bona dummodo in externis partibus hærent dolores; incerta, si occupant internas. Rheumatismus frequens morbos chronicos inducit; vel in affinem podagram mutatur.

11. Rheumatismus febrilis curatur, 1. Venæ sectione larga & sæpe repetita. 2. Diluen-



tibus & attenuantibus. 3. Clysmatibus. 4. Medicamentis sudorem post depletionem promoventibus, donec febris & dolores cessarint. 5. Victu tenuissimo; calore lecti temperato; quiete.

Rheumatismus non febrilis curatur, 1. Demulcentibus, aperientibus, diaphoreticis. 2. Unguentis calefacientibus & penetrantibus, vel epispasticis parti applicatis. 3. Frictione. 4. Cucurbitula cum scarificatione. 5. Ustione cauteriis. 6. Thermis arte præparatis, vel naturalibus, quales sunt Buxtonienses.

12. Ad tumores, cataplasmata emollientia, evitatis repellentibus: ad dolores sævos, opium: ad partium rigidatem, thermæ conveniunt.

13. Est species rheumatismi, a loco affecto, ischias appellata. Oritur a febre, cubatione terrena, omnibusque antedictis causis. Hæret in ligamentis acetabuli. Advenit torpore, impedito motu, formicatione, nonnunquam vehemente febre. Per totum crus ad pedes sæpe descendit dolor. Pars debilitatur, abbreviatur, claudicat. Curatur uti rheumatismus chronicus.

14. Est & alia species quæ lumbago rheumatica appellatur. Sævissimus hæret in lumbis dolor, descendens ad articulum femoris, vel ad os sacrum, vel transverso itinere per latera ad vesicam. Causa est ligamentorum vertebraliū inflammatio. Curatur ve-

næ sectione & medicamentis topicis, videl. unguentis calidissimis penetrantibus, vel empl. epispasticis. Hunc morbum epidemice grassantem semel vidi.

15. An differentia inter rheumatismum & arthritidem consistat in ipsa causa, vel loco affecto solummodo, vel ambobus? An causa diversarum specierum rheumatismi eadem sit? Quare rheumatismus facilius quam arthritidis curatur?

## S E C T. I V.

### *Febris purpurata vel miliaris.*

1. **F**ebbris purpurata vel miliaris nomen tenet a pustulis rubris vel albis, seminis milii speciem præ se ferentibus. Antiquis medicis plane incognita fuit: ducentis abhinc annis Lipsiæ primo sese monstravit.

2. Distinguitur, 1. In rubram & albam; in priore pustulæ rubræ, in posteriore albæ sunt. 2. In idiopathicam & symptomaticam; sæpe enim conjungitur cum variolis, morbillis, & diversis febribus.

3. Adoritur laxos habitus; temperamenta phlegmatica; infantes & senes sæpius quam adultos; scæminas sæpius quam viros, & inter illas nobiliores, delicatas, fluore albo affectas, & sæpissime puerperas; quia hu-

mores in harum vasis uterinis stagnant & corrumpuntur, & multum sudant.

4. Causæ remotæ sunt animi pathemata relaxantia, qualia mœror & sollicitudo; magnæ evacuationes; vigiliæ; meditatio; vita otiosa; aer vapidus; æstas pluviosa, diæta nimis aquosa ex vegetabilibus, & dulcibus; aqua impura; alvus astricta; sudores nimis protracti.

5. An causa proxima est nimia copia, lentescencia, & acrimonia tenuium humorum vasa subcutanea oppilantium? Hanc opinionem confirmant causæ prædisponentes & remotæ, medela, & cadaverum sectio.

6. Hisce symptomatibus stipatur febris miliaris. Præcedit frigus & horror: Sequitur calor non admodum intensus; virium defectio; spirituum depressio; pulsus frequens & debilis; respiratio oppressa & suspiriosa; insomnium; leve delirium; lingua alba; urina naturalis vel pallida; alvus astricta vel laxa; tremor manuum; remissio & exacerbatio febris, vigiliæ; spirituum commotio; æstus in volis manuum; in puerperis lochiorum & lactis suppressio. Insueta punctio sub cute sentitur. Huic succedit cutis asperitas, & innumerae pustulæ albæ vel rubræ, milii semen referentes, quæ sensim implentur ichore fœtido. Tunc mitigantur symptomata; pulsus plenior & mollior fit; animo redit vigor; cutis madescit; sudor fœtidus erumpit; uri-



na devenit colorata; evacuationes suppressæ redeunt; & pustulæ, post decursum plerumque septem dierum, arescunt & desquamantur cum molesto pruritu.

7. A tenuiorum humorum nimia copia & acrimonia facillime deducenda sunt hæc symptomata.

8. Distinguitur a morbillis crebro & celeri pustularum retrocessione, pruritu molesto, odore fœtido, & ortu ab humoribus intus corruptis, & non a contagione, vel epidemica aeris constitutione.

9. Purpura rubra mitior est albâ. Respiratio facilis, pustulæ leni diaphoresi sese ostendentes, remittente tunc febre, vel pulsu molliori & ampliori, & multo sero plena, signa bona; sed corpus impurum, respiratio laboriosa, magna spirituum dejectio, sanguis dissolutus, stillæ sanguinis e naribus, eruptio pustularum tertio vel quarto die & sine levamine, mala. Si pustulæ omnino retrocedunt cum exacerbatione symptomatum, anxietate, dolore, convulsionibus, apoplexia, vel signis inflammationis internæ, actum est de ægro. In puerperis diarrhœa timenda est, quia lochiorum fluxum impedit.

10. Morbus ejusque curatio dividuntur in statum febrilem & statum eruptionis. In statu febrili indicatio est, febrem in debito moderamine retinere. Huic intentioni conducunt vesicantia unum post alterum appli-

cata per totum morbi decursum , potus ex aqua pulli , animus tranquillus , calor lecti , & situs horizontalis. Venæ sectio raro , nisi urgente aliquo symptomate vel pulsu duriusculo , prodest ; sæpe nocet.

In statu eruptionis , conducunt ad materiam morbificam gradatim expellendam , fustus ad artus adhibiti , & lenissima diaphoretica , evitatis sudorificis & calefacientibus , frigoreque externo.

Si in longum trahatur morbus , si pus tenue & saniosum , si pulsus debilis , si morbus remissiones & exacerbationes habet , cort. Peruvianus administrandus est.

In morbi declinatione , si pustulæ exiguæ , neque materiam morbificam continere valeant , tunc per intestina laxantibus leniter educenda est materia superflua.

11. Ad retrocessum pustularum , cucurbitulæ cum scarificatione , & hirudines venis temporalibus , si pulsus durus ; fustus ; vesicatoria ; potus calidiuscula & subacida ; calor lecti ; mens hilaris , & redeunte madore , mitia diaphoretica.

12. In morbo complicato cum puerperio vel aliis febribus , curationis ratio pendet ex prudenti utriusque consideratione , eo itur quo symptomata magis urgent.

13. Prophylaxis nititur aere puro ; sicco , & calidiori ; cute bene perspirabili ; alvo aperto ; victu subacido ; attenuantibus , & exercitio.

## S E C T. V.

*Febris scarlatina.*

**P**Ræcedenti perfimilis est febris a colore scarlatina dicta; ubi maculæ amplæ rubræ supra cutem non elevatæ, hinc inde apparent, cum calore, ariditate, sensibilitate, pruritu cutis, & febre acuta. Elapsis tribus vel quatuor vel quinque diebus, maculæ disparent & cutis desquamatur. Curatur venæ sectione, laxantibus, & potionibus diluentibus.

## S E C T. V I.

*Erysipelas.*

1. **E**Rysipelas, vel ignis sacer, vel rosa, vel ignis sancti Antonii, est inflammatio in summa cute & pinguedine, late serpens, cum dolore, calore, & rubore.

2. Distinguitur, 1. In erysipelas cum pustulis & sine pustulis. 2. In ulceratum vel non ulceratum. 3. In idiopathicum & symptomaticum. 4. Secundum partes affectas.

3. Ad hunc morbum dispositi sunt plethorici; sanguinei; juvenes; fœminæ gravidæ; scorbutici; cacochymici; a parentibus huic obnoxiiis progeniti; & hoc malum



semel passi. Ab anno trigesimo ad quadragimum præcipue infestat.

4. Causæ remotæ sunt animi affectus violenti, ira imprimis & terror; subitum refrigerium corporis a calore solis antea calefacti; liquores fermentati; potiones; & balnea nimis calida; evacuationes naturales vel artificiales suppressæ vel omissæ; aer humidus & pluviosus; perspiratio quocumque modo impedita.

5. An causæ proximæ sunt acres & causticæ particulæ, non a corrupta bile, uti vulgo putatur, sed ab humoribus, qui secerni debent, retentis & corrumpentibus, provenientes? Hanc opinionem confirmant causæ prædisponentes & remotæ, symptomataque.

6. Sedes hujus morbi primaria est cutis & subjacens pinguedo, uti docet cadaverum inspectio.

7. Invadit erysipelas horrore; insequente febrili calore; siti; inquietudine; pulsu frequenti; sanguine plerumque crusta cooperto; virium prostratione; dorsi capitisque dolore; vomitu; delirio; anxietate; corporis jactatione; comate; vigiliis. Secundo, tertio, vel quarto die, cutis intumescit cum dolore & rubore, & tumor superintegitur denso pustularum agmine, quæ in vesiculas, tenuem humorem continentes, elevantur, febre interim recedente. Serpit tumor. Infestat sæpe extremitates, abdomen, mammas & glan-

dulas axillares ; sed sæpissime faciem , ubi oculi clauduntur , nares & fauces siccescunt , & sopor conjungitur. Si morbus terminatur resolutione , tumor sensim subfidit , ardor & dolor evanescunt , color roseus in flavum mutatur , & cuticula in squamas fatiscens secedit. Si in suppurationem abeat , ulcera mali moris , vix sanabilia , producuntur.

8. Hæc symptomata facillime deduci possunt a tenui & acerrimo humore.

9. Tumor erysipelatis depressus , late sese diffundens , & albicans post compressionem , satis distinguitur a phlegmone , ubi inflammatio profundior & color post tactum non recedit. A peste discrepat , quamvis in multis persimili , erysipelas , quia neque contagio oritur , neque contagiosum est , neque tanto stipatur periculo.

10. In levioribus hujus morbi speciebus non magnum adest periculum , sed , si gravior inflammatio corpus cacochymicum corripit cum perpetuo comate vel delirio , in angusto spes est. Erysipelas retrocedens vel retropulsum , deliria , inflammationes internas , asthma , spasmos & gangrænam inducit. Si tumor livescat , gangræna prope adest. Quo crassius & albidius pus , eo minus ; quo tenuius & pallidius , eo majus periculum.

11. Indicatio curativa postulat febris mitigationem , ut promoveatur separatio humorum morbosorum a sanis ; exclusionem tota-

lēm materiæ morbificæ , & quo minus serpat , ejus expulsionem e corpore.

Febris mitigatur venæ sectione pulsu æstima-  
mandā. Exclusio perficitur potionibus diluen-  
tibus , demulcentibus , & medicamentis dia-  
phoreticis. Expulsio materiæ , quando caput  
occupat , vel longius in vicinas partes ser-  
pit , optime perficitur lenissimis laxantibus ,  
& emplastris epispasticis in vicinio applicatis.

Convenit diæta infirmissimæ materiæ , evi-  
tatis , ni pulsus deficiat , medicamentis in-  
ternis calefacientibus.

12. Farina sænugræci vel tritici supra par-  
tem inspersa , & calor lecti tepidus est opti-  
ma applicatio externa ; nocent enim om-  
nia repellentia , aquosa , & oleosa. Si adsint  
gangrænæ signa , fomentationes spirituosæ ,  
cataplasmata ex medicamentis calorem exci-  
tantibus , & cortex Peruvianus conducunt.  
Vinum in hoc morbi statu non alienum est.

13. Est erysipelatis certa species quæ ,  
quia corpus circiter umbilicum instar cingu-  
li cingit , zona , vel zoster appellatur. Stipa-  
tur diversis tumoribus , obsitis pustulis uren-  
tibus , valde dolentibus , hinc inde sese mon-  
strantibus. Curatur uti prior morbus.

14. Est & alia species a Sydenhamo des-  
cripta , quam ipse , durante constitutione va-  
riolosa , quoque vidi. Superveniebat febri ,  
tertio vel quarto die , eruptio pustularum  
erysipellacearum , quæ humorem flavescensem



continebant, febrem mitigabant ; & post quatuor dies disparebant. Facillime venæ sectioni & purgantibus cessit.

## S E C T. VII.

*Variolæ.*

1. **V**ariolæ in Ægypto & interioribus Arabie locis se primo manifestabant , initio septimi sæculi. Abhinc , cum armis Saracenorum pari passu progredientes , per Hispaniam , dein per totam Europam , vagatæ sunt. Eximias in hoc morbo laudes meruit Sydenhamus.

2. Verno tempore ingrediuntur , æstivo præcipue grassantur , autumnali cedunt , brumali vix apparent. Tenella ætas maxime huic morbo obnoxia. Rarissime secunda vice variolas patitur quisquam.

3. Semina variolarum non a parentibus ad prolem derivantur , aliter haud in nostro orbe tamdiu latuissent ; sed a plagis orientalibus advecta , uti cæterorum epidemicorum , in atmosphaera volitant.

4. Miasmata variolosa videntur esse admodum subtilia , inflammantia , stimulantia.

5. Oritur morbus , 1. Immediate ab aere externo materia variolosa repleto. 2. Contagione ab infecto. 3. Infectione.

6. Introitum morbo præbent vasa cutis & pulmonum absorbentia , membrana oris nasique interna , viæque alimenti.

7. Variolæ distiguuntur primo in discretas, confluentes, cohærentes. 2. In communes, crySTALLINAS, filiquosas, verrucosas, sanguineas.

8. Morbus admodum regularis, & se dividit in quatuor stadia, febris primariæ, eruptionis, suppurationis, febris secundariæ.

9. Advenit horripilatione; tremoribus; animi deliquiis; doloribus totius corporis, sed præcipue occipitis, faucium, dorsique; siti; calore; inquietudine; pulsu celeri, duro; nausea, vomitu; oculorum scintillatione; somnolentia. Acute dolet orificium superius ventriculi, ut & aliquando latus. Primis diebus sudoribus adulti, insultibus epilepticis infantes obnoxii. Sanguis, paucis elapsis horis, pleuriticus. Duos, tres, vel quatuor dies durat stadium febrile.

In confluentibus, secundo vel tertio; in discretis, tertio, quarto vel quinto plerumque die, oriuntur puncta parva, rubra, morbus pulicum æmulantia; conspiciuntur primo in facie, paucis horis postea in pectore & brachiis, postero, vel tertio die, in extremitatibus inferioribus. Inflammantur, elevantur, dolent, calent. Si discretæ sunt, eruptione procedente, cedit plerumque febris; si confluentes, mitigatur. Sexto circiter die, finita irruptione, in confluentibus, cohærentibus & sæpe in discretis, os scatet tenui saliva, quæ gradatim ad veram salivationem

augetur. Diarrhœa infantibus salivationis vicem præstat. Fauces inflammantur, tument, dolent. Septimo plerumque die palpebræ turgescunt, materia serosa, & sequente, oculos obvolvunt. Eodem tempore tumescere incipit facies, pustularumque interstitia rubescere, dolescere. Octavo die, ad suppurationem tendunt pustulæ: tunc stadium irruptionis finitur.

Pustulæ suam magnitudinem adeptæ, asperæ evadunt, albescunt, & pure replentur, primo in facie, dein eodem ordine in cæteris corporis partibus, quo ortæ fuerunt; sputum spissius evadit, & copia augetur; magis dolent fauces; urina sæpe sanguinolenta, nunc pure turgent pustulæ; cutis quasi igne comburitur, & vix præ molestia cubitus somnuset. Decimum circiter diem terminatur stadium tertium suppurationis.

Hi tumores purulenti in facie primo arefcere, & flavescere incipiunt. Febris accenditur major in confluentibus quam discretis, cum pulsu pleno; duro; siti; anxietate; sanguine pleuritico. Gradatim detumescit facies, sputusque viscidus diminuitur. Eodem tempore manus brachiaque inflantur, vel inflari debent, usque ad diem decimum tertium quando tumor faciei & salivatio omnino cessant. In extremitatibus pustulæ suos sacculos rumpunt. Ingravescente febre, in confluentibus præsertim, horrenda adveniunt



symptomata, uti delirium, coma, inflammatio pulmonum cæterorumque viscerum. Defluxio viscida, tumor faucium, nasusque infartus, minitant strangulationem. Mutationes multas fallaces patitur æger. Tandem ab undecimo ad decimum septimum, vel perit, vi morbi oppressus, vel a febre, visu recuperato, convalescit. Cutis nunc crustis aridis infestatur, postea decedentibus, vestigiaque alte impressa relinquentibus.

10. Crisis febris secundariæ perficitur, vel sede, vel urina multa crassa.

11. Post morbum finitum, sequuntur oculorum inflammationes, ulcera foeda, abscessus, juncturarum tumores, phthisis, tabes, aliaque similia.

12. A miasmate varioloso, cum sanguine misto, oritur stadium febrile: Ab eadem materia, in cutem ejecta, febris cessio. A pustulis internè irrumpentibus, dolent fauces. Salivatio est nîsus naturæ ad reliquias materiei variolosæ expellendas: eodem tendit faciei & palpebrarum tumor. Interstitiorum dolor, a tensione. A retenta perspiratione, pure multo, & particulis variolosis, iterum in sanguinem resorptis, febris secundaria, ejusque varia symptomata. In extremitatibus pus remorâ acredinem concipit, cutemque exedit.

13. Diagnôsis probabilis redditur in primo stadio, si epidemicæ regnant variolæ, si in-

ferior occipitis pars, fauces, lumbi, sed præcipue os superius ventriculi dolent. Ab erysipelate, symptomatibus distinguitur. Aliquando febris eruptiva, variolas æmulans, eodem tempore grassatur; sed non eadem stadia percurrit; ergo facile distinguitur. Morbo elapso, ob regularem symptomatum successionem, nulla restat difficultas.

14. Variolæ eo benigniores, quo tardius; eo periculosiores, quo citius in hieme adveniunt. In tenera ætate, mitior morbus; in magis firma & provecta, vehementior.

Cæteris paribus, quo diuturnius stadium primum, eo mitiores variolæ; quo brevius, eo peiores expectandæ. Si in latere; vel ore ventriculi hæret dolor acutus, malo proficiscuntur omine.

Quo pustulæ magis confluentes, quo numerosiores in facie & corporis trunco, quo magis depressæ, quo febris minor remissio in secundo stadio, eo majus periculum; & vice versa. Delirium, eruptionem subsequens, haud leviter nos terrere debet. Defectus salivationis, in depressis & confluentibus, signum pessimum. Quo magis interstitia rubent, uti rosæ damascenæ, eo melior spes; quo magis pallent, eo pejor.

Si pus album, viscidum, sacculosque optime distendit, indicium faustum: Si e contrario fuscum & tenue, pustulæque flavescunt, vel apices indentatos habent, indicium infaus-

tum. Si livent interstitia, vel ipsæ pustulæ, mors inflat.

Si febris secundaria apparet, ante pustularum retrocessum, omen malum. Si, facie detumente, ptyalismoque desinente, non turgescunt eadem proportionem manus & brachia mortiferum in confluentibus signum est. Si præ nimio calore, stragula sustinere non potest æger, adest delirium. Magna faucium inflammatio, spiritus creber, urina multa pellucida cum nubeculis suspensis, stridor dentium, floccorum lectio, mortem intentant. Haud fidendum est delirio remittenti, si eadem durat febris.

15. Modus curationis in primo stadio est, ut febris in justo moderamine conservetur, ad materiam variolosam seponendam. Perficitur, 1. Venæ sectione impulsu, viribus, antea acta vita, symptomatibus, mensuranda. 2. Vomitu. 3. Alvi leni solutione. 4. Sanguinem, potu multo acidulo, diluendo. 5. Calore moderato. 6. Extremitates, immediate ante eruptionem, fomentationibus emollientibus relaxando, ut minor ad partes nobiliores, major ad ignobiliores materiæ variolossæ fluxus fiat. Ad acutum in orificio ventriculi dolorem, fomentationes continue applicentur. Ad sudores compescendos, lecto abstineat æger, vel leviter ibi tegatur.

In secundo stadio scopus est, naturæ materiam variolosam ad cutem eliminanti, sup-



petias ferre. Si deficit natura ob nimiam debilitatem; quam indicat pulsus imbecillis & languidus, adjuvatur, 1. Cardiacis. Si ob nimiam vasorum repletionem & sanguinis visciditatem, quæ cognoscitur duritie, viribusque pulsus, adjuvatur, 2. Sanguinis missione. 3. Attenuantibus. Si medium iter tenet, tota res sibi permittenda.

In tertio stadio iisdem, ac in priore, methodis pustulæ sustinendæ, & suppuratio promovenda. In his duobus stadiis conveniunt, 1. Diæta tenuissima, refrigerans. 2. Potus multus acidulus. 3. Frigoris evitatio. 4. Ad molestiam & insomnium, anodyna. 5. Ad urinam sanguineam & morbi malignitatem, spir. vitr. cum potu, ad gratam aciditatem, mistus. 6. Ad urinæ suppressionem, e toro exitus ad aerem frigidiusculum, cum diureticis & laxantibus.

In quarto stadio obviam itur feбри secundariæ, ejusque symptomatibus, 1. Venæsectione sæpius repetita, dum pulsus sustinere potest. 2. Epispasticis. 3. Alvum frequenter solvendo purgantibus, dummodo pulsus non deficit. 4. Acidis vegetabilibus cum potu mistis. 5. Si vires succumbunt, cardiacis subveniend.

Ad tumorem faucium & defluxionem viscidam, externe cataplasmata, interne gargarismi, vomitus, vesicatoria, situs fere erectus; ad nasi infartionem, vapores emol-

lientes; ad calorem faciei urentem, flos lactis tepefactus & cum plumis illinitus; ad profunda vestigia eradicanda, olei blandissimi inunctio; in abortionibus & mensium nimio fluxu, incrassantia & adstringentia interne sumpta, profunt. Vigesimo primo die, iterum sanguis mitti & purgationes institui debent.

16. CrySTALLINÆ, diureticis, epispasticis & cardiacis: 2. Verrucosæ, digerentibus & epispasticis: 3. Sanguineæ, incrassantibus, antisepticis, vino rubro Gallico, & cort. peruviano, aggrediendæ sunt.

17. In variolis insitivis, attentione habita ad tempus, diætam, & temperiem ægri, vis morbi egregie laxatur; morbo septimo, octavo, nono, vel decimo die sese monstrantē, citius & benignius sua stadia percurrente, & febre secundaria omnino fere evanescente.

18. Uti febris secundaria materiæ reasumptæ effectus est, annon stadium hoc periculosissimum omnino tolli potest, pus e pustulis incisione educendo? Opus certe tædii plenum, sed præmium magnum. Idem perficit natura in extremitatibus.

19. An methodus antiphlogistica vel specifica, in primo stadio usurpata, ulteriorem hujus morbi progressum impedire queat? Neque consentaneum videtur legibus naturæ æternis, neque praxi adhuc confirmatur.

20. Annon pus tenue & fuscum in tertio stadio

stadio corrigi potest cortice Peruviano? An miasmata variolosorum diversæ species sunt, vel sola diversitas ab infecto corpore? An periculum variolarum a copia recepta, vel a statu sanguinis inflammatorio, vel ab ambobus, dependet? An unicuique pustulæ materia adest variolosa? An se multiplicare potest?

## S E C T. V I I I.

*Morbilli.*

1. **E**Andem originem cum variolis morbilli habent, similique contagione per orbem vagantur; nec plus una vice, nisi perquam rarissime, quemquam corripiunt. Sed perperam a multis scriptoribus simul tractantur; naturaliter enim distinguuntur.

2. Mense Januario ingrediuntur, circa vernum æquinoctium maxime grassantur, & mense Julio evanescunt. Teneram ætatem præcipue adoriuntur.

3. Tria stadia habent morbilli, contagii, eruptionis & exarescentiæ.

4. Morbus incipit tremoribus vagis; frigore & calore alternatim; hisce supervenit febris continua cum siti, calore intenso, lingua alba, capitis gravedine, somnolentia, sternutatione, tussi sicca sæpe admodum



molesta , oculis scintillantibus tenuemque humorem distillantibus , palpebris tumefactis. Vomitus nonnunquam adest. Stadium primum.

Quantum circiter diem plerumque apparent in facie maculae , parvae , rubrae insitar morsus publicum , quae sibi invicem implicatae maculas majores constituunt supra cutem elevatas. Postea latae maculae apparent in trunco corporis & extremitatibus , haud supra cutem eminentes. Cessat plerumque vomitus ; sed intenditur febris , tussis , & respirationis difficultas. Superveniunt saepe sudores & diarrhoea. Stadium secundum.

Sextum circiter diem pustulae in facie exarescunt , & cutis desquamatur ; postea idem accidit per totum corpus. Nono die non amplius conspiciuntur , cutisque quasi farina conspergitur. Eodem tempore nonnunquam mitigantur , nonnunquam augentur febris & tussis , quae saepe in peripneumoniam periculosa terminantur. Diarrhoea post morbum aliquando supervenit. Stadium tertium.

5. Crisis perficitur sudoribus , alvi fluxu , & urina copiosa. Nono plerumque die suffocantur infantes , ex nimio feri acris affluxu.

6. A miasmate morbilloso , sanguinem & falsos humores , praecipue glandulae lachrymalis , inquinante , oriuntur omnia haec symptomata.

7. Diagnofis dirigitur a conftitutione regnante , oculis tenuem humorem deftillantibus , titillatione in nafo , inquietudine magna , calore intenko , tuffi & latis rubris maculis in pectore , haud fupra cutem elevatis.

8. Prögnofis eo periculofior , quo tardior eruptio. Diarrhöea mitis & cutis humiditas febrem mitigant. Si puftulæ iterum feſe recondunt , cum delirio , ſignum eſt mortis imminentis ; ſi liveſcunt , periculum magnum. Nimia rubedo vel pallor puſtularum , virium proſtratio , vomitus , inquietudo ſumma , deglutitio difficilis , vel aliæ maculæ , uti petechiæ purpureæ , ſigna mala ſunt. Tuſſicula cum raucedine , morbo finito , perdurans sæpe phthiſeos cauſa fit. Febris lenta , tabes , & abdominis tumor , alvi fluxum , per aliquot ſeptimanas permanentem , ſequuntur.


9. Curantur , 1. Venæ ſeſtione ætate , viribus , &c. meſſuranda. 2. Vomitu. 3. Diæta tenuiſſima. 4. Potu multo diluente acidulo.

10. Ad tuſſim mitigandam , medicamenta pectoralia ; ad inſomnium , declinante morbo , anodyna ; ad maculas purpureas , venæ ſeſtio , ſi adſit plenitudo , & elix. vitriol. conducunt ; ad peripneumoniam & diarrhöeam , methodus in hiſce morbis uſitata.

11. Caveant convaleſcentes ne nimis præmature ſeſe committant frigido aeri ; vel ſalubrem victus rationem lautiori poſthabeant ;

plectuntur enim postea catarrho suffocativo, asthma, phthisi, & tabe.

12. Morbilli per insitionem, ope sanguinis infecti, communicantur, uti a me usu confirmatum est. Die sexto plerumque febricula sese monstrat, mitissima tussicula sine insomnio, & inflammatoriis symptomatibus concomitante; & neque febre hectica, neque tussi, neque oculis inflammatis succedentibus.





## LIBER TERTIUS.

## DE MORBIS NON FEBRILIBUS.

## P A R S P R I M A.

*De morbis totius corporis.*

## S E C T. I.

*De morborum non febrilium distributione.*

I. **O**MNIBUS quæ ad morbos febriles pertinent spectatis, nunc ad non febriles perventum, quorum idonea in diversas classes distributio paulo difficilior est. Hæc mihi optima videtur, in quinque classes redigere. In prima, distribuuntur morbi qui consistere videntur primario in totis corporibus, quamvis nonnulli postea in partes detonant. In secunda, qui præcipue afficiunt cerebrum vel genus nervosum. In tertia, qui oriuntur a labe viscerum. In quarta, qui occupant naturalia vel uterum. In quinta, quibus obnoxia est ætas infantilis.

## S E C T. I I.

*Scorbutus.*

1. **S**corbutus tam varia habet symptomata , ut nulla dari possit definitio ; nihilominus morbus specificus & distinctus ab omnibus aliis apparet. Antiquis cognitus fuit , quanquam inter illos , ob hiemes navigationesque contractiores , non tantum neque tam sæpe sæviebat. Bene de civibus meret Lynd , ob id volumen quod de scorbuto composuit.

2. Variæ hujus morbi distinctiones a practicis traditæ , oriri videntur potius a variis ægrorum constitutionibus , quam a diversa causa ; si alium , præter male fundatam opinionem , parentem agnoscunt. Hinc recte distinguitur in calidam , quando inflammatio adest ; & frigidam , quando abest.

3. Fœminas , viros effœtos , urbanos , studiosos , mœrori indulgentes , convalescentes , & populos septentrionales , præcipue terram paludosam habitantes , adoritur.

4. Causæ remotæ sunt aer humidus paludosus ; diæta crassa ex salitis , fumatis , & induratis carnibus vel piscibus ; aquæ corruptæ ; evacuationes nimix vel nimis parcx ; morbi prægressi ; animi pathemata reprimentia , uti mœror , timor , &c. , cibus post exercitium immodicum ; vita otiosa cum cibi

intemperantia ; & labes hæreditaria. Annon labes viscerum potius a morbo excitatur , quam morbum excitat , quia aliquando nulla adest ?

5. An putredo & attenuatio in ultimis nostrorum humorum particulis est causa proxima ? Huic opinioni favet causarum remotarum contemplatio , symptomata , medela , & cadaverum incisio.

6. Symptomata hujus variantis morbi præcipua hæc sunt : Debilitas ; lassitudo ; defatigatio insolita post motum ; respiratio difficilis & constricta ; nausea ; rubedo , tumor , pruritus & ulcera gingivarum , vel linguae ; denudatio , vacillatio , caries dentium ; spiritus male olens ; pulsus plerumque debilis , raro durus , & semper fere ad motum citatus ; urina rubella , foetens , & pellicula oleosa superne tecta , tibiæ dolor & tumor ; dolores ventris , pectoris , vertebrarum , & musculorum omnium ; orthopnoea ; salivatio ; lethargus aut insomnium ; paralysis extremitatum ; hæmorrhagiæ a variis locis ; scabies , crustæ humidæ siccæque , & cutis squamosa ; pustulæ , ulcera , maculæ lividæ sæpe in gangrænam terminantes ; facies lurida ; febres erraticæ , continuæ , vel intermittentes ; palpitatio cordis ; œsophagi constrictiones ; tendinum vel articulorum rigiditas ; animi dejectiones , & terrores ob nullam causam ; ulcerum antiquorum apertura ;



obstructiones , scirrhotates , ulcera & gangræna viscerum ; lypothymia ; mors subita.

7. Debilitas oritur ab humorum putredine & nimia dissolutione ; ad robur enim corporis requiritur sanguis nec nimis acris , nec nimis tenuis ; respiratio difficilis , a summa debilitate ; gingivarum tumor & ulceratio , ab obstructione & salivæ acredine ; fœtens halena , a putridis particulis per pulmones secretis ; color luridus , a vasis serosis sanguine dissoluto repletis ; debilis circulatio , & tumor tibiæ , a debilitate totius systematis tam arteriosi quam nervosi ; dolores , ab acris particulis in varias partes delatis ; salivatio , ab acri saliva & emissariis erosio ; ab acri attenuato sanguine , paralyxis , hæmorrhagiæ , maculæ lividæ , ulcera interna , gangræna , mors.

8. Diagnosıs perquam certissima si adsit debilitas , fœtens halena , gingivæ tumefactæ , maculæ lividæ , & dissolutus sanguis. Scorbutus distinguitur ab ictero nigro , quia in illo neque os amarum , neque stercora porracea adsunt ; a malo hypochondriaco vel hysterico , quia hæc neque maculas , neque ulcera , neque gingivas tumidas habent ; a malo venereo , quia hoc occupat partes plane diversas , videl. palatū , tonsillas , &c. ; a cachexia , ob hujus flacciditatem & ulcerum immunitatem.

9. Prognosis , nisi in summa corporis de-

bilitate, vel diætæ vegetabilis deficientia, bona; si hæc adsint, incerta. In adolescentibus, & fœminis menstrua patientibus, sanabilior est scorbutus, quam in senibus vel debilitatis, ubi sæpe terminatur in atrophiam, paralyfim, hydropem, dysenteriam, apoplexiam, sphacelationem, quæ in his difficillime curantur. Alvus vegetabili diætâ soluta, cutis mollis & humida, colorque macularum flavescent securitatem pollicentur. Tumores erumpentes, iterumque evanescentes, paralyfim indicant. Tormina ventris diuturna vel tympanitidem vel mortem subitam præfagiunt. Respiratio difficilis periculosa. Quo gingivæ magis ulcerantur, vel maculæ nigrescunt, eo sævior morbus. Animi deliquia imminentem mortem plerumque denunciant.

10. Medela versatur in putridis & acribus particulis corrigendis & ejiciendis, corporeque restaurando.

Perficitur, 1. Leni alvi solutione, subinde repetita, cum rheo, fruct. tamarind. vel crem. tart. 2. Diætâ ex vegetabilibus recentibus, lacte vel sero lactis & pane bene fermentato, omnino præparata. 3. Succis vegetabilium acidorum sinceris, videl. mali aurantiæ, vel citreæ, acetosæ, &c. vel fermentatis, videl. vino pomaceo, Rhenano, aceto, lacte ebutyrato, &c. 4. Herbis recentibus antiscorbuticis dictis, vel succis earum expressis.

Si calefaciant , cum acidis melius propinantur. 5. Mane aquam puram & mollem , vel ferro impregnatam , affatim bibendo , dummodo debito modo per renes secernatur. 6. Lenem sudorem salibus volatilibus , acet. theriacal. &c. mane eliciendo. 7. Medicamentis usu comprobatis , videl. cort. winter. herba vermiculari , ruta muraria , chelidon. min. summit abietis rubr. oxymel. scillitic. 8. Amaris , corroborantibus , & adstringentibus. 9. Frictione & exercitatione viribus accommodata ; aere sicco & temperato. 10. Venere , ebrietate , tristitia , studiis præcipue nocturnis , mœrore , causisque remotis evitatis : ab harum enim mutatione haud notata , monitum practicum , ni fallor , oritur ; sæpe cessasse scorbutum , desuetis ad tempus medicamentis.

11. Ventris cruciatibus , clysmata demulcentia ; summis doloribus , opiata ; lipothymia , vinum meracum , spes , quies , & situs supinus ; ginvivis tumidis & dentibus vacillantibus , elix. vitriol. alumen , adstringentia & spirituosas ; articulorum rigiditati , fomentationes conveniunt.

12. Nautis , ubi licet , & convalescentibus est præsidio corpus bene vestitum habere ; vestes madidas cito exuere ; pro diæta ex legumine & semiputrefactis salitisque carnibus , nonnunquam substituere juscula ex carnibus insulsis , ova , olera , panemque fer-



mentatum ; cerevisia cum abiete rubro confecta  
uti ; cepa , alium , sinapi , & condimenta  
sæpe assumere , corpusque exercere.

13. Quare nonnunquam tam difficilis curatu ?  
Annon noceat mercurius ? Quare febris humo-  
ribus putrefactis non semper adest ? An natura  
putredini gradatim se assuefacit ?

### S E C T. I I I.

#### *Hydrops.*

1. **E**st extravasatio lymphæ vel fluidi  
serosi in tunicam cellularem , vel cavi-  
tates corporis diversas.

2. Distinguitur , 1. In anasarcam vel leu-  
cophlegmaticam , ascitem , tympanitem , hy-  
dropem pectoris & uteri , hydrocelem , hy-  
drocephalum , aliasque species. 2. In ascitem  
veram & spuriam seu hydatides. 3. In hydropem  
lentum & acutum.

3. Hoc morbo maxime tentantur fœmi-  
næ annum circa quinquagesimum ; qui ha-  
bitu corporis molli & obeso præditi sunt ;  
senes sedentarii , uti studiosi , sartores , suto-  
res , &c. & in humido aere degentes , vel  
opus aquaticum exercentes , quales sunt lotores  
& piscatores.

4. Causæ remotæ sunt cruda & viscida  
diæta : spirituum fermentatorum , vini , vel  
cerevisiæ nimia ingurgitatio : aquæ frigidæ

potus quando corpus incalescit : suppressio mensium , lochiorum vel hæmorrhoidum : arthritis vel œdema retropulsa : purgantia fortiora : salivatio mercurialis : immoderata venæ sectio : nimis cita obturatio alvini fluxus opiatum : hæmorrhagiæ ; dysenteria ; phthisis ; icterus ; febris continua , remittens vel intermittens : graviditas : scirrhus tumores viscerum abdominalium , sed præcipue hepatis : polypusæ vel lapideusæ circa cor concretiones.

5. Morbum immediate produciunt , 1. Glandularum vel vasorum lymphaticorum obstructio , dilatatio & disruptio : cadaverum inspectio hanc causam verisimilem reddit ; tamen rarissimè ob peritonæi resistantiam accidit. 2. Resorptio fluidorum tenuium in abdomen secretorum impedita ob tumores viscerum , præcipue hepatis , tubercula pulmonum , & polypusas circa cor concretiones ; ligaturæ & compressiones venarum sanguinem reducentium , tumorem œdematosum partis in vivis animalibus producentes , hujus causæ veritatem elucidant. 3. Sanguinis nimia fusio & vasorum laxitas. Hinc in omni hydrope eadem existit causa proxima , nempe diminuta venarum resorbentium imbibitio , vel minor imbibitio venarum , quam excretio arteriarum exhalantium.

6. In leucophlegmatia , corpus pallescit & emollescit ; pedes tument , præcipue ves-

peri, & vestigia digiti comprimentis ad tempus retinent; gradatim ascendit tumor per totam membranam cellularem; inflantur scrotum, penis, palpebræ, totumque corpus; æger cibum averſatur, sed potum appetit; dyspnœa & tussi laborat; urina aquosa & pallida; pulsusque parvus, citatus & inæqualis; nunquam sudat; in tibiis apparent maculæ & vesiculæ, quæ in ulcera insanabilia degenerant.

Ascitis stipatur tumore abdominis; dyspnœa, præcipue in lecto; gravitate; alvo plerumque constipata; urina pauca, crassa, & lateritium sedimentum deponente; tumore scroti; aquarum fluctuatione, si propriis fassis non continentur; exomphalo; febre lenta; putrefactione aquarum; inflammatione, ulceratione, & gangræna viscerum abdominalium; morte. Aqua in abdomine contenta est vel limpida, vel instar loturæ carniæ, & super ignem concreſcit.

7. Hydrops solvitur diarrhœa; urinæ profluvio; vel disruptione cutis in anasarca, aut abdominis in ascite.

8. A feri lentore, extravasatione, mole & tandem corruptione, hæc oriuntur symptomata.

9. Dignoscitur a gravitate ascitis, colore pallido, siti, febre & fluctuatione. Quando in vesiculis continetur, diagnosi difficilior.



10. Prognosis hydropis , præcipue ascitis , valde incerta. Si appetitus non deletur , si urina potui æqualis est , & albescit , visceraque sana sunt , tunc secundæ valetudinis spes est. Viscera scirrhusa , urina turbida & parca , fitis , debilitas , tussis , evacuationes , vel morbi antegressi , malus corporis , habitus , febris , vel recidivatio , incurabilem denunciant. Paroxysmus comatosus lethalis est. Ascitis peior anasarca.

11. Huic contra itur aquam evacuando & corpus postea roborando.

Aquæ evacuantur , 1. Purgantibus hydragogis dictis , quæ & per vomitum & per sedem operantur , sæpe repetitis. 2. Diuresi , præcipue in phthisicis , imbecilibus , & hysteris. 3. Sudoribus per externum calorem elicitis , præcipue in anasarca. 4. Emeticis subinde repetitis. 5. Obstinata ab omni potu abstinentia , acidis sitim fallentibus. 6. Incisione cutis supra talum in anasarca , vel paracentesi in ascite.

Fibræ roborantur , 1. Corroborantibus , amaris , & chalybeatis. 2. Applicationibus externis discutientibus. 3. Frictione. 4. Leni per fasciam compressione. 5. Balneo frigido. 6. Aere sicco , calidoque ; somno moderato in lecto duriusculo ; corporis exercitio & concussione ; pane hesterno , anisato , fermentato , & in clibano bene cocto ; carne ex venatione , vel ex ficcis & æstuosis

locis veniente , assa ; vegetabilibus calidis ; aromatibus ; vino meraco austero. 7. Medicinam dirigendo adversus causas remotas , nempe evacuationes suppressas , nimiam sanguinis profusionem ; arthritim , scorbutum , vel viscerum scirrhotitates. Ubi convaluit aliquis , diu tamen alienus ei veneris usus fit.

12. Hydropem pectoris comitatur gravitas thoracis , fluctuatio ad motum , tussis sicca , respiratio difficilis & celeris , palpitatio , cæteraque aquarum collectarum symptomata. Tollitur evacuationibus & paracenthesi thoracis.

13. In hydrope uteri , aqua continetur vel in ovario , vel tubo Fallopiano , vel cavitate uteri. Priores duæ neque cognosci , neque curari possunt. Posterior se prodit mensium suppressione , abdominis tumore , mammarum mollitie , ad motum inhabilitate , dolore , rigoribus , & febre. Tollitur balneis calidis , fomentationibus , & vaporibus emollientibus , cathetere vel pessô acri in os uteri introducto. Nonnulli perforationem oris uteri pertinaciter occlusi præcipiunt.

14. Hydrocele vel hydrops scroti oritur ab aqua collecta in tunica cellulari scroti , vel in tunica cellulari cordæ spermaticæ , vel in cellulis ejusdem cordæ tumefactis , vel inter tunicam vaginalem & albugineam testis. Tollitur hydragogis , punctura , & medicamentis discutientibus.

15. Infantibus familiaris est hydrocephalus

lus. Quando in calvaria colligitur aqua , externus dicitur , & curatur discutientibus , epispasticis , cetaceis , & scarificatione. Quando aqua stagnat inter duram & piam matrem , inter piam & cerebrum , vel in ventriculis cerebri , quod plerumque accidit , cognoscitur dolore , lassitudine , tristitia , somnolentia , pulsu in initio tardo , inæquali , febre postea lenta , dilatatione pupillæ , nausea , facie modo rubicunda , modo pallida , comate. Malum plerumque incurabile : attamen aggrediendum evacuationibus ; fontanellis ; arcta capitis ligatura aromatibus impregnata , & in extremo periculo apertura.

16. Timpanites est flatuosus abdominis tumor , instar tympani resonans dum percutitur. Duæ sunt hujus morbi diversæ species , uti cadaverum inspectione patet. Prior excitatur a flatibus intra cavitates intestinorum ; posterior a flatibus inter intestina & peritonæum conclusis , & ab aquis vel visceribus corruptis provenientius. Prior curatur purgantibus & clysmatibus spiritum digerentibus ; corroborantibus ; & applicationibus externis calidis : posterior sola punctura ; neque hæc votis respondet , si intestina ulcerentur.

17. Quare non citius putrescit serum ? Quare ab aqua subito effluente , vel sine debitis cautelis educta deliquium & cita mors ? Quare artificialis compressio minuit periculum ?



lum? Quare acida profunt? Quare opiata urinæ profluvium adaugent, & morbum sæpe tollunt?

## S E C T. I V.

*Struma, seu scrophula, & scirrhus.*

1. **S**crophula est tumor indolens, scirrhusus, in glandulis colli plerumque situs, & in ulcus mali moris degenerans.

2. Sedes hujus morbi præcipua, sed non sola, est glandula; occupat enim membranam adiposam, musculos, tendines, articulos ossium, ipsaque ossa. Varia sortitur nomina secundum glandulas affectas. Si tument parotides vel maxillares, struma; si sublinguales, ranula; si lachrymales, lippitudo; si thyroidea, bronchocele; si glandulæ axillarum, mammarum, inguinum, pulmonum, mesenterii, aliarumque partium, tunc harum partium scirrhus appellatur.

3. Distinguitur, 1. In dolentem & indolentem; 2. Mobilem & immobilem; 3. Apertam & clausam; 4. Originariam & symptomaticeam; 5. Externam & internam.

4. Ætas tenera præcipue, sed matura rarissime, hoc morbo corripitur. Quasdam præ aliis nationes, videl. Styrios, Bavaros, Helvetios, sed præcipue Tyrolenses, graviter infestat.

5. Causæ remotæ sunt cruda, viscida, saccharata, vel acida diæta, aer humidus; exercitium cibo non proportionatum; morbi prægressi; externæ injuriæ; virus venereum; nutrix lac cito acescens vel viscidum præbens, morbove tentata; bilis inertia; frigus; aqua nivalis; luxatio; labes hæreditaria.

6. Aciditas sanguinem coagulans haud originem præbet huic morbo; quia neque gustus neque chymia aciditatem vel feri vel tumoris detegit; immo acida tumorem discutunt. An causa proxima sit humorum ferrosorum vel lymphaticorum visciditas, glandulas conglobatas vel conglomeratas infarciens? Ita patebit, structuram & secretionem glandularum, causas remotas, symptomata, & medelam, contemplanti.

7. Torminibus ventris anomalis persæpe præcedentibus, oriuntur tubera parva, duriuscula, indolentia, mobilia, nec discoloria, fauces vel collum plerumque occupantia; sensim vero aucta vicinis partibus adhærescunt, earumque functionem lædunt. Tandem sentiuntur dolores vagi lancinantes cum calore & cutis rubedine splendente; excitatur parva febricula; suppuratio oritur imperfecta, & post aliquot septimanas vel menses rumpitur tumor; pus crassum vel saniosum secernitur; hiat ulcus squalidum cum labris tumidis & duris. Morbo pro-

grediente, fiunt ulcera mali moris, caries ossium, spina ventosa, anchylosis, febris hectica, hydrops, phtisis pulmonalis, sudores colliquativi, marasmus, mors.

A glandula tyroidea tumefacta, suffocatio & fames. Inspectiones cadaverum ostendunt omnes internas glandulas, præcipue mesentericas, esse strumosas.

8. Tormina ventris a glandulis mesentericis obstructis oriuntur. Glandulæ salivales præcipue afficiuntur, quia frigori, compressioni, & contrectationi maxime subjiciuntur. Facies rubet ob venarum sanguinem a capite reducentium compressionem. Indolentia tumoris tardæ vasorum distentioni debetur. Pus non efficitur blandum, quia humores peccant & motus deficit. Vasa cutanea, adhuc a scirrho compressa, labra tumida efficiunt. Ab humoribus in vasis stagnantibus, caries, ulcera, cæteraque symptomata.

9. Pubertate, primis coitibus, vel in foemina primis menstruis, sæpe solvitur hic morbus.

10. Diagnos. scrophulæ externæ oculis patet; internæ, a symptomatibus petenda est.

11. Scrophula, quamquam incurabilis, haud periculosa est. Externa, a læsionibus ortum ducens, mobilis, parva, benigna, & a vasis vel nervis libera, facilius medelæ cedit, quam interna, humorum vitiatorum proles, immobilis, magna, maligna, & vasis vel



nervis affixa. Omnino incurabilis est hæreditaria. Diathesis scorbutica, rachitica, vel venerea, malum atrocius reddit. Nonnunquam in cancrum transit.

12. Scopus medici est, 1. Humorū dy-  
crasiam corrigere : 2. Tumorem tollere. Prior  
posteriori subservit.

Cachexia corrigitur, 1. Evacuationibus, uti  
phlebotomia semel celebrata, vomitorio, &  
purgantibus amaris vel mercurialibus unaqua-  
que septimana, repetitis. 2. Resolventibus quæ  
modice stimulant, quales sunt saponēs nativi  
& factitii; vegetabilia aromatica; aq. calcis;  
sales alkalini fixi, uti sal. absynthii, spon-  
gium ad nigredinem ustum, si non adsit hec-  
tica dispositio; mercurii præparationes alte-  
rantes dictæ; ferrum & aquæ chalybeatæ;  
sulphur, aquæ sulphuræ; imprimis Moffaten-  
ses nostræ; cortex Peruvianus; antimonium,  
ejusque præparationes; aqua marina quotidie  
mane hausta, ita ut alvus bis vel ter solva-  
tur; aliæque remedia decantata. 3. Fonticu-  
lis prope tumorem. 4. Diæta eupepta & ex-  
siccante, evitatis alimentis viscidis; somno  
moderato; exercitio; & frictionibus, aere  
calido & sicco.

13. Tumor tollitur, 1. Medicamentis ex-  
ternis resolventibus sub forma vaporis, em-  
brocationis, cataplasmatis, vel emplastri.  
2. Suppurantibus, si ad suppurationem tendit

natura. 3. Causticis vel ferro, si nullum a partibus vicinis adsit periculum.

14. An finitur struma annum, circa decimum quintum ob vires solidorum auctas, vel ob quasdam fluidorum mutationes per genitalia inductas? Unde ortum duxit tactus regius, & quid de eo censendum?

15. Hinc intelligitur diagnosi, prognosis & medela scirrhi uniuscujusque. Scirrhus enim est tumor durus sine dolore partes carnosas, pulmones, mesenterium, uterum, sed præsertim glandulas, occupans, ab antecedente inflammatione, vel viscido humorum statu proveniens; hinc ob symptomata, scdem, terminationem, vel curationem, quasi struma locale considerari debet.

16. Sed si scirrhus immobilis, inæqualis, dolens, & partibus necessariis adhærens; vitium hæreditarium, vel habitus malus, tunc lenire potius convenit diæta blanda vegetabili, quiete, alvi laxitate, & empl. saturninis, quam medicamentis in cancerum exacerbare, vel ferro anceps experiri auxilium.

17. Haud infrequens est foeminis non amplius parturientibus, uteri scirrhus, qui a suppressione mensium, relaxatione uteri a fluore albo, difficilique partu oritur, & stipatur pondere hypogastrii, difficili in latere sano vel utroque decubitu, suppressione mensium, venis varicosis & nonnunquam disrum-

pentibus, hydropique abdominis. Nisi medicinæ palliativæ vix locus est, nam aperientibus in cancrum sæpe mutatur.

## S E C T. V.

### *Carcinoma vel cancer.*

1. **Q**Uando scirrhus degenerat in tumorem inæqualem, lividum, lancinentem, cum vasis circumcirca varicosis, carcinoma vel cancer appellatur.

2. Aliquando, nullo antecedente scirrho, oritur in labiis, gingivis, lingua, pene, aliisque corporis partibus.

3. Distinguitur in cancrum occultum, quando adhuc sub cute delitescit; & exulceratum, quando ulcus comitatur.

4. Præcipua, si non unica cancri sedes, est glandula: cancri enim cutaneas excrescentias vel verrucas infestantes, a glandulis subcutaneis mucosis oriri videntur.

5. Causas hæc remotas agnoscit, videl. evacuationes suppressas; mœrorem, terrorem & iram; diætam, vel medicamenta, vel morbos acredinem in sanguine generantes; motum sanguinis a quacunque causa auctum; sterilitatem; cœlibatum; frigus; irritationem externam a frictione, compressione, erysipellate, vel medicamentis.

6. Neque ab humore atrabilario adusto,



neque ab acido corrosivo prævalente, oritur cancer. An causa proxima sit specifica putrefactio, vel corruptio, quanquam tarda, humorum glandulas obstruentium? hoc testantur causæ remotæ, indoles humorum glandulorum, & sanies a cancro secreta.

7. Cancer sese prodit pruritu; calore; dolore lancinante; colore rubro, livido, atro; tumoris augmento; venis tumefactis, varicosis, & nigris; duritiæ inæquali, scabra; apice eminente. Stadium occulti cancri.

Tunc supervenit ulcus apertum; sanies fœtida, cadaverosa, nigra, vel fulva, summe acris, vicinasque partes erodens; radices in altum demissæ; caro in ulcere spongiosa; labia tumida, livida & inversa; dolor exquisitus; glandularum vicinarum infarctiones; hæmorrhagiæ; appetitus prostratus; anxietas; febris lenta; extenuatio; virium prostratio; insomnia; convulsiones; deliquia; mors optata. Stadium cancri exulcerati.

8. Inchoata lenta putrefactione, leniter stimulantur nervi, & fit pruritus. Augetur fluxus sanguinis ad scirrhum; inde calor. Tenduntur nervi; hinc dolor. Color tumoris gradatim nigrescit, ut in omni putredine accidit. Vasa cutanea comprimuntur augmento tumoris, & sanguis crassus, tenuissima parte trajecta, ibi remanet; hinc venæ varicosæ & atræ. Acuminatus fit, ob mi-

norem integumentorum resistantiam. In apice distenduntur magis vasa, ergo ibi rumpitur tumor. Putrefactio humorum ab aere magis intenditur; hinc humores magis corrosivi. Inferne eroditur tunica glandulæ, & radices undequaque demittit. Materia acris, a vasis lymphaticis absorpta, in glandulas vicinas deponitur, & obstructions ubi gignit. Venæ erosæ sanguinem evomunt. Sanies absorpta sanguinem contaminat; hinc febris lenta, marasmus, convulsiones, lipothymia, mors.

9. Diagnofis canceri incipientis, ex pruritu, colore, & dolore petitur: antiqua oculo patet.

10. Prognofis periculofiffima. Internus peior externo. Quo propior fit cordi, quo nobilior pars affecta, eo magis desperatæ sunt res. Humores blandi malignitatem morbi opponunt. Incurabilis est, si inter vasa majora, vel ad os radices egerit. Progressus æstimatur colore odoreque saniei, & hæmorrhagiis. Mors fluxum saniei desinentem sequitur. Quando febre, convulsionibus, vel lipothymia corripitur æger, ad extrema ventum est.

11. Methodus medendi vel curatoria, vel palliativa est. Cancer incipiens, parvus, solitarius, mobilis, ab externa injuria præcipue proveniens, loco apto situs, neque vasis magnis, nervis, ligamentis vel ossibus

adhærescens , in juvenili corpore , haud fracto , euchymo , tollendus ferro potius quam escaroticis vel cauteriis : discuti enim vel suppurari per remedia sueta nullo modo potest.

Corpus ante operationem blanda & nutriente diæta præparandum ; & humores postea alterantibus diu assumptis corrigendi.

Cancer ob contrarias dotes operationi ineptus ; medelam palliativam solummodo admittit. Absolvitur sanguinem corrigendo venæsectione , purgantibus lenissimis , alterantibus non stimulantibus. 2. Embrocationibus , unguentis , & emplastris saturninis , ad cancerum occultum vel exulceratum externe applicatis. 3. Fonticulis prope locum affectum. 4. Diæta putrefactioni opposita , & summa quiete. 5. Mitigatione doloris per opiata.

12. Cancer palati , faucium , uteri , cæterarumque internarum partium palliativam medelam solummodo admittit.

13. Sæpe proficit in cancro faciei nasique mercurius sublimatus corrosivus in spir. vini solutus , & ad grani dimidium mane & cœnato haustus. Nonnunquam mammarum carcinomati respondet infusio solani.

14. Quid de exesione canceri per arsenicum edulcatum censendum?



## PARS SECUNDA.

*De cerebri nervorumque morbis.*

## S E C T. I.

*Apoplexia.*

1. **A**POPLEXIA est privatio sensuum internorum & externorum, motusque animalis, excepto motu cordis & thoracis, cum stertore.

2. Distinguitur, 1. A gradu morbi. 2. A causa, nempe in sanguineam, serosam, polyposam, &c.

3. Desides, obesos, plethoricos, brevem cervicem habentes, potatores, præcipue sexagesimum circiter annum, infestat. Hieme & tempestatibus pluviosis grassatur. Aliquando epidemica est.

4. Causæ remotæ sunt laxa & plethorica constitutio; balnea nimis calida, nimia spirituum fermentatorum ingurgitatio; subita refrigeratio post pocula vel crapulam; insolatio; animi pathemata; affectiones hysteriæ; serosa colluvies; libidinis, præcipue senilis, intemperantia; acris materiæ repulsio; urinæ suppressio; salivatio mercurialis a frigore aliisque causis subito interrupta; contusiones, convulsiones, & vulnera capitis; venena; halitus carbonum; labe hæreditaria.

5. Causa proxima est impeditus motus fluidi nervosi. Obstructio fit a causis intra vasa vel extra vasa cerebri existentibus. Causæ intra vasa sunt nimia sanguinis vel feri viscidæ quantitas. Causæ extra vasa sunt effusiones sanguinis, feri, aliorumque humorum a concussionibus, vulneribus, vasis erosio, hydropes: compressiones a tumoribus, hydatidibus, vel corporibus extraneis: impedimenta sanguini a cerebro redeunti ob tumores, polypum vel ligaturas. Conspectui subjiciuntur hæ causæ in cadaveribus. An spasmus in origine nervorum inter causas proximas enumerandus sit? Haudquaquam; quia musculos, non nervos, spasmus adurit.

6. Paroxysmum prægrediuntur torpor sensuum internorum & externorum; vocis tarditas; vertigo; capitis dolor; tremor & stupor extremitatum; dentium stridor; hypochondriacæ & hysteriæ affectiones; incubus; oculorum spontaneæ illachrymationes; aurium tinnitus; respiratio solito profundior.

Corruit æger subito cum abolitione functionum animalium; difficili respiratione; extremitatum frigore; cutis arescentia; faciei rubore; arteriarum forti pulsatione; somno profundo; stertore; aliquando spuma circa os; & resolutione sphincteris vesicæ anique. Tandem corripitur vomitu, & paroxysmus

solvitur copioso sudore. Sæpe remanet hemiplegia vel paralyfis.

7. Prædicta symptomata facillime deducuntur a fluido nervoso gradatim intercepto. Manet respiratio & cordis motus, quia intactum est cerebellum.

8. Diagnofis facilis a lethargo, quia nulla adest fomnolentia, neque excitari poteft; a caro, ob difficilem refpirationem & ftertorem; & a fyncope, quia pulfus non deficit. Sanguinea diftinguitur a ferofa, progreflo habitu, & præfentaneis inflammationis fignis.

9. Prognofis eo profperior, quo minus læfi funt fenfus externi & interni, motus & refpiratio. Apoplexia fanguinea periculofa, fed curatu facilior eft; ferofa difficillime curatur. Spiritus impeditus, fpuma oris copiofa, fudor multus frigidifculus, mortem infantem demonftrant. Apoplexia a compreffione cito lethalis, nifi manus chirurgica in auxilium veniat. Apoplexia ferofa, febre; fanguinea, hæmorrhoidibus fupervenientibus, folvitur. Quartum poft diem paroxyfmus plerumque fit lethalis.

10. Indicatio eft cerebri obftructionem referare. Secundum diverfitatem cauſæ obftruentis, diverfimode perficitur.

Si obftructio oritur a nimio fanguine cerebrum oplente, tollitur, 1. Larga miffione fanguinis ex jugularibus vel arteria temporali. 2. Cucurbitulis occipitio incifo admo-



tis. 3. Epispasticis. 4. Purgantibus antiphlogisticis continue repetitis; clysmatibus emollientibus. In hac specie evitari debent calefacientia.

Si obstructio oritur a sero nimis viscido, tollitur, 1. Revocando a cerebro. 2. Corrigendo lentorem.

Revocatur, 1. Venæsectione, parca manu celebranda, vel hirudinibus temporibus applicatis. 2. Vomitu. 3. Clysmatibus & purgantibus acerrimis. 4. Spiritibus volatilibus & sternutatoriis naribus applicatis. 5. Pediluviiis. 6. Actuali cauterio cervici admoto.

Lentor corrigitur, 1. Epispasticis continuatis. 2. Attenuantibus & calefacientibus. 3. Cibis mediæ materiæ; nam & viribus opus est, & cruditates cavendæ sunt.

In utraque specie convenit situs erectus; moderatus calor, stragula pauca.

Si denique obstructio fit ab humoribus, vel aliis corporibus comprimentibus, totus medellæ cardo versatur, 1. In inanitione vorum. 2. Extractione causæ chirurgica.

11. Medicina prophylactica, apoplexiæ sanguineæ evacuationibus & temperantia; apoplexiæ serosæ diæta exsiccante, purgantibus amaris debitis intervallis repetitis, & setaceis, innititur.

12. Cur, sensu motuque decrefcentibus, pulsus sæpe validior fiat?

## S E C T. I I.

*Morbi Soporosi.*

*Coma somnolentum seu cataphora, lethargus, carus, & coma vigil.*

1. **M**orbi soporosi leviores sunt apoplexiæ; & in coma somnolentum seu cataphoram, lethargum, carum, & coma vigil, dividuntur.

2. Coma somnolentum seu cataphora est somnus profundus; a quo tamen æger excitari potest, sine febre.

Lethargus, seu veteris, est continua ad somnum propensitas, cum oblivione, caloris augmento, febre lenta, pulsu pleno & sæpe remittente, respiratione rara, pallore & tumore palpebrarum, & sudore frigido in extremitatibus.

Carus est somnus profundior, in quo sensu motuque fere privatur æger. Vel idiopathicus sine febre, vel symptomaticus cum febre.

3. Causæ remotæ sunt serosa colluvies cerebri inundans; sanguis effusus, vel tumor intra cranium; lotium interruptum; cachexia; scorbutus: mœror; potus; crapula; nicotianæ nimius usus; effluvia.

4. Influxus liquidi nervosi in nervos, motibus voluntariis & sensationi dicatos, plus

minus impeditus , morborum soporosorum causa proxima est.

5. Urina limpida , diarrhœa aquosa , tremor , & sudores frigidi , non leviter nos terere debent. Crisis ante septimum diem in lethargo plerumque infausta ; sed postea plerumque fausta est. Quo major pulsus , eo periculosior morbus. Carus cum respiratione læsa , apoplexiâ , cum cephalalgia , convulsionem , denotat.

6. Curantur , 1. Excitando ægrum e sopore odore foedo , stimulantibus , cataplasmatibus , & clysmatibus acerrimis , sternutatoriis , vesicatoriis , scarificatione , frictione. 2. Stagnationem vel extravasationem removendo venæsectione , purgantibus , & cibo forbili. 3. Paroxysmi reditum impediendo evacuationibus statim temporibus repetitis , diætâ exsiccante , somno moderato , exercitio , recreationibus.

7. Coma vigil est species stuporis sine somno , cum dolore & calore capitis.

### S E C T. I I I.

#### *Paralysis.*

1. **P** Aralysis est abolitio vel diminutio motus , aut sensus , aut utriusque in uno vel pluribus partibus corporis.

2. Distinguitur , 1. In ἀνασχοσίαν , ubi de-



ficit tantum sentiendi vis ; & paralyfin , ubi motus sine vel cum sensu labefactatur. 2. In paraplegiam , hemiplegiam , & paralyfin localem , uti extremitatum , linguæ , palpebrarum , œsophagi , sphincteris vesicæ & ani , penis , &c.

3. Causæ remotæ sunt ebrietas , indoles humorum scorbutica ; colica pictonum ; aer frigidus vel humidus ; aqua vel pus inter meninges effusum ; vulnera cerebri , vel medullæ spinalis ; compressio externa ; unitas nervi soluta ; evacuationes solitæ suppressæ ; apoplexia & convulsio ; terror subitus ; fumi mercuriales , arsenici & saturnini ; tactus piscis torpedo appellati ; senium.

4. Causa proxima est interceptio influxus liquidi nervosi in musculos , ab obstructione cerebri in parte , medullæ oblongatæ , medullæ spinalis , vel nervorum. Ab intercepto sanguine ; temporanea , vix vera paralyfis , oriri potest ; hoc patet a distributione , anastomosique vasorum , & operatione aneurismatis.

5. Antecedit partis passuræ gravedo , pallor , stupor & tardus motus. Pars affecta motu vel sensu vel utroque plus minus privatur , & mollis , frigida , atrophica , vel œdematosa devenit. Pulsus plerumque parvus , mollis & tardus , interdum creber & inæqualis. Tandem memoria & ratio labascunt. Paralyfis particularis functionibus partium lœsis sese monstrat.

6. Diag-

6. *Diagnos* loci primario affecti petitur ab injuriis externis & cognitione ortus, progressus, & distributionis nervorum.

7. *Paralysis*, ab *apoplexia* ortum habens, in *apoplexiam* sæpe revertitur. A sectione vel luxatione valida, vel ab ictu derepente orta, vel ubi pars diminuitur, insanabilis. Dolor, sensatio, calor vel formicatio partium, aut tremor superveniens, securitatem pollicentur. Febris vel diarrhœa sæpe paralysis solvunt.

8. *Medela* requirit, ut liberus fluxus liquidi nervosi per suos canales iterum restitatur. Perficitur, 1. *Venæsectione*, si in habitu plethorico juvenili, vel a causis remotis inflammatoriis morbus subito ingruat; aliter sanguis haud mittendus. 2. *Purgantibus* & *clysmatibus* acrioribus diarrhœam continuam per plurimos dies excitantibus: quanquam methodus hæc in senio non usurpanda. 3. *Febrem* temporaneam excitando medicamentis stimulantibus, calefacientibus, & attenuantibus. 4. *Vomitoriis* sæpe repetitis & *sternutatoriis*. 5. *Thermis* vel aquis ferrugineis. 6. *Externis* ad sedem mali applicationibus, videl. urticatione, epispasticis, frictione, electrificatione, linimentis nervinis, balneis calidis, vel natura vel arte paratis. 7. *Diæta* calefaciente cum aromatis præparata, somno mediocri, motu mul-

to, aere calido & sicco. Vitare frigus, & rarissima venere uti, convenit.

9. Stupor & tremor paralyfi affines sunt, eodemque modo curantur.

## SECT. IV.

### *Epilepsia.*

1. **M**Orbus epilepsia, vel sacer, vel puerilis, vel Hercules, vel comitialis dictus, est subita privatio internorum & externorum sensuum, cum subitis violentibusque alternis contractionibus & relaxationibus musculorum totius fere corporis, motibusque partium exinde convulsivis.

2. Distinguitur in idiopathicam, quando primaria morbi sedes in capite; & symptomaticam, quando sedes primaria extra caput est.

3. Infantes, præcipue delicati, & defluctionibus capitis, hæmorrhagiis vel tinea laborantes, huic morbo maxime sunt obnoxii. Sæpius viros quam fœminas occupat.

4. Causæ remotæ sunt externæ capitis injuriæ, uti vulnera, percussiones, fracturæ cranii; aqua, sanguis, vel serum acre, cerebrum inundans, vel ventriculos opplens; inflammatio vel sphacelatio cerebri; concrectiones, vel polypi intra cranium; erosiones, dilacerationes, vel vulnera nervorum; eva-



cuationes solitæ retentæ ; repletio & inanitio ; animi pathemata magna , & præcipue subitus metus , noxiæ particulæ in corpus admissæ ; venena ; labes hæreditaria.

5. Neque iræ antiquorum cœlesti , neque pituitæ , neque specifico fermento , neque explosioni violenti fluidi nervosi , neque contractioni duræ matris , attribuenda est causa proxima. An in motibus spirituum animalium involuntariis & inæqualibus , ab irritatione generis nervosi provenientius , investiganda sit ? Ita suadent contemplatio causarum remotarum , inspectiones cadaverum , symptomataque.

6. Paroxysmum aliquando antecedunt lassitudo ; stupor ; vertigo ; dolor capitis ; scotoma , aurium tinnitus ; insomnia horrenda ; palpitatio ; respiratio difficilis ; tumor & murmura abdominis ; urina multa , & præter solitum tenuis ; facies pallida ; lingua titubans ; frigus extremitatum ; sensusque auræ frigidæ ad caput ascendentis.

Invadente paroxysmo , convulsus subito concidit cum vociferatione , oculorum contorsione , digitorum contractione , stertore , spuma oris , extremitatibus hinc inde curvatis. Perit ratio & sensatio. Inscio elabuntur semen , urina , feces. Remittentibus symptomatibus , ad se redit , & dolorem capitis , torporem , & lassitudinem sentit. Peractæ tragœdiæ inscius est.

Paroxyfmi ftatis temporibus quandoque redeunt; vel ab animi motibus, ftudiis nimiiis, poculis caliditate vel frigiditate, inducuntur. In morbi progreflu fenfus hebefcunt, & ratio vacillat.

7. Ex motu involuntario & irregulari fluidi nervofi, facile deducuntur hæc fymptomata.

8. Diagnofis vifui patet.

9. Prognofis incerta. Sæpe folvitur hic morbus a pubertate, intermittentibus febribus, & irruptionibus. Solet quidem etiam longus efle, ufque ad mortis diem, & vitæ non periculofus. Sympathetica facilius curatur quam idiopathica: hæreditaria vix medelæ aufcultat. Morbus poft quintum & vigefimum annum ortus ægre, poft quadragefimum ægrius curatur. Si nullus in partibus venientis mali fenfus eft, aut mens læfa, aut nervorum facta refolutio, vix fanatur. Si breves fint intermiifiones, convulfiones sævæ, respiratio difficilis, ftertor vehemens, & poftea alta quies, æger in peffimo verfatur ftatu. Epilepfia in apoplexiam sæpe degenerat.

10. In paroxyfmo fcopus eft convulfiones fedare. Perficitur, 1. Venæfectione in vena jugulari, fi non adfint inanitio vel debilitas. 2. Revellentibus, uti frictionibus, ligaturis extremitatum, veficatoriis, cataplafmatibus, & fternutatoriis. 3. Antiepilepticis & antif-

pasmodicis per anum injectis, vel capiti & spinæ sub forma unguenti applicatis. 4. Tollendo causas remotas immeditate in cerebrum agentes, quales sunt depressiones, fracturæ cranii, vel corpora extranea.

In intermissione scopus est paroxysmum impedire. Perficitur, 1. Antiepilepticis; vel specificis sic dictis medicamentis. 2. Evacuationibus per intervalla repetitis. Fonticulis & setaceis. 4. Systema nervorum corroborando. 5. Causam primariam in epilepsia symptomatologica tollendo; vomitu, si oneratur ventriculus; & ligaturis, vel empl. epispasticis, si ab irritatione partis cujusdam, ipso loco applicatis. 6. Aere temperato & sicco; cibo eupepto & aromatibus condito; somno moderato; evitatis animi pathematibus, venere, objectorum moventium vel terrentium locive præcipitis conspectu, balneo, igni, frigore, vomitu, lassitudine, omnibusque negotiis.

## S E C T. V.

### *Convulsiones.*

1. **C**onvulsiones, spasmi, vel distentiones nervorum sunt alternæ & involuntariæ contractiones relaxationesque musculorum, animi facultatibus & sensibus externis integris. Easdem agnoscunt causas re-



motas & proximas , gradu solummodo diversas , ac epilepsia , & eodem modo curantur.

*Spasmus cynicus vel risus Sardonicus.*

2. Quando hæ convulsiones occupant musculos buccarum vel labiorum , tunc spasmus cynicus , vel risus Sardonicus , appellantur. Haud diversam a priore medelam requirit.

*Chorea sancti Viti.*

3. Est & alia convulsione species , chorea Sancti Viti nominata , ubi crus claudicatione , & brachium ejusdem lateris convulsione corripuntur. Sanatur hic morbus repetita venæsectione & purgatione , cum antiepilepticis & roborantibus , videl. cort. Peruviano , chalybeatis , & balneo frigido. Confert musculis convulsione affectis admove-  
vere secundo quoque die cucurbitulas ficas.

S E C T. V I.

*Tetanus , opisthotonos , emprosthotonos.*

1. **T**etanus est continuâ & involuntaria musculorum fere omnium contractio & rigiditas , sine relaxatione. Si nonnullis intactis trahitur corpus versus ante-

rioria , emprosthotonos ; si versus posteriora , opisthotonos appellatur. Posteriores a priore gradu solummodo distinguuntur.

2. Hoc malum in calidissimis terræ regionibus endemice grassatur , præcipue tempestatibus pluviosis æstui succedentibus. Rarissime plagas cœli mitioris infestat.

3. In tetano muscoli anteriores & posteriores æqualiter contrahuntur , & corpus instar ligni riget. Spasmus sub sternum , ad spinam vergens , sentitur. Dolores , præcipue spasmodicis sævientibus , acutissimi deveniunt. Facies rubet & detorquetur. Genæ retrahuntur. Oculi rigent. Mandibula nonnunquam obseratur. Pulsus sæpissime præternaturaliter tardus est. Sanguis detractus minus solito cohæret. Alvus constipatur. Respiratio fere intercipitur. Actiones naturales tantum non supprimuntur , sensibus externis & internis integris. Costæ incurvantur. Vitio depulso , summa ad longum tempus atonia.

4. In opisthotono & emprosthotono cervix primo immobilis est ; dein spasmodicis sævientibus , retrorsum in priore , & antorsum in posteriore , convellitur. Motus mandibulæ & deglutitio impeditur. Spasmus sub sternum spasmos severiores inducit. Pulsus alias tardus & durus , alias parvus , fluctuans , & irregularis. Lingua riget. Os spuma sanguinea scatet. Musculi spinæ & inferiorum

extremitatum, intactis superioribus, in consensum trahuntur. Tandem spasmodicis severioribus, vel insultu epileptico, æger explet mortalitatem.

5. Morbi periculosissimi sunt, & ratissime, nisi ubi leniter adveniunt, tertium diem transgrediuntur. Ex acerbitate primi insultus periculum judicatur.

6. Auxilium est, 1. In sanguinis missione, si vires patiuntur. 2. In medicamentis antiepilepticis. 3. In aqua tepida per anum injecta, fomentationibus musculis rigidis externe applicatis, vel balneis tepidis manufactis. Sed, 4. Præcipue in opio intrepide administrato, & brevioribus intervallis, prout dolores admonent, subinde repetito. Unicus quem vidi tetanus, multis abhinc annis, opio, omnibus incassum tentatis, extemplo sum-motus fuit.

Vires postea restaurandæ cort. Peruviano.

## SECT. VII.

### *Catalepsis.*

1. **C**atalepsis, seu catechus, morbus dicitur, quando fixus remanet æger in eodem statu in quo prehensus fuit, sensibus internis & externis abolitis.

2. Causæ remotæ sunt, animi pathemata; meditatio seriosa; frigus; evacuationum sup-



pressio ; vermes ; vapor carbonum ; serosa colluvies intra cranium.

3. Causa proxima est fluxus liquidi nervosi in nonnullos, & quies in omnibus aliis nervis.

4. In quo statu correpti sunt, vel sedentes vel stantes, eundem immoti servant. Oculi aperti rigent. Sensus externi & interni pereunt. Pulsus & respiratio bene sese habent. Cum multis suspiriis ad se redeunt.

5. Curatur sanguinis vel a naribus vel vena jugulari detractione ; stimulantibus naribus applicatis ; cataplasmatibus & clysmatibus acribus ; epispasticis ; frictione ; &, post paroxysmum, setaceis, vomitu, & causarum morbum producentium correctione vel ablatione.

## S E C T. V I I I.

### *Malum hystericum & hypochondriacum.*

1. **H**ysterica passio, suffocatio uterina, ascensus uteri idem morbus in foeminis, qui in viris malum hypochondriacum audit, habita ratione ad diversam corporis structuram. Ab antiquis describitur.

2. Sævit in foeminas, præcipue innuptas vel viduas ; viros studiosos ; acutos & facile irritabiles utriusque sexus.

3. Causæ remotæ sunt nimia humorum

evacuatio per venæsectionem, vomitum, sedem, menstrua, vel abstinentioniam; nimia retentio mensium & lochiorum, vel evacuationes solitæ neglectæ; pubertas, & ad venerem impermissam proclivitas; vita sedentaria; animi commotio; diæta viscosa, acida, flatum generans; prægressi morbi; labe hæreditaria. Paroxysmum inducunt sua-veolentia.

4. Causa proxima haud investiganda est in uteri ascensu, vel vaporibus hinc ad cerebrum delatis, vel visceribus abdominalibus atra bile obstructis, vel peristaltico intestinorum motu inverso, vel in fluido nervoso in genere affecto. An est spasmodica viscerum abdominalium, & præsertim uteri, affectio, una cum nimia sensibilitate vel mobilitate systematis nervosi? Hoc suadent contemplatio causarum remotarum, symptomatum, & medelæ, sectionesque cadaverum.

5. Sic se habet paroxysmus: Primo sentitur dolor coarctans in fronte; sensuum hebetudo; visûs obnubilatio; tædium. Afficitur æger sensatione globi ascendentis ad fauces cum suffocatione; palpitatione cordis; inæquali & duro pulsu; vomitu materiæ acidissimæ, vel bilis viridis; respiratione difficili; clavo hysterico; renum & vesicæ doloribus instar calculi; odontalgia; dolore in dorso; difficili mictione; summo externarum partium frigore; ptyalismo; flatu;

tumoribus ; risu vel ploratu effuso ; urina multa limpida ; animi irritabilitate ; apoplexia ; convulsionibus.

Remittente paroxysmo , remittunt cito symptomata. Intestina obmurmurant ; oculi attolluntur ; corpus incalescit ; & æger , suspiriis profunde emissis , ad se redit. Sæpe sudoribus solvitur paroxysmus.

6. A ramis paris octavi & intercostalis aliquo modo irritatis proveniunt globus hystericus , suffocatio , palpitatio cordis , vomitus , dolor renum , urina limpida , stranguria , flatus , externorum frigus , &c. : dolor dorsi , a communicatione horum nervorum cum dorsalibus : ptyalismus & odontalgia , a quinto pari consentiente : a toto genere nervoso affecto , clavus hystericus , risus & lachrymæ effusæ , animi irritatio , apoplexia , convulsio.

7. Diagnofis petitur a symptomatibus , præcipue urina limpida & suffocatione ; a paroxysmo , animi motibus , vel effluviis suaveolentibus , excitato , & graveolentibus fugato. Differt a syncope , apoplexia , epilepsia , calculo , iliaca passione.

8. Prognofis eo magis fausta , quo mitiora sunt symptomata. Paroxysmo aliquando rapitur æger. Evacuationes mensium vel hæmorrhoidum criticæ morbum tollunt. Rugitus & pudendi humiditas paroxysmum cito abiturum demonstrant. Originem præ-



bet hoc malum scirrhoris viscerum obstructionibus & putrefactionibus ; hydropi ; asthmatis ; febris hecticæ.

9. In paroxysmo , indicatio est irregularem spirituum fluxum & spasmum consopire. Perficitur , 1. Venesectione , si adsit plethora , vel evacuationum obstructio. 2. Stimulantibus & hystericis medicamentis. 3. Frictionibus extremitatum. 4. Pediluviiis 5. Titillatione plantarum. 6. Clysmatibus spiritum digerentibus. 7. Opium adhibendo , præcipue in dolore acuto vel vomitu atroci.

Extra paroxysmum systema nervosum corroborandum , 1. Amurcam expellendo lenissimo vomitorio & purgantibus. 2. Amaris & corroborantibus. 3. Equitatione. 4. Ferro vel aquis ferrugineis. 5. Antispasmodicis & hystericis. 6. Diæta lactea , si antedicta nil proficiunt.

Evacuationes repressæ sollicitandæ sunt. Cibus flatulentus evitandus.

Si ab orgasmo uteri oritur morbus , tollitur antiphlogisticis , matrimonio.

10. Quare tam difficile curatu ? Quare rusticis & laborantibus minus familiare est ? Quare hisce temporibus tam commune ?

## S E C T. I X.

*Insania.*

1. **I**nsania est mentis alienatio , vel delirium perdurans , sine febre.

2. Distinguitur , 1. In melancholiam & maniam ; prior est insania cum tristitia & occupatione mentis circa unum objectum ; posterior est insania cum furore. Diversi videntur gradus ejusdem morbi. 2. In continuam & periodicam.

3. Hebetes , tarde discentes facileque iterum obliviscentes , & tristes melancholia ; iracundi , hilares , juvenes , plethorici , tensasque fibras habentes , mania tentantur.

4. Temporibus calidissimis & ficcissimis oritur hoc malum.

5. Causæ remotæ sunt nimia & continua animi attentio ad unam ideam ; animi pathemata cogitationes omnino occupantia , uti mœror , tristitia , metus , spes , gaudium , præcipueque amor ; religionis falsæ terrores ; immodica venus ; venena narcotica ; morbi febriles prægressi ; evacuationes debitæ suppressæ ; alimenta dura & viribus concoctricibus haud attenuanda ; vita sedentaria ; pia mater callosa ; cerebrum ficcatum , labes hæreditaria.

6. An sanguis ater , crassus , tenax , atrabilis ab antiquis appellatus , inquinando spi-

ritus animales, causa fit proxima melancholiæ & mania? Huic opinioni fidem faciunt accuratæ cadaverum inspectiones, operatio caufarum remotarum, & medela.

7. Sedes hujus morbi præcipua est in ipso cerebro.

8. In melancholia æger mœstus; abjectus; pavidus; insomnis; hominum coetus fugiens; ad iram sine causa pronus; mutabilis; de minimis rebus sollicitus; nunc avarus; statim prodigus. Venter constipatur. Urina parca & pallida prodit. Præcordia flatu attolluntur. Vomitu rejicitur acris materia. Facies pallescit. Arteriæ pigre moventur. Alimenta avidè appetuntur. Imaginatio tantum pervertitur, ut vasa fictilia, vitrea, immo mortuos sese credunt. Quod tristissimum est, sibi ipsis manus inferre expetunt.

Maniam præcedunt oculi rubentes; palpebræ inconstanter vibrantes; mores a solitis mutati; superbia; odium erga hunc aut illum; dies noctesque insomnes; cephalalgia; aurium tinnitus & sonitus musicus; risus intempestivi. Procedente morbo, in iram effrenem & truculentam incidunt: obvios vel seipsos lacerant: venerem egregie & immodeste appetunt: vires & frigoris tolerantia mirum in modum augentur: imaginatio egregie vitiatur. Tandem, paroxysmo declinante, mœsti, quieti & stupidi fiunt.

Insania sæpe fugat alios morbos antea in



corpore inhærentes, & ægrum immunem a grassantibus servat.

9. A crasso & tenaci sanguine vasa cerebri implente, & liquidum nervosum, crassum, tenaxque producente, oriuntur tristitia, timor, cogitationes uni objecto infixæ, imaginatio læsa, robur insolitum, frigoris & famis tolerantia, secretiones impeditæ, & ab aliis morbis immunitas.

10. Diagnofis patet. A phrenitide differt infania, quia hanc nulla, vel saltem parva, illam acuta febris comitatur.

11. Spes melior in infania, quæ ab evacuationibus suppressis, quam quæ ab erroribus diætæ, quæ a corpore, quam quæ a mente, originem ducit; quando adest lætitia, quam quando adest tristitia. Morbum solvunt hæmorrhagiæ narium, diarrhœa, scabies, hæmorrhoides, menses. Sub somno plerique sanescunt. Remissionibus in hoc morbo haud fidendum est. Quando vires labefactantur, vel affectiones epilepticæ, vel comatosæ superveniunt, mors adest.

12. Intentio medici debet esse, 1. Revellere & evacuare humores cerebrum opilantes. 2. Spissum sanguinem attenuare & corrigere.

Revulsio & evacuatio perficitur, 1. Venæsectione, parce in melancholia, sed sæpe in mania, celebrata. 2. Vomitu. 3. Purgatione continua. 4. Diureticis. 5. Setaceis. 6. Eva-

cuationes suppressas sollicitando. 7. Immersione in aqua frigida; vel balneis tepidis, dummodo caput, haud immersum, aqua frigida eodem tempore perfunditur.

Sanguis corrigitur, 1. Potu multo diluente, aquis mineralibus, & nitro. 2. Medicamentis specificis. 3. Animi serenitate, diæta ex cibis levissimis & blandissimis, exercitio & peregrinatione.

13. Animus in diversis diversimode regendus: in melancholicis, spe, fiducia, ludis, musica, & fabulis, erigendus; in furiosis, timore, tenebris, vinculis, subitis terroribus, deprimendus est.

14. Opiata, non nisi in extrema sollicitudine & longo pervigilio, concedenda. Lenis capitis frictio, filanus juxta cadens, gestatio, cucurbitulæ occipitio inciso admotæ, & balneæ calidæ, ad somnum conducunt.

15. Cura præservatoria debitis evacuationibus & animi diætæque regimine nititur. Optimum est morbo liberatis mutare regiones, annua peregrinatione jactari, neque esse solos, neque inter ignotos.

16. Post febres continuas, remittentes, vel intermittentes, oritur fatuitas, species insanix a superiore longe diversa. Uti ab inanitione provenit, diæta nutriens, exercitium viribus proportionatum, & medicamenta cardiaca profunt. Absit omnis evacuatio.

## S E C T. X.

*Odontalgia.*

1. **I**NTER morbos nervosos merito recensetur Odontalgia, vel dolor dentium, quia a nervo irritato provenit.

2. Hanc irritationem inducunt rheumatica sanguinis diathesis; aeris humiditas; inflammatio gingivarum; impedita malarum perspiratio; potus vel alimenta acida, dulcia, frigida vel calida; dentium caries.

3. Dolor acutus in uno vel pluribus dentibus sentitur. Gingivæ inflammantur. Genæ sæpe dolent & tument. Somnus abest. Inflammatio vel discutitur, vel in suppurationem abit, quæ dentem cariosum reddit. Aliquando suppuratio fit ad radices dentium.

4. Diagnosin haud facilis inter odontalgiam & inflammationem in antro Heighmorianum.


5. Minuenda primo inflammatio, dein dolor mitigandus. Minuitur inflammatio venæsectione; purgatione cum mercurialibus; sudorificis; vapore aquæ calidæ per spongiam extrinsecus admotæ; medicamentis sputum magna copia allicientibus; vomitu; gingivarum scarificatione; sanguisugis ibi applicatis, & epispasticis pone aures. Sedata inflammatione, dolor mitigatur spirituosius vel narcoticis dentibus applicatis.

6. Dolor quoque cessat, 1. Antetragam



adurendo. 2. Inflammantia, vesicantia, & anodyna pone maxillam inferiorem, vel aures, temporibus vel cubito, applicando. 3. Dentem cariosum, quo minus externa irritent, plumbo implendo. 4. Actuali cauterio, per foramen transmissio, comburendo; vel spir. salis aut ol. vitriol. gutta una aut altera, nervum destruendo. 5. Extractione.

7. Quare dentes molares plus quam alii afficiuntur? Quare proximus vel oppositus idem sæpe subit fatum? quare aliquando dens consumitur sine dolore?



## P A R S T E R T I A.

*De morbis qui oriuntur in partibus.*

## S E C T. I.

*Hæmoptysis, aliæque hæmorrhagiæ.*

1. **Q**UANDO sanguis floridus & spumans tussi ex pulmone fertur, hæmoptysis appellatur.

2. Ad hunc morbum prædisponunt corpora graciliora, debiles fibræ, collum longum, pectus angustum, multus & acris sanguis.

3. Causæ remotæ sunt sanguinis orgasmus, vel nimia expansio, ab aucto particularum fermentantium intestino motu; spasticæ nonnullorum viscerum contractiones, quales sæpe accidunt in hysteriis & hypochondriacis malis; obstructio scirrhusa in vicinis visceribus, & scirrhus vel polypus in ipsis vasis pulmonalibus, quæ majorem sanguinis copiam, & majore cum velocitate, ad alia non obstructa determinat; plethora ab intermissis consuetis evacuationibus, accedente insuper ira, vehementi motu, cibo potu calefaciente, vel tussi vehemente; nimii infecibus extrudendis nifus; gelu corporis superficiem vasaque externa constringens; ac

in altissimis regionibus nimis levis; mensium vel hæmorrhoidum suppressio.

4. Causa proxima est ruptura vasorum pulmonalium, præcedente spasmo universali.

5. Antecedit horripilatio, lassitudo, pedum refrigeratio, anxietas, spirandi angustia, dolor gravativus undulatorius circa diaphragma, flatus in abdomine, & dolor dorsi. Tandem calidus erumpit sanguis cum titillatione & pruritu in aspera arteria. Hæc symptomata arguunt spasmum totius corporis ante rupturam.

6. Non comitantur hæc symptomata eruptionem sanguinis e gingivis vel faucibus; ergo distinguunt hæmoptoem ab hisce eruptionibus.

7. Hæmoptoe inter omnes hæmorrhagias periculosissima est. Variat egregie periculum in hoc morbo secundum causas inducentes, habitum, ætatem, vasaque rupta. Periculosior enim est ubi oritur a vasis debilibus, scirrhis, vel polypo, quam ab ipsis fluidis, vel evacuationibus intermissis; in corpore debili & laxo, quam in vegeto; in senes quam in juvene; a ruptura vasorum magnorum, quam minimorum. Nisi intra triduum compescitur fluxus sanguinis, vix servari potest. Summe periculosus est quando sanguis extravasatus non totus ejicitur; putrescit enim, corrumpit vicina, tabemque in-



fert. Facillime revertitur, & sæpe recidivus summum secum adfert periculum. Si cum ulcere pulmonum conjungitur, actum est de ægro.

8. In medela, 1. Sanguis a pulmonibus avocandus. 2. Ejus orgasmus temperandus. 3. Spasmi consopendi. 4. Vasa agglutinanda.

Sanguis avertitur a pulmonibus, 1. Venæsectione. 2. Leni alvi subductione, 3. Clysmatibus. 4. Ligaturis extremitatum.

Ejus orgasmus temperandus, 1. Aqua frigida. 2. Nitro, acidis vegetabilibus & mineralibus. 3. Opiatis.

Spasmi consopiant, 1. Pediluviiis. 2. Opiatis, & sem. hyoscyami.

Vasa agglutinantur, 1. Medicamentis oleosis, incrassantibus, & agglutinantibus, videl. bals. capyvi, locatelli, &c. 2. Diæta tenui lactea. 3. Summa corporis animique quiete & silentio; evitato vino, motu, venere, nimia caliditate cubiculi vel stragulorum, & cibis acrioribus.

9. Ex dictis, causa & curatio hæmorrhagarum omnium elucescit. Hæmorrhagia narium petit præcipue adolescentes, & sæpe salutaris criticaque est; solvit enim plethoram, vertiginem, dolores, &c. & suppressa, sævissimos inducit morbos. Si vehemens fit, sistenda iisdem remediis, & externis applicationibus, videl. aqua frigida; aceto fronti, occipiti, & internis naribus,

& corporibus perquam frigidis nuchi applicatis.

10. Ex eadem causa, sed præcipue obstructione lienis, oritur vomitus cruentus a vasis ventriculi disruptis. Huic antecedit dolor punctorius & tensivus in sinistro hypochondrio; & cum irruptione junguntur anxietas, constrictio in latere, & lipothymia. Curatur iisdem remediis, & opiatís parciore dosi administratis; oleosis, ob relaxantem suam naturam, omnino evitatis.

11. De hæmorrhagiis per anum vel per uterum consulantur hæmorrhoides, & menstruorum vel lochiorum fluxus nimius.

## S E C T. I I.

### *Asthma.*

1. **A**STHMA est impedita & laboriosa respiratio, haud sine metu suffocationis.

2. Aliud atque aliud nomen, videl. dyspnœam, asthma, orthopnœam habet, prout se intendit morbus.

3. Est, 1. Vel periodicum, vel continuum. 2. Vel humidum, vel siccum. 3. Genuinum vel spurium: oriri enim potest a calculo vesicæ felleæ, a tumoribus diaphragmatis, hepatis, ventriculi; a pectoris vel pericar-

dii hydropes ; a polypo aliisque causis. De priore solummodo agendum.

4. Elapsa juventute , homines , præcipue obesos , adoritur. Magis æstate vel autumno quam hieme grassatur.

5. Causæ hujus morbi remotæ sunt , aer cœnoscus , vel particulis noxiis impregnatus ; tonitru ; animi pathemata magna ; variolæ , scorbutus , intermittens , catarrhus ; ulcera antiqua cicatrizzata , vel evacuationes solitæ , per hæmorrhoides vel fontanellas , repressæ ; evacuatio critica erysipelatis , vel podagræ , percussa ; œdematosus pedum tumor repulsus ; vulnera diaphragmati inflicta ; labes hæreditaria.

6. Causæ proximæ sunt , 1. Obstructio bronchiorum & vesicularum , humoribus crassis , vel tuberculis induratis. 2. Irritatio nervorum respirationi inservientium ; & hinc spasmodica fibrarum annulos cartilagineos bronchiorum neccentium contractio. Primam docet mortuorum inspectio , & contemplatio causarum remotarum. Secundam demonstrat asthma , apoplecticos & hystericos paroxysmos , scorbutum , evacuationem acrem repulsam , sequens ; sectio nervi diaphragmatici , vel compressio nervorum in occipite hunc morbum inducens ; cadavera aperta ubi omnia viscera sana ; libera & æqualis respiratio ante paroxysmum.

7. Ita sese habet paroxysmus. Primo , ven-



trculus, sensu coarctationis præcedente, distenditur, & ructus copiose emittit. Sequitur calor, febris, stupor, capitis dolor, nausea, urina pallida. Pulmones rigescunt, spiritus turbantur, membra torpent, pectus plus solito gravatur, difficile spirat, raucescit. Nocte omnia augentur symptomata. A thorace coarctato, respiratio lenta. Recta cervice spiritum trahit, & egregie elevat humeros. Vomitus bilis flavæ. Pejus in lecto, melius in aere frigido, sese habet. Lachrymæ involuntariæ; pulsus parvus, debilis, intermittens; cordis tremor; faciei nigredo & fere suffocatio. Remittente coarctatione, phlegma viscidum, vel dulce, vel salsum, vel putridum, filamentis nigris discriminatum, expuitur. Urina nunc colorata sedimentum habet. Cessante paroxysmo, cessat sputus.

In veterato morbo, tument manus & pedes; febris, præcipue nocturno tempore, infestat; facies livescit. Incidit vel in hydropem, vel consumptionem, vel inflammationem pulmonum, vel lethargum, vel paralysem.

8. Ab orgasmo in sanguine & nervis, actio ventriculi perturbatur, flatusque gignitur. Ab eodem, febris, calor, &c. Sensatio rigescentiæ gravitatisque in pulmonibus, a sanguine ibi accumulato. Ab impletis vel contractis vesiculis, respiratio difficilis & stidor. Respiratio lenta, ob aerem

impeditum. Recta cervice spirat, ut eo facilius descendat diaphragma. Humeri eleventur, ut vi majore agant muscoli scapulares. Calor lecti auget symptomata. Faciei nigredo & suffocatio provenit a transitu sanguinis per pulmones impedito. Ab actione pulmonum læsa, hydrops.

9. Diagnofis patet.

10. Prognofis prosperior in juventute, quam senectute; in asthma ab evacuationibus repressis, quam ab aliis causis orto. Quo frequentior & severior accessio, eo pejus. Asthma, in peripneumoniam mutatum, lethale. Dyspnœa sine incommodo diu durat: orthopnœa senes subito strangulat. Periculosa tremula spiratio, pulsus intermittens vel deficiens, brachiorum paralyfis, syncope, cordis palpitatio, urina pauca. Ad extrema ventum esse, testantur spiritus parvus, tardus, & frigus; itemque pulsus ex tardo factus nimis creber & debilis.

11. In asthma humido scopus est, attenuare & evacuare materiam viscidam, novæque generationem impedire. Attenuatio perficitur, 1. Medicamentis attenuantibus. 2. Liquoribus diluentibus. Evacuatio, 1. Vomitoriis. Novæ materiæ generatio impeditur, 1. Purgantibus lenioribus vel diureticis. 2. Fontanellis & vesicatoriis. 3. Cortice Peruviano. 4. Diætæ mucilaginosæ evitatione.

In asthma convulsivo scopus est, organum spirituum compescere. Perficitur, 1. Constrictionem minuendo clysmatibus, thoracisque fomentationibus. 2. Humores divertendo ad alia loca, frictione, vel fomentatione pedum. 3. Spasmodum compescendo opiatibus. 4. Antispasmodicis. In sanguinolentis, si sæviant symptomata, phlebotomia levamen præsentaneum adfert. Ad flatulentiam profunt clysmata spiritum digerentia. Fugato paroxysmo, irritabilitati occurrit. cort. Peruvianus.

12. In utrisque conveniunt situs erectus; diæta tenuis parcaque, evitatis flatulentis; aer serenus; thorax haud constrictus.

13. Si e repulsa evacuatione ortum ducat asthma, expugnandum est diaphoreticis & evacuatione iterum restituta. Si a noxiis particulis, inviscantibus & veneno contrariis.

14. An profunt mercurialia in asthma humido?

### S E C T. I I I.

*Imbecillitas vel resolutio ventriculi & intesti-  
norum.*

1. **E**ST morbus, quem imbecillitatem primarum viarum nominare licet, qui sedentarios & litteris deditos quam maxime infestat; &, quamvis frequentissimus, at-



tamen tantum non prætermiffus, & adhuc fere innominatus.

2. Hunc inducunt vita fedentaria; acriora purgantia nimis frequenter ufurpata; mœror; nimia ciborum repletio; diætâ ex alimentis leguminofis & flatulentis; nimix evacuationes, præcipue fanguinis; & morbi prægreffi, quales dysenteria, abortus, intermittens, & fpafmi primarum viarum, difpofitio hæreditaria.

3. An caufa proxima eft motus periftalticus primarum viarum debilitatus, vel nonnunquam impeditus, & inordinatæ frequentefque duodeni, ipfiusque ventriculi, fpafticæ constrictiones? Huic fidem faciunt caufæ evidentes, fymptomata, medela, & fectiones cadaverum.

4. Adfunt anxietates; præcordiorum diftentiones; flatus generatio & incarceratio; fenfatio faucium constrictoria & molefta; lateris vel fterni dolor; cardialgia; ructus acidi; summæ aciditates; inteftinorum; præcipue vacuo ventriculo, erosiones & dolores; venter nonnunquam conftipatus, nonnunquam folutus; feces virides; appetitus sæpe auctus; pulfus debilis, parvus, & tardus; frequens, fed imbecillis, penis erectio; animi marcor; vertigo; palpitatio; aurium tinnitus; infomnium; macies.

5. Cibus, qui ex vegetabilibus præcipue componitur, ob defectum motus periftaltici,

quietem agens , & calore fatus , in acidam ruit fermentationem ; hinc flatus , saliumque acidorum generatio , quæ præcedentia excitant symptomata. Faucium laterisque dolor oritur a consensu cum partibus affectis , inventu octavi paris & intercostalis.

6. Prudens medicus vix spondeat consummatam medelam hujus morbi ; quia difficillime curatur , & facillime , ob levissimos diætæ errores , recurrit. In nullo versatur discrimine æger quamvis emaciatus , si obligaré se legibus vult.

7. Obviam itur , 1. Evacuando primas vias vomitu florum chamæmeli decoctione elicitō ; & parvis dosibus tinct. rh. amar. 2. Corroborando has partes medicamentis calefacientibus amaris , cort. Peruviano , & aquis chalybeatis. 3. Equitatione continua , quæ , repetitis succussionibus in partes affectas sese præcipue exerens , præstantissimam operam pollicetur. 4. Diætæ ex cibis putrescentibus , non acescentibus ; uti carne , caseo corrupto , &c. 5. Potu ex aqua , vino Maderensi , vel spir. vini Gallici cum aqua diluit ; evitatis omnibus cerevisiæ , excepto *Porter* , speciebus.

8. Prodest perfundi aqua frigida , atque in ea natare , canalibusque ejusdem subjicere etiam stomachum ipsum & id quod contra stomachum est ; in aere quam maxime sicco & temperato degere ; extremitates fricare ;

plerumque in motu esse ; & cibos , qui potius difficulter concoquuntur , quam facile vitiantur , assumere. Ergo plerique , qui nihil aliud concoquere possunt , bubulam concoquunt. Utilis est magna salis marini cum cibus copia.

9. Inimicæ sunt omnes evacuationes , præcipue emetica & cathartica repetita ; diætæ ex vegetabilibus ; infusio theæ nimis calida vel diluta ; nimia vini vel cibi ingurgitatio ; abstinentia ; lac ejusque cremor ; butyrum , præcipue insulsum ; omnia pingua ; opus piscitorum ; acida , acidæve potiones , qualis illa *Punch* dicta ; & pathemata subita.

10. Si cibus non continetur , valent ad comprimendum stomachum cucurbitulæ duobus digitis infra stomachum admotæ ; spongia ex aceto ; cataplasma calefaciens , vel lana succida sicca extrinsecus imposita , & calefacientibus particulis referta ; cibus , semper quam minima copia semel , sed debitis intervallis , repetitus , interposito nonnunquam aliquo minus utili , sed magis grato. Vinum meracum , austerum , frigidum ; equitatio lenis ; aquæ chalybeatæ , & animus tranquillus.

11. Si coacuit intus cibus , profunt , præter ante dicta , pulveres absorbentes antacidi , post peractam digestionem , assumpti.

12. Si vero pituita sola stomachus impletur , leniora adsunt symptomata , videl. appe-



titus deletus, inflatio, vertigo, lipothymia, febris erratica, nausea, vomitus. Convenit per viam superiorem, qua primum expelli potest, ejicere; equitatione, aliove exercitationis genere, quo superior pars movetur, concuti; præcordia bene vestita habere; vinum rubrum neque effuse, neque timide bibere; stomachum tinct. rh. amar. cort. Peruv. & chalybeatis roborare; & poculum satis amplum, ter quaterve die, digestionem peracta, ex aq. calcis haurire, qua nihil omnia glutinosa potentius dissolvit.

13. Illud quoque in omnibus stomachi vitiis præcipiendum est, ut, quo modo se quisque æger refecerit, eodem sanus utatur. Nam redit huic imbecillitas sua, nisi iisdem defenditur secunda valetudo, quibus reddita est.

## SECT. IV.

### *Hæmorrhoides.*

1. **H**ÆMORRHOIDES distinguuntur, 1. In apertas & clausas. 2. In exteriores & interiores; posteriores digito explorantur.

2. Causa est obstructio, inflammatio, & tumor vasorum hæmorrhoidalium ab alvo dura, purgantibus fortioribus, vel critica quadam evacuatione.

3. In ano apparet tumor parvus, cum dolore & calore qui debitam adeptus magnitudinem vel resolvitur, vel indurefcit, vel fuppuratur. In pofteriori crifi parum puris fanguinei fortitur, & gradatim exarefcunt hæmorrhoides.

4. Quando prægreffa fuit valetudo, quando habitus malus, vel ftatus corporis febrilis, quando fanguinis profluvio imbecilliores non fiunt, in his parum tuto fupprimitur; habent enim crifim, non morbum. Suppreffa autem incaute hac evacuatione, fubiti & graviffimi morbi fuperveniunt, inclinata in præcordia & viscera materia. Hæmorroides antiquæ, vel irritatæ, in fiftulam ani nonnunquam degenerant.

5. Si cui vero eæ nocent, fupprimuntur;  
1. Venæfectione, vel fanguifugis capitulis earum applicatis. 2. Salibus purgantibus. 3. Flore fulphuris interne fumpto. 4. Fomentationibus & cataplafmatibus difcutientibus. 5. Unguentis repellentibus. 6. Orificium in fuppuratione apertum confervando; evitatis calefacientibus, motu magno, & equitatione.

## S E C T. V.

### *Icterus.*

1. **I**CTERUS, feu morbus regius, feu arcquat<sup>us</sup> feu fuffufio bilis, eft color tunicae

albugineæ cutisque , præter naturam , flavus vel nigricans.

2. Distinguitur , 1. In icterum flavum & icterum nigrum ; posterior a priore gradu solummodo differt. 2. Continuum & periodicum. 3. Idiopathicum & symptomaticum. 4. Criticum & symptomaticum. 5. Icterum cum febre & sine febre.

3. Causæ remotæ sunt colica hysterica ; colica biliosa ; venena , uti morsus viperæ , vel canis rabidi , staphis agria ; cathartica drastica ; tristitia & ira ; ossificatio vel compressio ductuum biliosorum a tumoribus extra vel intra existentibus ; graviditas ; meconium non rite purgatum ; jecoris obstructio , scirrhus , vel abscessus ; febres , præcipue intermittens , nimis cito a cortice Peruviano suppressæ ; calculi ductum cysticum obturantes.

4. Causa hujus morbi est , 1. Bilis jam separatæ regurgitatio & absorptio. Injections a ductu hepatico vel vesica fellea ad venam cavam retrogressæ , externæ compressiones , internæque obstructions ductuum biliosorum , huic fidem faciunt. 2. Bilis non secretæ aucta copia , visciditas , vel acrimonia. Probabilis redditur ab ictero morsu viperæ subito inducto ; scirrhotate hepatis ; statu hepatis sano post mortem , nullaue in vesica fellea inventa bile ; equorum , qui cysti destruantur , ictero ; & icterico symptomate in fe-



febris, ubi feces alvinæ bilis secretionem non obstructam demonstrant.

5. Adsunt pigrities; lassitudo; color oculorum, cutisque flavescens; alvus obstructa; appetitus imminutus; feces alvinæ albæ; urina crassa sedimentum deponens & lintea-menta flavedine tingens; saliva amara & flavo colore tincta; respiratio difficillis; strictura, gravitas, tensio, & dolor hypochondrii dextri; vomitus; pruritus in cute; sudatio difficilis; pulsus nonnunquam citatus; singultus; & morbo retrocedente, diarrhœa.

6. A cursu bilis impedito oritur alvus obstructa, feces albæ, plethora & pigrities. A regurgitatione, absorptione, vel redundantia bilis, cutis humoresque secreti bilioso colore & amaritudine saturati. A vesica fellea turgida & irritata, gravitas, singultus & vomitus. A bili acri infra cutem stabulante, pruritus, sudorisque difficultas. A bile, ob remoram magis acri, iterumque in intestina delabente, diarrhœa.

7. Diagnofis elucescit flavo oculorum, cutis, & urinæ colore, albisque excrementis.

8. Prognofis est magis fausta in juventute, quam senectute; in robustis, quam debilitatis; in flavescentibus, quam nigrescentibus; in ictero solitatio, quam aliis morbis impato. Icterus febribus, præsertim ultimis die-

bus, superveniens, criseos munere fungitur; sed inflammationem hepatis, ventriculi vel duodeni subsequens, ægrum in acriore discrimine esse ostendit. Sudor naturalis optimum præbet signum. Icterus hydropem comitatus incurabilis merito habetur.

9. Promovetur bilis secretio, 1. Venæsectione, si adsit plethorica constitutio. 2. Vomitu sæpe repetito. 3. Rheo parvis dosibus continue assumpto. 4. Aperientibus, sed præcipue sapone, per os assumpto, vel in anum injecto, & aquis chalybeatis sub finem morbi. 5. Fomentationibus & cataplasmatibus hypochondrio dextro assidue applicatis. 6. Attentione ad causas remotas, videl. calculos, spasmos, venena, febres, &c. quæ suis remediis finiendæ. 7. Diæta & potu acescente, exercitio, fricatione, & ludis.

## S E C T. V I.

### *Calculus cysticus.*

1. **H**unc morbum, quamvis frequentem, antiqui medici ignorabant. Sæculo decimo sexto, anatomiam scientiam persequenti, calculi cystici primo innotuerunt; & symptomata longo intervallo postea descripta fuere.

2. Causæ prædisponentes sunt ætas senilis, sexus foemineus, vita sedentaria, po-

tus ex spir. vini, alimenta crassa & sicca, lithiasis, & prodagra.

3. Calculi distinguuntur in magnos & parvos; in friabiles vel duros; in scabros vel incrustatos; in ovaes vel angulosos; in cineritios, flavescentes, vel nigros; in inflammabiles & non inflammabiles.

4. Calculi solidioris texturæ & saturationis coloris, nec in aqua, nec in spir. vini rectificatissimo, nec in aqua calcis, nec in sapone aqua soluto, dissolvuntur. Ol. tart. p. d. vim solventem possidere videtur. Instar candelæ fragrant, perexigua terrestri materia relicta: ergo non tam ex salina, quam ex oleosa & inflammabili, cum terrestri bilis parte ob quietem & spissitudinem conjuncta, coacta, motuque partium vicinarum compressa, componuntur. Calculus recens muco abundat; ideoque in aqua fervente solvitur, & vix flammam concipit.

5. Calculi in vesica fellea remanentes nunquam sese produnt obtuso partis dolore & pondere. In ductu cystico vel communi cholidocho hærentes, sequentia excitant symptomata. Subitus, profundus, acutus, excrucians dolor in dextra stomachi parte, usque ad dorsum penetrans, cum remissionibus & exacerbationibus; nausea vel vomitus; flatus & tensio hypochondrii; alvus astricta, cum albis excrementis; pulsus imbecillior, sed vix citior, nisi in doloribus exquisitis & perdu-



rantibus; a firu erecto & decubitu in sinistro latere molestia; dyspnœa, cardialgia; inquietudo & anxietas; animi defectio; convulsiones; urina primo pallida, dein flava; color icteritius cutis & oculorum. Tandem, sedato subito dolore, sequitur nonnunquam diarrhœa, calculi per anum rejiciuntur, symptomataque icteritia gradatim evanescunt.

Morbus sæpe revertens cachexiam, tabem, icterum fere continuum, & hydropem, inducit.

6. A sensibilitate ductus, consensu nervorum intercostalium, cum multis aliis, & bile obstructa, omnia hæc proveniunt symptomata.

7. Distinguitur ab inflammatione hepatis, ventriculi, vel intestinorum, symptomatum exacerbatione & remissione, icteritio colore, calculisque per anum rejectis: a spasmodicis, qui nervoso habitu cognoscuntur.

8. Raro, nisi in summa ductuum inflammatione & in prægnantibus, periculosus. Natura sæpe multum, medicina parum, in dissolvendis calculis, profuit; ideoque perfectam medelam vix spondeat medicus; sæpe enim per intervalla morbus revertitur, & per totam vitam ægrum fatigat.

9. In paroxysmo intentio est, ductum laxare & calculum detrudere.

Ductus laxatur, i. Sanguinis missione in

habitu plethorico, & statu febrili. 2. Decoctis & jusculis lubricantibus & oleosis intus hauriendis. 3. Cataplasmatibus, fotibus, & semicupio, externe applicandis. 4. Anodynis, in summo dolore. 5. Clysmatibus relaxantibus oleosis.

Calculus detruditur, 1. Motum intestinorum vermicularem lenioribus purgantibus accelerando. 2. Frictione in hypochondrio dextro & in dorso adversus partem affectam. 3. Vomitu & exercitio, modo absit acutus dolor. Extra paroxysmum calculi solvendi, & ulterior genesis prohibenda.

Solutio tentanda; 1. Leni & repetito vomitu, qui molliores calculosas concrectiones sæpe comminuit & deturbavit. 2. Medicamentis huic scopo dicatis, sed parum efficacibus, uti sero lactis, succo graminis, sapone Veneto, decoct. rad. 5. aperient. pareir. brav. rub. tinctor.

Uterior genesis impeditur, 1. Medicamentis aperientibus salinis. 2. Aquis mineralibus ferrugineis, quæ sanguinem nimis densum attenuant. 3. Motu corporis, præcipue equitatione.

## S E C T. V I I.

*Diabetes.*

1. **D**iabetes est nimia urinæ, plerumque suavis, profusio, cum magna siti.

2. Distinguitur inutiliter in veram & spuriam. Vera appellatur, quando potus immutatus secernitur: spuria, quando adest humorum colliquatio. Sed melius propter usum,

2. In originariam & symptomaticam. Nonnunquam hæcticæ febris, sed præcipue hysterici mali comes est.

3. Causæ proximæ sunt antecedentes morbi febriles, præcipue si immodicis evacuationibus fugantur; morsus serpentis dipsadis, acidularum aquarum usus nimis longus, præcipue in frigida tempestate; medicamenta diuretica.

4. Neque oritur hic morbus a calida renum intemperie; neque a sale sanguinem coagulante; neque a salibus, ob sanguinem spiritibus fermentatis repletum, retentis; neque a constrictione cuticulari; neque a vitia-  
ta bilis mixtura. Causa proxima videtur esse nimia glandularum renalium urinam secernentium laxitas, & serum acre attenuatumque: prior patet a causis remotis, analogia aliarum evacuationum auctarum, medela, & cadaverum inspectione: posterior a spasmis, eruptionibus inflammatoriis, & ulceribus



malignis quæ diabetem comitantur.

5. In diabete adsunt urinæ fluxus insolitus ; fitis intolerabilis , os ficcum ; salivæ spumosæ expuitio crebra ; calor viscerum ; urina limpida , suavis , bene olens , potumque æquans vel exsuperans ; febris hæctica ; intumescencia lumborum , testium & pedum ; tabes ; mors.

6. Os ficcum , saliva spumosa & fitis , a sanguine liquidissima sua parte spoliato. Sapor urinæ , a particulis chylofis permixtis. Copia urinæ potum excedens , a liquefacto sanguine , aliisque humoribus , & aeris humiditate in corpus attracta. Febris hæctica , ab acrimonia humorum. Tumor lumborum , testium vel pedum , a solidis labefactatis.

7. Copia urinæ aucta designat diabetem , & voluntaria emissio distinguit ab incontinentia urinæ.

8. Recens facile , antiquus difficile curatur. In bibacibus & senibus nunquam fere medelæ auscultat.

9. Renum laxitas tollenda , & humores acres attenuatique corrigendi. Perficitur, 1. Corroborantibus & adstringentibus. 2. Incrassantibus & mucilaginosus. 3. Aqua calcis. 4. Aqua Bristolienfi. 5. Diæta ex solidis potius quam liquidis , gelatinis , oryza , fago , salep , piscibusque testaceis ; aere sicco & calido ; lecto duro , & exercitio leni quotidie usurpato.

6. Empl. defensivo lumbis applicato; vel, quod melius respondet, cingulo lato lumbis & abdomini arcte circumducto.

## SECT. VIII.

### *Incontinentia urinæ.*

1. **I**ncontinentia urinæ est excretio urinæ involuntaria ortum ducens a sphinctere vesicæ relaxato ob paralyfim, contusionem, longam in balneo frigido remoram, puerperium, partum difficilem, ætatem infantilem vel senilem, febresque. Tollitur adstringentibus, corroborantibus medicamentis, & nervinis unguentis pubi & perinæo externe applicatis.

## SECT. IX.

### *Lithiasis seu calculus renum & vesicæ.*

1. **I**thiasis est dolor acutissimus renum, ureterum, vel vesicæ, a calculo vel arenulis ibi impactis.

2. Distinguitur, 1. A loco affecto, in calculum renum & calculum vesicæ. 2. A calculo ipso, qui vel scaber, vel levis; cineritius, ruber, vel fuscus; friabilis, vel durus.

3. Causæ remotæ sunt diæta lauta & con-

coctu difficilis; vita sedentaria; ætas senilis; rheumatismus & arthritis; situs horizonti parallelus; vinum tartaro scatens; aqua terrestri & sabulosa materia repleta; sanguinis diathesis lapidosa; labes hæreditaria.

4. Calculus neque viscidæ pituitæ, neque fermentationi salium oppositorum, neque materiæ coagulanti, neque putrefactioni, neque salibus urinæ tartareis, originem debet. Oritur enim a sabulosis & terrestribus sanguinis particulis in tubis uriniferis hærentibus, sese attrahentibus, & primo sub specie mucii, dein lapidis, ope glutinosæ materiæ, adjunctis.

5. Dissectiones, renes ulceratos, & aliquando omnino corruptos, calculosque in eorum substantia inhærentes, demonstrant.

6. Calculus, præcipue vesiçæ, constat plerumque ex nucleo & crustis veltunicis concentricis.

7. Chymice tractatus sese resolvit in aerem, phlegma, salem volatilem urinosum, oleum, & caput mortuum. Pars dimidia ex aere constat; quarta ex materia terrestri; quarta, quæ remanet, ex oleo, phlegmate, & sale componitur. Tantum abest a salina compositione instar tartari vini.

8. Signa calculi renalis sunt dolor acutissimus, vel gravativus in lumbis; calor; nausea; vomitus; alvi constipatio; symptomatum exacerbatio post cibum; urina sabulosa,



& sæpe sanguinea vel purulenta ; ischuria ; coma ; inflammatio ; ulceratio ; tabes. Sæpius patitur sinister ren quam dexter.

Quando decidit in ureteres calculus , exacerbantur egregie dolores , & deorsum ad vesicam tendunt ; stupet crus ; retrahuntur testiculi ; & urina ex parte supprimitur.

Calculus vesicæ stipatur difficili & dolorifico mictu , cum continuo ad urinam deponendam desiderio ; tensione & dolore coli ; titillatione continua in glande ; tenesmo ; diarrhœa ; urina mucosa ; convulsivis in meiando motibus ; urina sanguine tincta post equitationem , cum augmento doloris in vesica , urethra , & glande.

9. Vomitus a consensu nervorum stomachi & renis oritur. Post pastum exacerbantur symptomata ob distentionem ventriculi & intestinorum. Vasis anguloso lapide læsis , sanguis & pus cum urina effluit. A viis urinæ obturatis , vel renis inflammatione , ischuria. Calculus , per ureteres descendens , nervos lumbares comprimit vel irritat , & stuporem cruris , testiculique retractionem producit.

Irritatio & pressio calculi contra sphincterem vesicæ , stranguriæ & tensionis coli ; sympathia nervorum ejusdem membranæ per urethram continuatæ , glandulave lymphatica supra frænum obstructa , titillationis glandis ; contiguitas intestini recti , tenesmi

& diarrhœæ ; abrasio mucî vesicæ & ulcera , urinæ mucosæ causæ sunt.

10. Calculus renum dignoscitur | a lumbagine , vomitu , & urina sabulosa ; a colica , quia dolores altius tendunt , & rugitus exauditur in posteriore ; a passione hysterica renes adorientes , quia hæc a clysmatibus exacerbatur.

Calculus vesicæ exploratur cathetere , vel digito in anum immisso : hisce , ergo , operationibus , titillatione glandis , & a febre immunitate , satis distinguitur a stranguria.

11. In calculo renum summum adest periculum ob inflammationes , ulcerationes , & suppressiones urinæ , quæ sæpe comitantur. Facilius dissolvitur in adultis , quam pueris. Res desperata est , si ulcera in renibus fiunt. Retentio urinæ per aliquot dies , frigus extremitatum , & convulsiones , mortem instantem denunciant. Calculus vesicæ facilius solvitur vel extrahitur quam renum.

12. Alia est cura paroxysmi , alia extra paroxysmum. Paroxysmus sedatur minuendo inflammationem & tollendo spasmos, 1. Venæsectione. 2. Clysmatibus emollientibus terebinthinatis. 3. Decoctionibus emollientibus , oleosis. 4. Balneis tepidis. 5. Opiatis. 6. Quiete.

Extra paroxysmum , morbus aggrediendus est , 1. Lithontripticis per os assumptis , vel in vesicam injectis , quales sunt , sapo His-

panus, lixivium saponis, testes animalium calcinati, aqua calcis, porra, cæpæ, celeri, quorum vires lithontripticæ experimentis confirmantur. Summa quies, & venter neque adstrictus neque solutus, tunc convenit.

2. Diæta eupepta haud acescente, potu viscoso ex cerevisia vel rad. alth. & aqua levi pura, lecto duriusculo & altiore versus caput quam pedes.

13. Si calculus vesicæ hisce remediis non cedit, lithotomia in auxilium vocanda.

14. Ad mictum sanguineum, aqua calcis, omisso sapone, est optimum remedium. Convenit quoque emulsio Arabica & manna ad alvum laxam servandam.

15. Arenulæ optime tolluntur aquis chalybeatis, diureticis; & illis præcipue, quæ sale alkalinum continent.





## P A R S Q U A R T A.

*De morbis genitalium & uteri.*

## S E C T. I.

*De his morbis in genere.*

**P**ROXIMA sunt ea vitia, quæ ad partes obscœnas præcipue pertinent. Ut ut difficilis hæc explanatio simul & pudorem, & artis præcepta servantibus, attamen quam maxime necessaria; quia in cæteris vitiis singuli, in his genus humanum pessundatur.

## S E C T. I I.

*Morbus venereus.*

1. **H**Aud definiri potest morbus venereus sine symptomatum enumeratione. Confertæ scriptorum turbæ palmam arripuit Astruc, cujus vestigia meo pressi pede.

2. Non in Europa innotuit ante 1493. Quia, 1. Neque a medicis, neque historicis, neque poeticis scriptoribus, ante hoc tempus describitur. 2. Non est lepra antiquorum. 3. Primi scriptores consentiunt quod morbus antea inauditus fuit.

3. Non in Italia, certis causis concurrentibus, germinabat; neque a regionibus Afri-

cæ; sed ab Hispaniola cum Columbo ad-  
vectus, bello Neapolitano se primo mani-  
festabat.

4. Initio atrociter sæviebat. Procedente tempore, variationes symptomatum magnas expertus est. Nunc longe mitior, sed adhuc viget, semperque vigebit, dum homines vario fruuntur concubitu: quamquam plerisque vanæ spes exitus oblectant.

5. Morbus semper ab infecto vel infecta provenit. Oritur, 1. Labe hæreditaria. 2. Contactu. Hic diversis methodis perficitur, tactu partis ulceratæ cum parte ulcerata, basiatione, lactatione, coitu.

6. Virus venereum est venenum sui generis, vasa obstruens, corrodens, omniaque liquida contaminans.

7. Semper fere sese primo manifestat in parte tacta.

8. Præcipuam in adipe & membrana cellulosa sedem habet, sed non unicam, ut ex glandulis obstructis patet.

9. Corpus penetrat, 1. Per cutem immediate erosam. 2. Per vasa absorbentia, quæ vel in venas lymphaticas valvulosas, vel in sanguineas terminantur.

10. Vires sunt, in ratione, 1. Copiæ viri venerei. 2. Qualitatis ejusdem. 3. Temporis in contactu elapsi. 4. Temperiei propriæ. Hinc patet ratio, quare, aliis intactis, alii inficiuntur; quare in aliis progressum celer-

rimum, in aliis lentum facit; quare aliquando in corpore latet per longum tempus.

11. In medicina prophylactica, nulla adhuc cognoscuntur interna remedia. Externa ablutio cum melle, aceto, urina vel spir. vini, prodest.

12. Distinctio in duo stadia perquam necessaria est. Quando non adhuc se miscuit sanguini, morbus venereus localis; quando sanguis inquinatus, tunc lues venerea confirmata appellatur. Methodus medendi in his toto cœlo differt. Prior morbus primo, posterior postea tractandus.

13. Quia tam varia symptomata morbus venereus localis habet, videl. Gonorrhœam virulentam; tumores testium; stranguriam; bubones; gonorrhœam non virulentam; ulcuscula; tumores præputii & balani; tubercula; verrucas, &c.; hæc omnia, uti morbi diversi, tractanda sunt.

### *Gonorrhœa virulenta.*

1. Causa proxima est virus venereum, per vasa absorbentia, præcipue lymphatica, assumptum, & in urethra depositum. Rejicitur ascensus per urethram, vel assumptio in sanguinem, & in has partes cum semine depositio.

2. Nulla inter gonorrhœas virulentas dif-



tinctio, nisi in gradu symptomatum, vel diversitate partium affectarum.

3. Separat se morbus in tria stadia, incrementis inflammationis, decrementis inflammationis, exarescentiæ.

4. In hominibus, quartum circiter diem post infectionem oritur haud ingrata titillatio in glande. Conspicitur in urethræ ore paululum saniei tenuis. Orificium tumet, rubet, hiat, inter meiendum caloris sensus cum punctura miti. Postea dolor pungens percipitur instar puncturæ acuum. Pus magis viscidum in majore copia exit. Totus rigescit penis, præcipue urethra, quæ usque ad vesicæ collum, uti funis, tenditur. Augetur in dies inflammatio. Dolor & ardor in urina reddenda intolerabilis, præcipue sub finem. Pus devenit vel flavum vel viride, cum striis sanguineis sæpe mistum. Per noctem somnum rumpit frequenter erectio involuntaria dolorifica, cum pene deorsum incurvato. Tument aliquando externe glandulæ Cowperianæ; aliquando in perinæo abscessus. Sequitur sæpe stranguria, tumor testium vel glandularum inguinalium. Lumbi dolent. Per septimanam unam vel alteram durat.

Tandem mitescunt omnia symptomata. Urina minus urit. Magis albicans & æquabile fit pus. In erectionibus non curvatur neque tantum dolet penis. Urethra emollitur. Hic status secundus.

In-

Inflammatione sedata, nullus in urina red-  
denda dolor. Pus album, æquabile, visci-  
dum, instar fili ductilis, sensim minuitur;  
donec, ejectis prius materiæ tenacis globu-  
lis separatis, in totum exarescit. Hic tertius  
morbi status.

Accidunt fœminis similia symptomata,  
diversa partium structura nonnullas variatio-  
nes efficiente. Incipit cum sensu pruriginis,  
in vulva, & insolito madore. Inflamman-  
tument, calent, dolent muliebria: neque  
coitum cum viro tolerare possunt. Urina urit,  
sed non tantum quantum in viris, pus viru-  
lentum, raro sanguinolentum. Tandem inflam-  
matio minuitur. Pus album & tenax fluere  
desinit.

5. Vix rite describitur hujus morbi sedes  
in hominibus. Incipit inflammatio & prove-  
nit primo pus ab ulcere in urethræ glandu-  
la juxta frænum sita. Probat, 1. Quia  
ibi in initio sentitur titillatio & in mei-  
endo dolor. 2. Quando inflammatio parva est,  
incipiente vel desinente morbo, digitorum  
compressione exterius vel specillo interius,  
ibi sentitur ulcus. 3. Quia injectionibus haud  
longius penetrantibus curatur gonorrhœa,  
vel sistitur puris fluxus. 4. Quia sedes gonor-  
rhœæ non virulentæ, gonorrhœam virulentam  
sequentis, ibi est. 5. Si a partibus vulgo cre-  
ditis profluebat pus in plurimis corporis po-  
sitionibus ad vesicam refluere debet, ergo

modo libere exiret, modo sisteretur; quod non fit.

Si inflammatio adfit parva, ibi sistitur. Sin magna, abhinc urethra, glandulæ Cowperianæ, prostaticæ, vesiculæ seminales inflammantur, ulcerantur. Docet dissectio cadaverum.

In foeminis, glandulæ vaginæ & urethræ afficiuntur. Visu & dissectione cognoscitur.

6. A viro venereo urethram ulcerante oriuntur omnia hæc symptomata. Penis curvatur ab irritato & contrahente fræno. Lumborum dolor a nervorum consensu.

7. Diagnofis facilis hujus vitii ab ulcerato rene vel vesica; quia in hisce pus non nisi cum urina sortitur. Facilis, quoque a gonorrhœa nimio labore inducta, quia tunc nullus dolor, nulla dysuria, nullave malignitas. In foeminis, diagnofis difficilis a fluore albo: sævius tamen ingruit gonorrhœa; & si ulcera in pudendis sint, certissima gonorrhœæ signa habentur.

8. Morbus levior in foeminis attamen curatu difficilior. Quo citius apparet, quo major inflammatio, quo plures partes afficiuntur, quo atrociora symptomata, eo pejor. Quo magis album minusque discoloratum pus, quo minor ardor urinæ, eo melior. Si intra scrotum suppuratio fit, periculosæ res aleæ est.



9. Totis viribus laborandum in primo stadio, ut inflammatio sedetur. Perficitur, 1. Venæsectione. 2. Antiphlogisticis. 3. Leni alvi subductione. 4. Fomentationibus & vapore calidæ aquæ. 5. Cataplasmatibus. 6. Injectionibus emollientibus.

Sedata parum inflammatione, in secundo stadio scopus est, ut pus deveniat album & glutinosum. Perficitur mercurialibus, quorum præcipua vis ad hunc finem spectat: haud inutilis tamen in priore stadio. Quo propius ulceri applicentur, eo melius; ergo injectio mercurialis, applicatio ung. mercurial. ad glandem & raphe penis, summæ utilitatis sunt.

Per duos hos status victus debet esse tenuissimus. Calefacientia, uti vinum, condimenta, exercitium, nisi in debili corporis statu, nocent.

Tertius status requirit incarnationem & cicatrizationem; quæ perficiuntur, 1. Balsamis terebinthiacis. 2. Adstringentibus. 3. Aquis ferrugineis. 4. Aqua calcis. 5. Balneo frigido. 6. Injectionibus exsiccantibus. 7. Victu paulo liberiore, sed eupepto 8. Abstinentiâ a coitu, immo ab ideis venereis per totum tempus.

10. Ardor urinæ mitigatur demulcentibus, & camphora; curvatura, pene deorsum ligato. Abscessus perinæi curatur quamprimum aperiendo.

11. Alia decantatur medendi methodus per injectiones leniter causticas & adstringentes, statim usurpatas; sed quia successus nunc secundus, nunc adversus, a medico sanitatem famamque molienti devitandæ sunt.

12. Nimiam purgationem sæpe sequitur feminis profluvium ante coitum, aut alvi dejectionem, vel nimis frequenter in somno emissum, quod debilitatem & marcorem inducit. Provenit a sphinctere vesicularum feminalium nimis laxato vel eroso. Curatur iisdem remediis, ac tertius gonorrhœæ status.

13. Alia est gonorrhœæ species perperam sicca appellata. Dysuria sentitur urens, & magna urethræ inflammatio, cum callo vel paucissimo saniei fluxu. Sæpe stranguria comitatur. Pro causa agnoscit inflammationem quæ non vergit in suppurationem, sed resolvitur. Curatur methodis in primo gonorrhœæ stadio præscriptis.

14. Quare fortiora purgantia symptomata augent?

### *Tumor testium venereus.*

1. Causa est inflammatio urethræ in gonorrhœa, per vasa deferentia ob nimium exercitium, calefacientia, injectiones adstringentes, vel cathartica fortiora, testibus com-

municata. Rejicitur suppressio feminis virulenti.

2. Primo sistitur paululum fluxus puris veneriei. Dolor lancinans sentitur in testibus. Indurescit chorda spermatica. Tumere incipit epididymis, dein testis, cum febre. Increfcit testis in magnam molem cum exquisito dolore, calore & ponderis sensu. Rubet & tenditur scrotum. Si resolvitur, redit fluxus gonorrhœæ; gradatim detumescit testis; sed sæpe epididymis durities supereft. Si non resolvitur, abit in suppurationem, vel scirrhum, vel gangrænam.

3. A communicata inflammatione facile deducuntur hæc symptomata.

4. Diagnofis patet inter venereum & simplicem tumorem testium a causis antecedentibus.

5. Prognofis prospera, quando gonorrhœa iterum fluere incipit. Facilius resolvitur tumor a gonorrhœa quam a lue venerea ortum ducens. Semper incerta, quando inflammatio magna. Mala, si dolor cessat sine tumoris diminutione.

6. Curatur, 1. Venæfectione. 2. Fomentationibus. 3. Cataplasmatibus. 4. Fascia suspensoria. 5. Purgantibus lenioribus. 6. Mercurialibus interne sumptis, & externe applicatis. 7. Vomitu ex turpeth. minerali. 8. Diæta tenuissima, quiete, & decubitu horizontali.



Ad remanentem duritiem discutiendam, empl. mercurialia, fumigatio, balnea Akæ sudantia conducunt. Hæc conveniunt omnibus tumoribus venereis induratis.

Si ad suppurationem vergat, aperiatur quamprimum. Si cancro vel gangræna corripitur, abscindatur.

*Stranguria venerea.*

1. Distinctio necessaria est inter inflammatoriam & habitualement stranguariam. Priore jam-jam inter morbos febriles tractata, nunc ad posteriorem veniam.

2. Stranguria habitualis oritur, 1. Ab urethra cicatricibus constricta. 2. Ab excrescentiis induratis. 3. A tumefactis prostaticis & glandulis Cowperianis.

3. Urina profluit tenui rivo, sæpius interrupto, & aliquando bifido. Longum tempus ad vesicam exonerandam requiritur. Aliquando adest stimulus ad urinam reddendam, aliquando nullus.

4. Succurritur, 1. Urethram inflammando, ulcerando. 2. Turunda mercuriali. 3. Specillo plumbeo. 4. Apertura urethræ ad locum affectum & obicis extirpatione. 5. Si in prostaticis sedes hæret, medicamentis in duritie testis jam præscriptis.

*Bubo venereus.*

1. Errant scriptores qui bubones inter primæ luis venereæ signa collocant. Sanguine infecto vel non infecto oriri possunt. Posteriores solummodo hic tractantur.

2. Distinctio, 1. Est quando dextrum vel sinistrum inguen, vel ambo tument. 2. Quando inflammatorius vel scirrhydæus est.

3. Oritur a viro venereo per vasa lymphatica assumpto, & glandulas inguinales obstruente.

4. Sentitur in inguine dolor cum parva duritie. Crescit donec elevetur cutis & rubeat. Pars acute dolet & calet. Incessus difficilis. Bubo ad fastigium elevatur, pulsatur, purpurescit. Tandem, cessantibus symptomatibus, pus formatum effluit, cavitas nova carne repletur, & cutis superinducitur.

Sed quando indurescit cum nullo vel minimo dolore & calore, & in eodem statu remanet, tunc scirrhydæus devenit. Vel mobilis vel immobilis est. Procedente tempore, aliquando mutatur in carcinoma.

5. Diagnofis facilis, inter hos & bubones pestilentes aut scorbuticos, symptomatibus venereis antecedentibus. Ab hernia inguinali facile distinguitur his signis: hernia, si premitur digito, facile cedit, sed cito restituitur; bubo venereus vel non cedit vel reti-

net vestigium ; prior tota mollis , posterior solummodo superne ; hæc sua propria symptomata habet , illa sua. Diagnofis difficillima inter bubones locales & bubones a fanguine infecto procedentes , quando hujus symptomata non adhuc apparent : priores femper gonorrhœam vel cancro immediate antecedentes vel confociantes habent ; posteriores fine caufa manifefta oriuntur. Anteaâta vita iudicium adjuvat.

6. Prognofis in bubone inflammatorio femper faufta. Si cito difpareat , fanguis inficitur. Semper incerta in bubone fcirrroidæo ; quando dolere incipit , mala. In carcinomate , fi non inhæret vafis inguinalibus , prognofis dubia ; quando hæret , incurabilis.

7. In primis diebus , quando magnitudinem vix æquat nucis caftaneæ , tuto refolvi poteft ; fed fi hanc fuperat , vel celeriter tumet , ad fuppurationem perducî debet. Refolutio perficitur , 1. Venæfectione. 2. Purgantibus. 3. Mercurialibus intus fumptis & ad locum applicatis. 4. Diæta tenui. Suppuratio perficitur , 1. Emplaftiris maturantibus. 2. Cataplafmatibus fuppurantibus. 3. Diæta larga nutriente. Nulla venæfectio neque purgatio in hoc ftatu adminiftranda eft.

Suppurato omnino bubone , educatur pus per magnam aperturam , 1. Scalpello. 2. Cauftrico.



Nihil amplius restat, quam ut ulcus depuratum carne repleatur. Si minus recte procedit, mercurio intus sumpto ulcus corrigitur. Victus nunc tenuis.

8. Hæc, buboni venereo locali, ubicunque loci est, conveniunt.

9. An bubo localis sese monstrare possit sine prægressis symptomatibus venereis?

*Gonorrhœa non virulenta, Anglicè, Gleet.*

1. Est ulcus parvum, callosum, haud venereum, ab ulcere gonorrhœæ in ipso glandulæ emissario remanens, eandemque sedem habens. Probatur, 1. Quia in illam degenerat gonorrhœa. 2. Quia in glande prope frænum sentitur aliquando punctura. 3. Quia injectio-nibus irritantibus dolor ibi sentitur, pus magna copia provenit, calet ibi urina & gonorrhœa quasi virulenta excitatur. 4. Specillo exploratorio vel digitis comprimentibus patet. Ergo nunquam a sola ductuum excretoriorum laxitate, vel prostaticis, aut vesiculis feminalibus, provenire potest.

2. Producitur, a nimis & fortioribus purgantibus, repetitis diu & durantibus gonorrhœis, corpore vel febre vel salivatione aliisque causis debilitato. His ulceris vasa relaxantur & cicatrizatio impeditur.

3. Ex urethra continuo fluit paulum saniei tenuis, aquosæ, pellucidæ, præcipue post

pastum vel nimium exercitium. Filamenta puris crassioris in urina natant. Plus calidis tempestatibus quam frigidis exit. Punctura nonnunquam in glande sentitur.

4. Diagnofis inter hanc & feminis profluvium facilis ; illa femper fluit, hoc non nifi certis temporibus.

5. Prognofis profperior in recenti quam antiqua. Sed femper incerta medela ; reftat enim adhuc opprobrium medicorum.

6. Succurritur, 1. Medicamentis adstringentibus internis. 2. Fluxum aliter divertentibus. 3. Cantharidibus interne fumptis. 4. Aquis mineralibus ferrugineis. 5. Injectionibus digerentibus, vel urethram rodentibus. 6. Injectionibus ftypticis. 7. Balneo frigido marino. 8. Victu reficiente, fed non calefaciente ; & abftinentia a venere, poculis, nimio cibo, & faltatione.

7. Viribus reftauratis, & inquietis ob morbum cogitationibus oblivioni traditis, incipit jam tempus ipfum eſſe præſidio.

*Ulcuſcula venerea, Anglicè, Chankers.*

1. Cauſa eſt virus venereum acrius & ſubtilius vaſa ipſa erodens, vel glandulas ſebaceas obſtruens & inflammans.

2. Primo apparet macula rubra, quæ elevatur in papulam miliarem, calentem, prurientem. Senſim albefeit apex, & mutatur

in pus flavum viscidum. Dehiscit, & fit ulcus inflammatum, undequaque serpens. Albo & calloso margine plerumque cingitur. Tandem longe lateque pascitur, & vicina corrumpit.

3. A viro venereo inflammante, corrodente, oriuntur hæc symptomata.

4. Diagnōsis ab excoriatione glandis facilis; inter ulcuscula localia & a lue venerea producta, difficilis. Si maligna, citoque sua stadia decurrunt, si frænum vel carunculas mirtiformes occupant, ad priora verisimiliter pertinent: sed si valde benigna, cito abeunt iterumque repullulant, suspicio adest sanguinis infecti.

5. Prognōsis melior, quando aquosum latitem, quam quando viscidam materiam continent. Si recens neque magna inflammatio, prospera; si antiquum, incerta.

6. Curatur, 1. Venæsectione. 2. Fomentationibus & cataplasmatibus emollientibus. 3. Mercurialibus. 4. Purgantibus. 5. Ung. mercuriali fortissimo, vel causticis mercurialibus ulceri applicatis. 6. Pene sursum suspenso. 7. Victu tenuissimo.

7. Hæc ad omnia ulcuscula localia, ubicunque sita sunt, conveniunt.



*Tumor præputii & glandis.*

1. Tumores præputii & glandis distinguuntur, 1. In inflammatorios, œdematodeos, & scirrhoideos. 2. In phimosis & paraphimosis.

2. Causa proxima est virus venereum ulcusculorum obstruens vasa sanguinea vel serosa. Annumeranda quoque est callositatum compressio.

3. Causæ remotæ sunt frigus peni admissum, caustica irritantia, sordis venereæ remora, exercitium, pocula nimia, calefactientia.

4. Ab ulcusculis inflammatis incipit præputii glandisque inflammatio, rubedo, calor, dolor, tumor. Febris comitatur. Coarctatur urethra, difficilis exit urina, & dolorem excitat. Præputii vel glandis marginem obsident crystallinæ, aquosum laticem continentes. Similia symptomata accidunt fœminis. Terminatur vel resolutione, vel scirrho, vel gangræna.

5. Si, vulneratis leviter partibus, rutilus erumpit sanguis, omnia salva sunt. Mitior œdematodeus, periculosior inflammatorius, contumax scirrhoideus. Si crystallinæ appareant, gravis; si gangræna, gravior; sed si radices penis vel ostium vaginæ corripuit, gravissima prognosis.

6. In tumore inflammatorio & œdematodeo, indicatio est obstructionsolvere

& gangrænam præcavere. Perficitur, 1. Venæsectione larga. 2. Purgantibus. 3. Mercurialibus. 4. Pene sursum suspenso. 5. Fomentationibus & cataplasmatibus. 6. Injectionibus emollientibus inter præputium & glandem injectis. 7. Partes ung. mercur. illinendo. 8. Scarificatione vel incisione præputii. 9. Parco victu ; potu diluente ; quiete ; irritantium & causticorum evitacione ; fordis venereæ ablutione.

*Tubercula callosa.*

1. Distinctio, 1. A locis affectis. 2. A diversis eorum speciebus.

2. Oriuntur a vasis minimis & glandulis viro venereo affectis.

3. Si, sanatis venereis ulcusculis, superest callositas, phyma ; si instar funis, chorda appellatur. Aliquando sine ulcere prægressio germinant in pene, vulva, ano, mammis, verrucosæ substantiæ. Si longæ, pori ; si breviores, verrucæ ; si minus adhuc elevatæ latæquæ, condylomata ; si fimbriatæ cristæ nominantur. Excrecentiæ quoque variæ fiunt in ano. Si a cute pendula, tumefacta, cristæ ; si a tenui pediculo, mora ; ex ultimis maximæ, fici vel mariscæ nuncupantur. Si in sulcis ani fissuræ oriuntur, pus separantes, rhagadum nomen gerunt. Omnia hæc in cancrum degenerare possunt.

4. Diagnofis inter localia & a lue venerea orta, petenda a frequenti repullulatione, cæterisque fymptomatibus.

5. Prognofis in ftatu fcirrofa, proſpera. Si calere, dolere, lancinare incipiunt, incerta.

6. Phymata & chordæ tractari debent methodis in fcirrho præſcriptis. Cætera tubercula curantur, 1. Amputatione. 2. Cauſticis. Rhagades, emollientibus, detergentibus, cicatrizantibus.

*Lues venerea confirmata.*

1. Diſtinctio, 1. A locis affectis. 2. Ab aliis morbis complicatis.

2. Oritur a viro venereo per vaſa ſanguinea, ſeroſa, lymphatica, intus aſſumpto, & omnes humores, præſertim mukum glandularum, adipemque inquinante. Cauſis propriis concurrentibus ad propria loca sæpe determinatur.

3. Cauſæ remotæ ſunt omnia quæ ulcera virulenta localia inflammant & exſiccant, ſi ſint externe vel interne applicata; repulſio bubonum ſine mercurio adhibito. Ergo egregie errant, qui luem a gonorrhœa nunquam productam, affirmant.

4. Recrudescunt omnia præter gonorrhœam ſymptomata localia, uti ulcuſcula in pudendis, tumores teſtium, bubones, tubercula penis & ani.



Palatum, fauces, membrana Sneideriana infestantur inflammationibus, ulceribusque, cum albo & calloso margine. Hinc deglutitio impeditur, ossa carie eroduntur, raucitas sequitur, anima foetet, & nasus ipse corrui.

Quando corpus in lecto incaluit, tunc oriuntur per totum corpus dolores atrocissimi, lancinantes, dilacerantes, sed præcipue in medio tibiæ, humerique; aurora appropinquante, desinunt vel mitescunt. Aliquando tumor & suppuratio in locis dolentibus, aliquando nulla evenit.

Cutis deturpatur maculis latis, rotundis, ficcis, flavescentibus vel purpureis, ab omnibus aliis distinguendis. Circa frontem & tempora & pilorum radices confertim hærent pustulæ scabiosæ, quibus nomen corona veneris. In volis manuum plantisque pedum apparent fissuræ ichorem separantes. In cute per totum corpus oriuntur inflammationes & ulcera, in latitudine serpentina, musculos denudantia; pus viride flavum instar sevi splendens separantia, cum orificiis parvis, complanatis, pallidis.

Glandulæ diversæ infarciuntur, indurantur, tument in variis locis. Hæ, secundum varios duritiei gradus, varia sortiuntur nomina. A tendinibus, nervis, ligamentis, oriuntur nodi, ganglia, tophi.

Ab ossibus elewantur exostoses, acutissime

dolentes, modo duræ, modo molles, & in suppurationem tendentes. Ossa ipsa carie tentantur, & ulcera ibi fœtida maligna producuntur. Medulla corrumpitur, graveolens acrisque devenit, & excitat gravissimos dolores. Capita ossium intumescunt cum dolore; inde anchylosis. Ossa nonnunquam fragilia ad minimum ictum, nonnunquam mollia instar feri, deveniunt.

Palpebræ inflammantur, ulcerantur, oculi cœcantur suffusione, ductus lachrymalis clauditur, & fistula producitur. In aurium penetrantibus inflammatio, abscessus, caries fit. Tympanum eroditur & pus defluit; inde tinnitus, murmur, surditas.

Functiones animales afficiuntur; corripitur æger œphalalgia, hæmicrania, vertigine, epilepsia, spasmis, tremoribus, paralyfi. Vitales functiones labem sentiunt; oritur dyspnoea, asthma, hæmoptoe, tussis, phthisis, palpitatio cordis, syncope, intermissio pulsus. Labefactantur quoque naturales functiones; appetitus nullus, digestio prostrata, affectiones hypochondriacæ, hydrops, obstructiones, diarrhœa superveniunt.

Effœto corpore, pallet facies, adoritur febris hectica colliquativa, ulceribus graveolentibus tabescit, tandemque post summos excruciatu, lenta & miserrima morte perit.

Fœminæ sua propria symptomata habent, videl. scirrhus, ulcera, cancos in mammis & ute-

utero ; fluxum nimium vel suppressionem mēstruorum ; abortum , fœtusque rubentes sine cuticula.

6. A viro venereo cum sanguine misto facile deducuntur hæc symptomata. A glandulis in pudendis & ano infarctis , proveniunt ulcuscula & tubercula. A mucosis faucium & nasi glandulis obstructis , ulcera hæc loca depascentia. Vel ab acri viro venereo irritante musculos & periosteum , vel exostofi incipienti , vel a medulla corrupta , dolores venerei , a calore dilatante humores ; incrementum , & a perspiratione aucta ; lenimen dolorum. A glandulis cutis sebaceis , pustulæ ; ab adipe infra cutem infecta , ulcera. A materia ossea effusa & medulla corrupta , morbi ossium. A lymphæ & semine inspissato , tumores glandularum & testium. Ab humoribus & glandulis oculorum , morbi ocularii. A tubo Eustachiano , ulceribus faucium infecto , morbi aurium. Ab omnibus humoribus depravatis acribusque , & obstructionibus variis , læsæ functiones animales , vitales , naturales.

7. Diagnosıs difficilis ob similitudinem symptomatum cum aliis morbis , vel ob dissimulationem ægri. Signa quædam certa , quædam dubia. Priora sunt , quando inficit alios , vel generat fœtus lue infectos ; quando morbi venerei locales apparent sine coitu ; quando cutis maculis , vel pustulis



scabiosis, vel ulceribus antea descriptis deturpatur. Facillime cognoscuntur a scorbuticis ulcera faucium venerea, propter cavitatem & colorem cineritium; ab angina suppurata, prægressis signis & diurnitate. Exostosis, si non a fractura vel ictu externo provenit, certissimum præbet signum. Hyperostosis venerea facile distinguitur a rachitico, podagrico & strumoso vitio, præcedentibus horum symptomatibus. Cariem multa inducunt; sed quando neque externa, neque scorbutica, neque strumosa, neque rachitica causa patet, tunc caries venerea censenda. Fragilitas ossis diagnosim certam præbet.

Posteriora signa. A glandulis tumefactis & doloribus nocturnis, cautum iudicium. Affectiones oculorum, aurium, capitis, pulmonum, incertam efficiunt diagnosim. A prægresso corporis statu iudicium quoque dirigitur; si præcefferint tubercula venerea, ulcuscula maligna, tumores præputii glandisque, vel subita bubonis magni resolutio sine mercurio.

8. Prognosis melior in recentioribus, quam vetustioribus; in adultis, quam in senibus, vel infantibus; in fœminis, dummodo fluunt menstrua, quam in viris; in antiphlogistico sanguinis statu, quam in inflammatorio; in sanis, quam morbosis. Quo pejora secum symptomata adfert, & partes ad vitam ma-

gis necessarias adoritur, eo gravius morbi periculum. Si exostosis interna vel caries in cranio oriatur; si tubercula vel vomicae fiant in pulmonibus; si cancer in utero formetur; si medulla ossium corrumpatur, in angusto spes est. Si cum strumis, vel scorbuto, vel phthisi coit, medela difficilis. Quædam symptomata medicamentis vix cedunt, uti dolores venerei, pustulæ magnæ corrosivæ, testes vel glandulæ tumefactæ, caries.

9. Mos olim fuit morbum lign. guajaci, rad. chinæ & sarsaparillæ fugare; sed mutata viri venerei natura, huic operi per se nunc imparia sunt. Hodie præ omnibus merito habetur mercurius.

10. Medula perficitur vel sine salivatione, vel cum salivatione. In priore methodo mercurius ad emunctoria corporis dirigitur medicamentis huic scopo interservientibus, 1. Ad intestina, purgantibus. 2. Ad renes, diureticis. 3. Ad cutem, sudorificis, balneis & fontanellis. Has evacuationes optime promovet solutio mercur. sublim. corrosiv. in cancro jamjam memorata: sed non adhuc experimentis satis comprobantur ejus vires. Requirit hæc methodus aerem tepidum, serenum, æstivum; cautelam frigore; dietam tenuissimam, respectum ad partes præcipue affectas; & perseverantiam post totalem symptomatum recessum. Sæpe fallit hæc metho-

duſ; ergo vix eligenda, niſi ubi hydrargeroſis periculofa.

11. Salivatio nunc cenſetur tutiſſima, expeditiſſima & ſæpe jucundiſſima via. Non convenit in epilepſia, in phthiſi pulmonali, in gravidis, in ſenibus infantibuſque, in emaciatſis, vel aliquo morbo febrili chronico, præcipue diarrhœa, correptis, antequam fugantur vel mitigantur. Ut diſtincte tractetur, in tria ſtadia, excitationis, continuationis, & deſinentiæ, dividi debet.

12. Stadium primum. 1. In noſtra regione tempus autumnale, vernali; vernale, æſtivo cedit. Hibernum frigus evitandum. 2. In plethoricis ſemper, in macilentis vel hydropicis nunquam venæſectio inſtituenda. 3. Lenis purgatio adhibenda. 4. Diluentibus potionibus & balneis tepidis relaxanda & implenda vaſa. 5. Induſiſis lanæ mollis corpus veſtiendum. 6. Tunc mercurius lente in vaſa ingrendus. Externa applicatio juncturis forma unguenti optime reſpondet.

Stadium ſecundum. 1. Ptyaliſmus in ſuc- cidis excitandus eſt ad ſex libras, in macilentis ad quatuor ſpatio viginti quatuor horarum. 2. Pulſus nunquam aſſurgere debet ultra centum pulſationes ſpatio unius minuti; aliter vera febris ſymptomata ſuperveniunt. 3. Calor cubiculi optime verſatur circa 70. gr. thermometri Farenheitiani. 4. Per diem noctemque talis ſitus eligatur, qui exitum ſali-



væ patefacit. 5. Potus largus, diæta tenuissima, humectans convenit: evitatis pinguibus, oleosis, calefacientibus. 6. In hoc statu sustineatur ptyalismus donec dispareant omnia luis symptomata quæ fugat mercurius.

Stadium tertium. 1. Sua propria porta exeat mercurius. 2. Purgatio una vel altera lenis præscribenda. 3. Victus magis nutriens, sed eupeptus, permittendus. 4. Cautè admodum ad aerem externum redeundum. 5. Exercitium & rusticatio sanitatem confirmant.

13. Mercurius secum adfert sua incommoda & pericula.

In primo stadio, 1. Si mercurio non excitatur ptyalismus, vomitu ex turpeth. mitter. promovetur. Sed non instandum, repugnante natura; quia sine salivatione suum opus sæpe perficit. 2. Accidit aliquando a nimia festinatione vel frigore concepto, quod facies & labia tument, lingua magnopere tumefacta extrorsum prominet, & febris sequitur. Non vacat periculo hic status. Ergo immediate venæsectione larga, purgantibus, vapore fomentationum ad loca affecta applicato, sudorificis, indusiorum mercurialium detractio, vis mercurii minui debet. 3. Si morbus febrilis adoritur ægrum, inunctio sistenda. 4. Si diarrhœa supervenit, vomitu & opiatis repetitis curatur.

In stadio secundo, 1. Si accidit sputum sanguinis, post debitam venæsectionem, pectoralia & adstringentia administranda, mercuriique vis retundenda, vel omnino coercenda. 2. Si ptyalismus ob aliquam causam urgentem immediate sisti debet, flore sulphuris gradatim assumpto optime perficitur. 3. Si epilepsia supervenit, venæsectione, vomitu & cautela in mercurio administrando opus est. 4. Si menses nimium fluunt, mercurius inhibendus & adstringentia præscribenda. 5. Ad inflammationem oris, continua cum decoctionibus emollientibus ablutio. 6. Si Alvus nimium constipata, lenissimo aperiente solvitur.

In tertio stadio, 1. Ad ulcera profunda & hæmorrhagias oris, adstringentia. 2. Ad coalescentiam linguæ cum partibus vicinis, dissociatio. 3. Ad constrictionem maxillæ inferioris, vix ullum invenitur remedium.

14. Remanent aliqua symptomata post ptyalismum. 1. Ulcera faucium, quæ curantur gargarismatibus stypticis. 2. Ad ulcera contumacia in cute, fonticuli & ung. detergentia. 3. Dolores rheumatici tolluntur decoctionibus lignorum, frictione ad locum & thermis. 4. Caries ossis scalpro excindi vel actuali cauterio inuri debet. 5. Exostosis, si non cedit ung. mercuriali fortissimo, abscindenda. 6. Ulcus uteri curatur purgantibus, & injectionibus detergentibus. 7. Ad corpus vi

mercurii fractum, amara cum cortice Peruviano. 8. Depressus nasus fulcitur, septo arte facto.

15. Quare tam varia habet symptomata, & tam varios imitatur morbos lues venerea?

### S E C T. I I I.

#### *De mensibus.*

1. **M**enses circiter annum decimum quartum vel quintum apparent, & circiter annum quadagesimum nonum sistuntur, habita ratione ad regimen, victum, temperiemque.

2. Sex, septem, vel decem unciaë sanguinis boni & rutili plerumque secernuntur. In fluxus duratione magna quoque variatio.

3. In prægnantibus, præsertim post tertium mensem, & lactantibus, haud fluunt menses.

4. Ab arteriis uteri vaginæque evanescentibus prodeunt menses.

5. An plethora, præcipue ipsius uteri, ortum habens a perspiratione muliebri parca, peculiari hujus visceris compage, & vasis facile distensilibus, causa sit proxima fluxus muliebris? Huic opinioni favent pondus corporis per multos annos idem remanens, vires



profluvio sanguinis non diminutæ, symptomaticæ.

6. Adfunt horrores; lassitudo; in lumbis æstus, dolor, & pondus; febricula; cephalalgia; appetitus prostratus; oculorum hebetudo.

7. Ob laxam & facile dilatabilem uteri compagem, ob sanguinis perpendicularem altitudinem, ob venas uteri valvulis carentes, facilius per has quam per alias elabitur sanguis superfluous, & ibi generat æstum, dolorem & pondus.

8. Quare bruta animalia, fimia excepta, menses non patiuntur? Quare non æque respondet phlebotomia, ac fluxus sanguinis per uterum? Quare mensibus incipientibus, turgent mammæ? An solennis secretio in hominibus observetur?

## SECT. IV.

### *Obstructio vel suppressio mensium.*

1. **S**I, longioribus intervallis & minus copiose quam par est, fluant menses, tunc obstrui, si non omnino fluant, tunc suppressi dicuntur.

2. Causæ remotæ sunt subitum frigus; ingesta viscida & acida; tristitia & metus; morbi prægressi; evacuationes nimix; medicamenta adstringentia.

3. Causæ proximæ sunt, 1. Nimia vasorum uterinorum rigiditas, 2. Uteri compressio a tumoribus vicinis. 3. Uteri coalescentia.

4. Humorum lentor.

4. Adfunt dolor & æstus lumborum, coxarumque; arteriarum pulsatio, cephalalgia; appetitus prostratus; languor; horrores; febricula lenta; urina crassa & rubra; inflammatio, supuratio, vel gangræna uteri; varices, tumores crurum; ventris inflammationes; vomitus; anxietas; tussis; dyspnœa; tabes; cordis palpitatio; syncope; vertigo; apoplexia; insania; chlorosis; pica; fluor albus; hæmorrhagiæ variæ.

5. A sanguine menstruo, qui evacuari solebat, uterum infarciendo, & per nervorum sympathiam universum corpus turbante, rite fluunt hæc symptomata.

6. Diagnosîs hujus mali in initio a gravitate difficilis; petitur a fœdo colore, symptomatibus post tertium mensem non recedentibus, & nullo motu in utero percepto.

7. Prognosis variat secundum symptomata, tempus suppressionis, ætatem, causasque.

8. In nimia vasorum rigiditate indicatio est, 1. Fibras uterinas relaxare fomentationibus, balneis tepidis, & inunctionibus emollientibus: Vel, 2. Momentum sanguinis intendere cardiacis.

In humorum lentore indicatio est particulas cohærentes disjungere, & momentum

fluidorum augere. Perficitur , 1. Sanguinis missione a vena saphœna , si adsit plethora. 2. Cucurbitulis. 3. Frictionibus crurum. 4. Catharsi forti. 5. Vomitu. 6. Emmenagogis.

Diæta eupepta & nutriens, motus corporis, & aer ad caliditatem vergens, conveniunt.

9. Immerito ab hoc vitio distinguitur chlorosis seu febris virginum pallida ; idem enim est morbus.

## SECT. V.

### *Nimia mensum profusio.*

1. **N**imia est profusio, quando exinde debilitatur fœmina. Accidit sæpe circa annum quadragesimum quintum.

2. Causæ remotæ sunt nimia salacitas ; morbi febriles ; ebrietas ; immodicum exercitium ; sternutatio ; saltatio ; vomitus ; animi pathemata ; passiones hystericæ ; evacuationes repressæ ; emmenagoga ; pessorum acrium usus ; morbi uteri , quales sunt scirrhi , canceri vel polypi.

3. Causæ proximæ sunt , 1. Sanguis nimis rarefactus , tenuis & acris. 2. Vasa nimis debilia.

4. Adsunt color fœdus ; debilitas ; appetitus prostratus ; anxietas ; syncope ; extremorum frigus ; convulsio ; suffocatio ; feбри-



les ardores ; tumores œdematosi ; hydrops ; cachexia ; fluor albus ; atrophia.

5. Hisce symptomatibus originem præbet hæmorrhagia.

6. Prognosis infausta , quando supervenit convulsio ; vel quando oritur ab insanabili uteri morbo.

7. In sanguine nimis rarefacto , tenui vel acri , scopus est , 1. Revellere venæsectione in brachio , si vires adhuc integræ ; vel cucurbitulis. 2. Condensare & demulcere medicamentis coagulantibus & demulcentibus , inter quæ eminet spit. vitriol. cum adstringentibus.

In vasorum debilitate scopus est elasticitatem restituere adstringentibus interne & externe applicatis.

Conveniunt aer ficcus & ad frigidum vergens ; cibus & potus nutriens , refrigerans , & exsiccans ; animus a pathematibus vacuus ; abstinentia a venere ; & in decubitu caput depresso , cruraque elevata.

## SECT. VI.

### *Fluor albus.*

1. **F**luor albus est excretio continua humoris albi , subrubri , vel viridis , nunc mitis , nunc acris , ab utero.

2. Fœminæ præsertim laxioris habitus ,

ab anno quarto decimo huic malo maxime obnoxia. Quandoque infantibus accidit.

3. Distinctiones solummodo petuntur a colore, qualitate, copia & tempore fluxus.

4. Sedes hujus mali est in glandulis, lacunis mucosis, & arteriis minimis in cavitate uteri vaginæque dehiscentibus.

5. Causæ remotæ sunt aer humidus; dieta nimis tenax; otium; metastasis humorum: usus thermarum nimius; fluxus mensium immodicus; abortus vel partus difficilis; venus effrænata; obstructio mensium; lapsus inopinati, & luxationes lumborum.

6. Causæ proximæ sunt, 1. Serosa colluvies. 2. Laxa uteri compages.

7. Adfunt continuus vel interruptus fluxus humorum; appetitus prostratus; pica; respiratio difficilis; palpebrarum tumor; febris hectica; lumborum dolor; urina turbida; tristitia; aqua intercus; ulcerationes leves uteri vaginæque; palpitatio; syncope.

8. A nimia copia & fluxu feri oriuntur hæc symptomata.

9. Distinguitur a mensibus decoloribus, quia hi periodum servant; ab ulcere uteri, symptomatibus suppurationem præcedentibus; a gonorrhœa, quia in adfunt genitalium phlogosis, ulcera, & humor secernitur a lacunis prope clitoridem.

10. Fluor albus impregnationem difficilem & abortum facilem reddit. Quo morbus re-

centior & magis albicans humor, eo melior; quo antiquior & magis viridis vel fuscus, eo pejor prognosis. Quando dolores acuti, cancer metuendus.

II. Ad medelam perficiendam requiritur, 1. Ut humorum vitium corrigatur, & fluxus ad uterum impediatur. 2. Ut tonus uteri restituitur.

Humorum vitium corrigitur & feri fluxus ad uterum impeditur, 1. Laxantibus amaris. 2. Diaphoreticis. 3. Fontanellis. 4. Aq. calcis.

Tonus uteri restituitur exsiccantibus, roborantibus & adstringentibus, interne & externe applicatis.

Si humor acris vel foetidus, alternantia mercurialia præmittenda. Diæta sit exsiccans & eupepta, aer siccus, a venere & animi pathematibus abstinencia, exercitium lene.

## SECT. VII.

*Furor uterinus, et satyriasis vel priapismus.*

1. **F**Uror uterinus est furiosus & insatiabilis veneris appetitus cum mania conjuncta.

2. Causæ remotæ sunt mensium obstructio; ebrietas; cibi calefacientes; cogitationes & historiæ venereæ; nimius emmenagogorum calidorum usus; cantharides; stimulantia utero applicata.



3. Causæ proximæ sunt , 1. Acrimonia humorum a clitori , vagina , vel utero separatorum. 2. Partium genitalium nimia tensitas & inflammatio.

4. Fœmina primo tristis & taciturna fit ; erubescit , pulsusque mutatur de rebus venereis facta mentione. Postea mania correpta in risus & fletus conjicitur , de venere palam loquitur , & obvios ad copulam sollicitat.

5. Hilaritas , audita de amore fabula , distinguit furorem uterinum incipientem , a melancholia vera.

6. Prognosis fausta , quando rerum venerarum mentio non amplius eas afficit.

7. Ad medelam perficiendam phlogosis partium tollenda & acrimonia humorum mitiganda.

Phlogosis tollitur , 1. Venæsectione larga & sæpe repetita. 2. Purgantibus refrigerantibus & clysmatibus emollientibus. 3. Balneis , fomentationibus , injectionibus utero applicatis. 4. Antiphlogisticis , videl. nitro & emuls. Arabic.

Acrimonia mitigatur , 1. Demulcentibus. 2. Narcoticis.

Diæta parca & refrigerans , aer frigidiusculus , modicum exercitium , evitatis cogitationibus & historiis libidinosiis , conveniunt.

8. An coitus permittendus ?

9. Satyriasis vel priapismus virorum eas-

dem causas agnoscit, & eodem modo curatur.

## SECT. VIII.

### *Impotentia vel sterilitas virilis.*

1. **O** Ritur, 1. A feminis inopia vel vitio.  
2. A resolutione pudendorum. 3. Ab impedita feminis ejaculatione.

2. Imminuitur vel vitiatur semen ob præ-  
vum victum; inediam; corpulentiam; me-  
dicamenta refrigerantia, vel feminis genera-  
tioni inimica; veneris abusus; nimiam cas-  
tatem; virus venereum; tumores testium;  
senium.

3. Resolutio pudendorum inducitur a con-  
tusionibus; casu supra os sacrum; applicatio-  
nibus emollientibus; urethræ ulcere; pudore;  
terrore; capitis læsionibus.

4. Ejaculatio feminis impeditur a lapidibus  
vel tumoribus emissaria vesicularum seminalium  
occludentibus; perforatione obliqua; incur-  
vato pene.

5. Seminis vitium vel inopia cognoscitur  
a nullo ad venerem stimulo, nimia ejus te-  
nuitate & parva copia in copula emissâ: re-  
solutio genitalium a læsione præcedente, &  
feminis emissionem sine erectione: impeditus  
feminis egressus a stimulo ad venerem non  
imminuto.

6. Medela causis accommodanda. Desi-

cientia vel vitium seminis refarcitur, 1. Restaurantibus, quæ succum galatinosum præbent. 2. Diæta nutriente præcipue ex avibus sylvestribus; evitatis evacuationibus, ebrietate, acidis tristitiaque. 3. Sedula attentione ad causas, videl. corpulentiam, tumores testium, vel virus venereum.

Resolutio genitalium tollitur, 1. Stimulantibus interne sumptis & externe peni applicatis. 2. Roborantibus, inter quæ eminet balneum frigidum. 3. Diæta calefaciente, exsiccante.

Obstacula seminis egressum impediuntia artem chirurgicam postulant.

## SECT. I X.

### *Sterilitas muliebris.*

1. **U**BI foemina maturæ ætatis non concepit post multiplices cum viro coitus, sterilis dicitur. Ergo in veram & relativam merito distingui debet.

2. Oritur, 1. A semine haud in uterum penetrante ob os coalitum, vel tumoribus occlusum; situm obliquum; vel voluptatem e coitu nimis languidam. 2. A semine non retento, vel non absorpto, ob orificium uteri laxum, diversos fluxus vel hæmorrhagias uterinas, densitatem vel scirrhositatem matricis, vel internam ejus superficiem viscida ma-



materia repletam. 3. Ab ovarii & tubarum Fallopianarum vitiis serosis, hydropicis, multisque aliis quæ supponi possunt. 4. A pravis humorum uterinorum qualitatibus ob nimium calorem uteri, fluxum album acrem, vel ulcera uteri. Quædam medicamenta conceptionem impedire perhibentur.

3. Os uteri clausum, a celeri effluxu seminis, tactu, symptomatibusque præcedentibus; seminis absorptio impedita, a mensium obstructionibus, fluxu humorum vario, & post aliquot dies seminis ejectione; vitia ovarii & tubarum difficillime, si nullus tumor externe apparet; depravatio humorum uterinorum, calore & cachexia corporis, humorumque evacuatorum examinatione,prehenduntur.

4. Prognosis fausta, quando provenit a mensibus suppressis, fluore albo, vel fluxu acri; sed semper incerta in obstructionibus vaginæ, uteri, ovariorum, vel tubarum Fallopianarum.

5. Quando os uteri clauditur, ars chirurgica tentanda est. Appetitus venereus, si languet, excitandus.

Si nimia humorum copia ab utero separatur, evacuantia, exsiccantia, & roborantia usurpanda. Si scirrho laboret uterus, vix medelæ auscultat; ut & vitia ovarii & tubarum Fallopianarum.

Nimius uteri calor contemperatur inyec-

tionibus in uterum , diæta refrigerante , clysmatibus. Ulcerum & fluoris albi humor acris , sublatis causis , cessat.

## SECT. X.

### *Gravidarum morbi.*

1. **S**igna conceptionis , præsertim in initio , valde obscura , multis aliis morbis communia , & in diversis foeminis diversa sunt. Sequentia plerumque accidunt. Menses , post primum , secundum , vel tertium mensem , omnino suppressæ vel diminutæ , & mala hinc pendentia ; motus in utero circa quartum mensem , mammæ intumescences , & quando comprimuntur , serosum liquorem stillantes ; areolæ fuscæ ; tumor abdominis præcipue versus partem inferiorem. Tempus graviditatis ab exploratione crassitie cervicis uteri , & intumescentiæ abdominis propinquitate ad hypochondria , cognoscitur. Sexus vix , numerus foetuum difficillime , prædici potest.

2. Graviditas distinguitur ab hydrope ob hujus tumorem deorsum vergentem , fluctuationem & fitim : a mola , ob pondus gravativum , abdominis æqualem intumescenciam , & nullum in utero motum.

3. Gravidarum morbi varii sunt in diversis foeminis. Nonnullæ melius se habent

quando gravidæ; dum aliæ per totum gestationis tempus ægrotant.

4. Incommoda quæ gravidis accidunt primis mensibus sunt, appetitus prostratus, vel depravatus; nausea; vomitus; torpor; gravitas; dolor capitis; vertigo; animi deliquia; dyspnœa; tumor & dolor mammarum; odontalgia; hæmorrhagia uteri & narium. Hæc symptomata a mensibus retentis, uteroque infarto & increfcente, ortum ducunt.

5. Incommoda quæ accidunt ultimis mensibus sunt, tumores pedum; labiorum pudendi œdema; varices; tensiones abdominis; dolor dorsi lumborumque; spirandi difficultas; obstructio alvi; flatus; hæmorrhoides; suppressio urinæ; a fœtu undique premente oriuntur.

6. Priora symptomata tolluntur, 1. Sanguinis missione, mensuranda pulsu, retentione mensium, & tempore gestationis. 2. Medicamentis unicuique symptomati accommodatis. 3. Diæta parca & tenui, aereque temperato; motu violento, animi affectionibus immoderatis, & spectaculis horridis, evitatis.

Posteriora mitigantur, 1. Venæsectione caute administrata. 2. Fasciis & situ horizontali. 3. Medicamentis symptomati unicuique dicatis. 4. Diæta modica, sed pleniore quam antea, & moderato exercitio.



## SECT. XI.

*Abortus.*

I. **A** Bortus est exclusio foetus immatura. Tertio plerumque mense accidit.

2. Causae remotae sunt status morbosus, vel mors foetus; morbus uteri, vel partium utero vicinarum, uti inflammatio, ulcera, vulnus, tenesmus; nimis violenta sanguinis determinatio ad uterum exercitiis immodicis, emmenagogis, diureticis; validae musculorum abdominalium contractiones ab irritantibus catharticis, tussi, convulsionibus, subita brachiorum elevatione, lapsu proclivi; spirituum perturbationes ab animi affectionibus, vel ingratis odoribus; debilitas & relaxatio uteri a fluore albo, partu praecedente difficili, vel labe haereditaria.

3. Causa proxima abortus eadem est ac partus naturalis, nempe uteri musculorumque abdominalium violenta contractio ab irritatione praegressa.

4. Adsunt horripilatio; frigus extremitatum; dolores ventris lumborum ad os sacrum et pubem tendentes; pulsus citatus; relaxatio oris uteri; aquae sanguinisque effluxus; animi deliquia; foetus expulsio.

5. Prognosis incerta quando primipara vel debilis foemina, quando causae violentae agunt, quando foetus computruit, vel quan-

do postremis mensibus accidit abortus; raro enim adest periculum ante quintum mensem. Syncope vel convulsiones, nimiam hæmorrhagiam secutæ, periculum maximum ostendunt.

6. Orgasmus & effluxus sanguinis compescendus est, Phlebotomia, si adsit plethora.  
2. Adstringentibus internis & externis.

Irritatio uteri tollenda, 1. Antispasmodicis & lenissimis antihystericis. 2. Narcoticis.  
3. Leniendo causas remotas irritantes.

Quies corporis & animi, diæta parca & tenuis, aer temperatus, & decubitus cum hypogastrio elevato, conveniunt.

7. Si duret adhuc sanguinis effluxus periculosus, vel aquæ affluant, tunc fœtus, quocunque gestationis tempore, obstetricis manu educendus, & gravis, ut in partu naturali, tractanda.

8. In præcavendo abortu, inanitio & plethora æqualiter pertimescenda, causæ remotæ vitandæ vel tollendæ, & uteri cachexia corrigenda.

## SECT. XII.

### *De puerperarum tractatione in genere.*

1. **P**uerperis in genere conveniunt primis diebus diæta sobilis nutrienda & euseptica; decubitus in lecto per plurimos dies;

quies ; aer ad calidum vergens ; animi tranquillitas ; continuus cutis mador ; paregorica ; & purgatio , antequam se ad consueta munera accingant.

2. Puerperarum incommoda præcipue sunt lochiorum fluxus nimius , lochiorum diminutio vel retentio , dolores post partum , febris lactea & a lacte pendentia mala. Hæc peculiarem considerationem merentur ; cætera quæ a partu proveniunt , paroxysmi , hysterici , hæmorrhoides , procidentia uteri vel ani , excoriatio vel dilaceratio vulvæ & perinæi , abscessus , methodo in hisce morbis usitata , tractanda.

### SECT. XIII.

#### *Fluxus lochiorum nimius.*

1. **F**LUXUS lochiorum immodicus non solum a copia sanguinis effluente , sed a virium prostratione , pulsûs debilitate , vertigine , syncope & convulsionibus , judicatur.

2. Causæ proximæ sunt tonus fibrarum uterinarum amissus ; contractio impedita ob grumos sanguinis , vel frustula placentæ in utero relicta ; læsio uteri.

3. Periculum summum subitæ mortis imminet.

4. Curatur , 1. Cucurbitulis sine scarifica-



tione mammis, lumbis, imoque ventri applicatis: sanguinis enim missio, nisi adsit plethora, jam exhaustam præcipitat. 2. Extractione corporum extraneorum. 3. Adstringentibus internis & externis. 4. Narcoticis. 5. Diæta nutriente & solido potius quam fluido, aere non minus calido, quiete & somno, decubitu supino. 6. Abdomen fascia ligando.

## SECT. XIV.

### *Lochiorum diminutio vel suppressio.*

1. **C**ausæ remotæ sunt diarrhœa; animi pathemata; aer vel potus frigidus; medicamenta adstringentia; perspiratio obstructa; uteri inflammatio; paroxysmi hysterici.

2. Causa proxima est, convulsiva vasorum uterinorum contractio.

3. Stipatur tumore & duritie abdominis, si non adsit diarrhœa; doloribus ad lumbos, inguina & renes permeantibus; rigoribus; febribus acutis variis, uti purpura puerperarum, febre miliari, pleuritide, peripneumonia, phrenitide, angina, hepatitide, inflammationibus ventriculi, uteri, aliarumque partium; omnibusque aliis symptomatibus quæ has febres comitari solent.

4. Quo citius accidit & graviora parit


symptomata, eo majus periculum. Hæmorrhagiæ, vel sudores naturales supervenientes, faustam reddunt prognosim.

5. Lochia iterum revocantur, 1. Venæsectione in talo, pedum in aqua tepida immersione, & cucurbitulis partibus inferioribus applicatis. 2. Vasa uterina relaxando clysmatibus, fomentationibus, injectionibus, & cataplasmatibus emollientibus. 3. Tollendo causas remotas, nempe diarrhœam, perspirationem obstructam, paroxysmos hystericos, vel inflammationem uteri, medicamentis hisce dicatis. 4. Potu multo diluente & capite sublimi habito.

6. Si adsint febres inflammatoriæ, medellam ipsis propriam postulant, ratione semper habita ad causam, nempe lochiorum retentionem.

## SECT. XV.

### *Dolores post partum.*

1.  Riuntur a frustulis placentæ relictis, grumis sanguinis; lochiis retentis; flatu abdominis; utero vel ligamentis nimis distentis.

2. In læsionibus uteri & ligamentorum conducunt blanda oleosa interne sumpta. Frustula placentæ & grami sanguinis extrahenda. Flatus abdominis clysmatibus spiritum dige-

rentibus dispellitur. In omnibus fere summum remedium est opium.

## SECT. XVI.

### *Febris lactea.*

1. **S**ecundo, tertio, vel quarto die, puerpera corripitur rigoribus; febre; tumore & dolore mammarum qui ad axillam tendit. Post diem unum vel alterum febris judicatur sudoribus vel diarrhœa. Hic morbus ad febriles pertinet.

2. Cessante vel imminuto multum lochiorum fluxu, humores ad mammas molles & pendulas ruunt, febremque excitant. Dolor axillarum oritur a communicatione inter mammas et glandulas axillares ope vasorum lymphaticorum.

3. Si febris adsit acuta, mitigatur, 1. Diaphoreticis & antacidis. 2. Clysmatibus. 3. Potu multo diluente. 4. Embrocatione mammarum relaxante.

4. Lac in mammis ob copiam, spissitudinem, vel acredinem sæpe stagnat & tumores inæquales inflammatorios producit. Curantur suctione, resolventibus, evacuationibus, & antacidis.

5. Eodem modo tolluntur inflammationes, quæ in diversis locis oriuntur, lacte intra vasa retento.



6. Lac a mammis repellitur medicamentis topicis discutientibus & clysmatibus, suctione prius adhibita.

## PARS QUINTA.

*De morbis infantium & puerorum.*

### SECT. I.

*De morbis infantilibus & puerilibus in genere.*

1. **M**ORBI ad decimum fere annum hoc titulo insigniuntur.

2. Causæ morborum infantilium & puerilium ad has classes reduci possunt, 1. Varias mutationes in suo statu a natura inductas. 2. Diætam lacteam acescentem. 3. Lac nutricum vitiatum. 4. Fibrarum muscularium debilitatem. 5. Sensibilitatem generis nervosi. 6. Labem hæreditariam.

3. Diagnofis morborum infantilium petitur præcipue a ructu acido; nausea; vomitu; materia ejecta per os, vel anum; ploratu; vigiliis; inquietudine; fiti; respiratione; convulsionibus; parentum morbis; pustulis vel ulceribus interne, externeve conspiciendis. Pulsus & urina incerta præbent indicia.

4. Facilius in morbos incidit, faciliusque e morbis elabatur tenera quam provecta ætas. Infantes laxam alvum saniores sunt quam cons-

tipatam habentes. Corpulentiores magis obnoxii rachitidi, scrophulæ, tussi convulsivæ, aphthisque; macilentiores febribus inflammatoriis. Convulsiones, præcipue cum diuturnis vigiliis, infirmis mortiferæ.

5. In morbis infantium curandis mitissima eligenda sunt medicamenta.

6. Ad præcavendos morbos, convenit meconium e primis viis expellere, antequam lactetur infans, si natura huic operi non sufficiat.

7. Eligenda quoque est nutrix sana; dentes & pulmones integros habens; gracilis potius quam obesa; hilaris; non primipara; neque ebrietati, iracundiæ, aut veneri dedita; lac subdulce, inodorum, album, non nimis vetustum, neque nimis tenue aut viscidum secernens.

8. Lac maternum alieno anteponendum, ob laxantem colostri qualitatem, habitum similem, & animi vitia a nutrice sæpe impressa.

## SECT. II.

### *Morbus ab acido.*

1. **M**ulta parit mala acidum in primis viis teneros nervos lædens, & lac in massam tenacem coagulans.

2. Hinc sequuntur ructus acidi; nansea;

vomitibus lactis coagulati; jactatio; inquietudo; ploratus; mammarum averfatio; flatus; tormina, & intumescencia ventris; spirandi angustia; alvi adstrictio, vel diarrhoea cum fecibus viridescentibus, & corrosivis; marasmus; tussis sicca; pallor; flacciditas; convulsiones.

3. Facile in initio curantur, 1. Aciditatem corrigendo absorbentibus vel inviscantibus. 2. Materiam peccantem lenissimis purgantibus evacuando.

4. Symptomata mitigantur, 1. Spiritum digerentibus. 2. Enematibus spasmus intestinorum relaxantibus. 3. Fomentationibus, cataplasmatibus, vel inunctionibus spiritum digerentibus abdomini externe applicatis. Opiata cane pejus & angue vitanda sunt.

5. Ad præcavendam aciditatem nutrix vescatur carnibus earumque jusculis, evitatis leguminibus acescentibus.

### SECT. III.

#### *Aphthæ.*

1. **A** Phthæ sese produnt alba crusta in ore, faucibus, œsophago, & aliquando in toto tubo alimentari. Os inflammatur & dolet. Lactis suctio & deglutitio impeditur. Hinc inquietudo, vigiliæ, febris.



2. Distinguntur , 1. genuinas & symptomaticas. 2. In benignas & malignas.

3. Causæ remotæ sunt, nimis violenti conatus in sugendo; oris frictio ab externis causis; lac nutricis vitiatum; lac bonum in acidam indolem degenerans.

4. Causa proxima est nimia spissitudo vel acrimonia humorum, qui a glandulis parvis mucosis oris, faucium, &c. separantur; hinc inflammationes & crustæ.

5. Prognosis infausta quando nigra vel fœtida sunt ulcuscula, vel deglutitio impeditur.

6. Tolluntur, 1. Sanguinis diminutione, si inflammatio adsit magna. 2. Alvum leniter ducentibus. 3. Absorbentibus. 4. Externis applicationibus detergentibus & exsiccantibus.

7. Si in culpa est nutrix, vel alia conducenda, vel lac corrigendum.

8. Aphthæ symptomaticæ medela ad ipsum morbum primarium applicata curantur.

## SECT. IV.

### *Dentitio.*

1. **D**Entitio incipit septimo, octavo, nono, vel decimo mense, & quarto plerumque anno finitur, dentibus sapientiæ exceptis.

2. Dentitio difficilis sic se habet. Infans plorat, vigilat, calet, papillas nutricis mordet, & digitos in os sæpe immittit. Gingivæ dolent, rubent in basi, sed in apice albicant & acuminantur. Os scatet saliva. Vel constipatur, vel solvitur alvus. Sequuntur febris; somnolentia; aphthæ; gangrænæ; convulsiones.

3. Causa horum symptomatum proxima est tensio, inflammatio & terebratio gingivarum.

4. Diagnofis facilis ab ætate infantis & oris inspectione.

5. Prognofis eo periculofior quo magis debile genus nervosum, quo magis inflammatoria constitutio, quo plures simul erumpunt dentes. Salivatio & alvus soluta benigna; febris acuta, somnolentia, & convulsiones, pessima symptomata sunt.

6. Medela perficitur eruptionem dentium promovendo & inflammationem temperando.

Eruptio promovetur, 1. Emolliendo & relaxando gingivas. 2. Comprimendo gingivas contra dentes, corporum durorum & glabrorum affricu. 3. Incisione vesiculæ albæ, quando dentes jamjam adfunt.

Inflammatio minuitur, 1. Sanguinis detractio. 2. Alvi solutione. 3. Regimine temperato. 4. Vesicatoriis.

## SECT. V.

*Vermes.*

1. **U**Naquæque ætas, sed præcipue infantilis, post ablactationem, vermibus infestatur.
2. Distinguuntur in lumbricos, ascarides, tineas, & cucurbitinos.
3. Generationi vermium favent aer humidus, constitutio imbecilla, & prava diæta ex caseo, fructibus horæis, leguminibus, saccharatis, & farinaceis.
4. Ex ovis deglutitis & fotis intestinorum humiditate, caliditate, humoribusque mucilaginosi, producuntur.
5. Adsunt vigilatio; narium pruritus; ructus acidi; nausea; appetitus dejectus, Vel caninus; salivæ fluxus; aspectus lugubris; facies pallida cum maculis rubris; oscitationes; singultus; abdomen tumefactum & induratum; morsus circa umbilicum; diarrhœa; stridor dentium; convulsiones; syncope; febris erratica. Variant symptomata secundum locum affectum.
6. A vermibus ductum intestinalem rodentibus, nidisque eorum mucilaginosi, hæc producuntur.
7. Diagnos petitur a laxo habitu, diæta, symptomatibus, & vermium excretionibus.
8. Prognosis prosperior in ascaridibus, quam



lumbricis ; in albis , quam in nigris lumbricis. Vermes , in aliis morbis excreti , putrefactionem humorum intestinalium arguunt.

9. Curatur hic morbus , 1. Acidis. 2. Amaris. 3. Oleosis. 4. Mercurialibus. 5. Vitriolo ferri , vel aquis ferrugineis. 6. Pulvere stanni. 7. Variis specificis , uti corn. cerv. præp. allio , sem. fantonic. tanacet. aff. foetid. aq. calc. 8. Clysmatibus primo dulcibus , dein amaris. 9. Emplastris ex amaris umbilico applicandis. 10. Diæta vermibus contraria.

In ascaridibus summum remedium est aqua sulphuria salina vici *Harrowgate* dicti , superne & inferne administrata.

## S E C T. V I.

*Vigilatio , pavor in somno , convulsiones.*

1. **V**igilatio a nervorum irritatione provenit : hinc ab acido , aphthis , vermibus , dentione , inflammationibus , omnibusque dolorem excitantibus producitur.

2. Comitatur macies , febris & diarrhœa.

3. Curatur , 1. Morbum primarium tollendo. 2. Narcotica parce administrando , quando postulat vis morbi.

4. Hinc cognoscitur causa & medela pavoris in somno.

5. Ab iisdem causis fortius agentibus producuntur

Sect. 7. NON FEBRILIBUS. 321  
ducuntur convulsiones symptomaticæ. Tol-  
luntur attentione ad morbum primarium et  
antihystericis.

## SECT. VII.

*Crusta lactea, tinea, impetigo, &c.*

1. **C**Rusta lactea est crusta scabiosa, mo-  
bilis, calvarium, frontem, vel fa-  
ciem occupans, bene nutritos infantes in-  
festans, ab humoribus viscidis glandulas se-  
baceas obstruentibus proveniens.

2. Tinea est crusta scabiosa calvarii, inæ-  
qualis, phagedænica, ab ulcusculis radices  
crinum occupantibus orta.

3. Curantur, 1. Alvum laxantibus. 2. Ape-  
rientibus. 3. Emollientibus et deterfivis. 4.  
Fonticulis.

4. Hinc intelliguntur impetigo, intertrigo,  
sudamina, perniones, & tumores glandula-  
rum lymphaticarum.

## SECT. VIII.

*Phthiriasis, crinones.*

1. **P**Hthiriasis est nimia pediculorum quan-  
titas a spurcitie orta. Curatur mun-  
ditie & medicamentis animalia necantibus.

2. Eodem modo tolluntur crinones.

## S E C T. IX.

*Ani procidentia.*

.1 **E**St prolapsus tunicæ internæ intestini recti a tenesmo originem habens. Profunt applicationes adstringentes & spirituosæ.

## S E C T. X.

*Atrophia.*

1. **C**Ausæ atrophiæ sunt , 1. Transitus chylo ad vasa sanguinea denegatus ob lactis coagulum , vermes , vel glandulas mesenterii obstructas. 2. Nimia humorum dissipatio e vasis. 3. Prava diæta.

2. Adsunt flacciditas & macies corporis ; tumor abdominis ; lassitudo corporis ; vigiliæ ; febris ; hidrops vel anasarca ; diarrhœa colliquativa.

3. Prognosis variat secundum causas : in confirmata macie semper incerta est.

4. Medela ad varietatem causarum accommodetur.



## S E C T. X I.

*Rhachitis.*

1. **R**hachitis est ossium spinæque incurvatio cum inæquali partium nutritione. Antiquis morbus incognitus primo sese monstrabat circa annum 1630. in occidentilibus Angliæ plagis, et dein per totam Europam vagatus est.

2. Distinguitur, 1. In rhachitem connatam & adventitiam. 2. In originariam & symptomaticam. 3. In solitariam, & complicatam aliis morbis.

3. Infantes a sexto mense ad sesquiannum frequenter; ab hoc ad finem secundi anni cum dimidio frequentissime; sed post annum quintum nunquam fere hoc morbo corripiuntur.

4. Causæ remotæ sunt dispositio ad hunc morbum a parentibus laxam vel humidam constitutionem habentibus, morbis debilitantibus exhaustis, vitam otiosam agentibus, diætæ opiparæ indulgentibus, voluptatibus aut morbis venereis fractis, vel fluore albo laborantibus, communicata; aer palustris & humidus, vel exhalationibus ex plumbo, antimonio, aut argento vivo, inquinatus; narcotica nimis copiose interne sumpta, vel externe applicata; diætæ ex viscidis, humec-

tantibus, vel saccharatis alimentis; defectus motus & exercitii; somnus vel vigiliæ in excessu; calor lecti immoderatus; morbi prægressi, uti febres, difficilis dentitio, convulsiones, diarrhœa, aliique; nutrix morbosa, vel lac nutritioni ineptum secernens.

5. Non oritur hic morbus a defectu spirituum animalium in medulla spinali; sed a laxitate fibrarum & lentore fluidorum inde sequenti. Patet a causis remotis, symptomatibus, & cadaverum inspectione.

6. Sese prodit ignavia, debilitate, & flacciditate musculorum; protuberantiis articularum; abbreviatione & incurvatione ossium, primo tibiæ & fibulæ radii & ulnæ, dein femoris & humeri; capitis incremento; extenuatione musculorum infra caput; difficili dentitione & dentibus nigris vacillantibusque, pectore angusto & acuminato; abdominis tumescencia; hypochondriorum tensione; respiratione difficili; tussi; appetitu in initio illæso; postea deletò; spina dorsi varie inflexa; excrementis parum foetidis vel mutatis; lienteria; ingenio acuto & præcoci; febriculaque. Tandem hebetes lethargici, & apoplexia, vel convulsionibus correpti vitam morte commutant.

Aperto cadavere, jecur magnum scirrhumque; glandulæ mesenterii obstructæ; abdomen hydropicum; intestina flatu turgida; thorax aqua repletus; pulmones scirrhusi,

vel suppurati; jugulares & carotides venæ iusta proportionē ampliores; arteriæ vero debito minores; & aqua inter duram & piam matrem, vel in cerebri ventriculis conspici-  
citur.

7. Ossa mollia deveniunt ob defectum vi-  
rium comprimentium & fluidorum ossifica-  
tioni ineptorum, ideoque a musculis flexori-  
bus incurvantur. Costæ complanantur a mus-  
culis pectoralibus, intercostalibus & abdomi-  
nalibus; sternumque acuminatur. A nervis  
medullæ spinalis compressis oritur tabes cor-  
poris infra caput, largior liquoris nervosi  
secretio in cerebro, abhinc major nutritio  
capitis & abdominalium viscerum, acumen-  
que ingenii inusitatum. Glandulæ strum-  
osæ, a lentore & debili fluidorum circula-  
tione. Tumor ventris, a scirrhis viscerum  
glandulis; aqua in cavitate abdominis, &  
aere intestinis incluso, lienteria; a tubo in-  
testinali debilitato, & bilis aquositate; lethar-  
gus & apoplexia, a cerebro colluvie serosa  
oppresso, proveniunt.

8. Diagnosıs morbi incipientis a sympto-  
matibus, præcipue inhabilitate ad motum,  
protuberantiis articulorum, tumore abdomi-  
nis, mollitie capitis, laxitate generali & tabe  
corporis petitur. Ab hydrocephalo sympto-  
matibus distinguitur.

9. Rhachitis connata periculosior postea  
contracta; periculosior quoque a morbis præ-



cedentibus, quam ab errore regiminis orta. Quo grandius caput, quo maiores articulo-  
rum prominentiæ, quo magis ossa incurvan-  
tur, eo productior fit morbus. Hydrocephala-  
lum, asthma, phthisis pulmonalis, hydrops,  
febris hectica lues venerea, scorbutus, pene  
incurabilem efficiunt. Eruptio cuticularis &  
calor medelam accelerant.

10. Ad curationem perficiendam colluvies  
serosa evacuanda & fibræ roborandæ.

Serum redundans evacuatur, 1. Vomito-  
riis & rheo certis intervallis repetitis. 2. Fon-  
tanellis.

Fibræ roborantur, 1. Exsiccantibus, ama-  
ris, chalybeatis, cortice Peruviano. 2. Balneo  
frigido, si vires sufficiant. 3. Frictione, exter-  
ne applicatis eodem tempore medicamentis  
roborantibus non oleosis. 4. Exercitio mo-  
derato, uti cunarum agitatione, rheda, arti-  
ficiali corporis suspensione vel gestatione in  
ulnis. 5. Diata exsiccante & aere siccissimo.

**F. I. N. I. S.**





